

Sollte in einer Zucht ein *valesina*-♂ auftreten, so würde sich, sofern das eine Stück nicht geopfert werden wollte, empfehlen, einige normale Paare aus dieser Zucht zur Copulation und Weiterzucht zu verwenden, und ebenso wären von einer Flugstelle, auf der ein *valesina*-♂ gefunden würde, einige *valesina*- oder *paphia*-♀♀ einzufangen und zur Eiablage zu bringen. — Vielleicht ist es auch hierbei ein sogenannter „einfacher“ Sammler, der zuerst das Glück hat und sogar mit einer Anzahl solcher *valesina*-♂♂ überrascht werden könnte. Und wenn sonst etwa noch in Sammlungen albinistische *paphia*-Falter stecken sollten, so seien die Besitzer auch hier wiederum um Bekanntgabe dieser „verborgenen Veilchen“ angelegentlichst ersucht! —

Federmotten in der ehem. österr.-ung. Monarchie.

Von Hugo Skala, Altenfelden (Ober-Oesterreich).

Im Verfolg meiner diesbezüglichen Abhandlungen sei auch diese Zusammenstellung veröffentlicht. Abkürzungen: B.=Böhmen, Sch.=Schlesien, M.=Mähren, Slow.=Slowakei, G.=Galizien, Buk.=Bukowina, N.Oe.=Niederösterr., O.Oe.=Oberösterr., S.=Salzburg, T.=Tirol (mit Südtirol), St.=Steiermark (mit Süden), K.=Kärnten, Kr.=Krain, Küst.=Küstenland, U.=Ungarn, Ban.=Banat, Sieb.=Siebenbürgen, Kro.=Kroatien (mit Fiume und Slavonien), Bos.=Bosnien und Herzegow. Da.=Dalmatien. Die Zahlen beziehen sich auf den Staudinger-Rebelkatalog 1901.

Pterophoridae.

- Trichoptilus paludum* Z. (1310) ? N. Oe., O. Oe., S.
T. siceliota Z. (1311) Küst., Da.; mediterran.
Oxyptilus kollari Stt. (1312) Hochalp. T., K.
O. tristis Z. (1313) B., M., G., U., N. Oe., O. Oe., T., St., Kro., ? Da.
O. distans Z. (1314) B., M., G., U., Sieb., N. Oe., T., St., Kr., Küst., Kro., Bos., Da.;
O. laetus Z. (1314a) U., Sieb., Küst., Bos., Da.; oriental. [oriental.
O. pilosellae Z. (1315) überall außer Slow., Buk., Da.
O. hieracii Z. (1316) überall außer Slow., Bos.
O. ericetorum Z. (1318) G., Sieb., N. Oe., T., St., K., Bos.
O. didactylus L. (1319) B., M., G., U., N. Oe., O. Oe., T., St., K., Kro., Bos., Da.
O. leonuri Stange (1320) G., Ban., N. Oe., O. Oe.
O. teucarii Jord. (1321) G., U., Sieb., Küst., Kro.
O. parvidactylus Hw. (1322) überall außer Slow., S.
O. marginellus Z. (1323) Küst.; verm. mediterran.
Platyptilia rhododactyla F. (1325) überall außer Slow., Buk., S.
Pl. capnodactyla Z. (1327) G., U., Kro., Bos.; orient.
Pl. ochrodactyla Hb. (1328) B., Sch., M., G., U., Sieb., N. Oe., O. Oe., St., K., Kro.,
Pl. bertrami Rössl. (1329) B. (Binder), M., U., T., St., K. [Bos.; oriental.
Pl. gonodactyla Schiff. (1332) überall außer Slow., Buk., Bos., Da.
Pl. farfarella Z. (1334) G., U., ? T., St., K., Da.
Pl. zetterstedtii Z. (1335) überall außer Slow., Buk., Küst., Da.; sibirisch.
Pl. doronicella Fuchs. Verm. gute Art. Gebirge Sch., M., N. Oe., O. Oe., K., Bos.;
Pl. nemoralis Z. (1336) B., Sch., M., G., Sieb., N. Oe., O. Oe., T., St., K., Kr. [alpin.
Pl. saracenicata Wcke (1336a) verm. gute Art. G.
Pl. tesseraedactyla L. (1337) überall außer Slow., Buk., S., Küst., Kro.
Pl. meşneri Z. (1338) U., T., Bos.
Pl. acanthodactyla Hb. (1339) überall außer M., Slow., S.
Pl. cosmодactyla Hb. (1342) überall außer Slow., Buk., Kro., Bos.
Alucita galactodactyla Hb. (1344) M., U., N. Oe.; oriental.
A. spilodactyla Curt. (1345) G., U., N. Oe., Küst., Bos., Da.; oriental.

- A. pentadactyla* L. (1348) überall außer Slow.; sibirisch.
A. xanthodactyla Tr. (1353) M., U., N.Oe., T., St., K., Kr., Kro., Bos., Da.; orient.
A. baliodactyla Z. (1361) B., M., G., N.Oe., O.Oe., T., St., K., Kr., Bos., Da.; orient.
A. fitji Rbl. Küst., Bos.
A. tetradactyla L. (1365) überall außer Slow.; sibirisch.
A. malacodactyla Z. (1366) Südungarn, Kr., Küst., Bos., Da.; orient.
A. wernickei Wck. (1369) Alpen K. (1 St.); alpin.
A. ischnodactyla Tr. (1370) U., ? N.Oe., Küst., Bos., Da.
Pselnophorus brachydactylus Tr. (1372) überall außer Slow., Buk., Kr., Küst.
Marasmarcha phaeodactyla Hb. (1378) B., G., Buk., O.Oe., T.
Gypsochares baptodactyla Z. (1380) Fiume, Da.
Pterophorus lithodactylus Tr. (1383) Sch. (Bohatschek), G., Buk., U., Sieb., N.Oe., T., St., K., Kr., Küst., Bos., Da.
Pt. rogenhoferi Mn. (1384) Alpen N.Oe., T., K.; alpin.
Pt. constanti Rag. (1385) B., Slow., Sieb., N.Oe., St., Kr., Bos.
Pt. monodactylus L. (1387) überall außer Da; sibirisch.
Pt. scarodactylus Hb. (1388) B., Sch., M., G., Ban., Sieb., N.Oe., O.Oe., ? T., St., K.; sibirisch.
Pt. lienigianus Z. (1389) Sch., M., G., U., Sieb., N.Oe., T., St., K., Kro., Da.
Pt. tephrodactylus Hb. (1390) überall außer Sch., M., Slow., Buk., Da.
Pt. distinctus H. S. (1392) Sch., M., G., U., Sieb., N.Oe., O.Oe., St., K.
Pt. inulae Z. (1393) M., N.Oe., O.Oe.
Pt. carphodactylus Hb. (1394) überall außer M., Slow., Buk., S., Da.
Pt. osteodactylus Z. (1396) überall außer Slow., U., Kro., Da.
Pt. microdactylus Hb. (1397) überall außer B., Slow., Buk., S., Küst., Bos.
Stenoptilia miantodactyla Z. (1398) Slow., U., Ban., Kro.
St. pelidnodactyla Stein. (1400) überall außer Sch., Buk., Sieb., Da., (Bos.); sibirisch.
St. coprodactyla Z. (1402) U., Sieb., N.Oe., O.Oe., S., T., St., K., Kr., Küst., Kro., Bos.; sibirisch.
St. zophodactyla Dup. (1405) B., U., N.Oe., O.Oe., St., K., Küst., Bos.
St. bipunctidactyla Hw. (1406) überall außer Slow., Buk.
St. graphodactyla Tr. (1412) Gebirge Sieb., G., N.Oe., O.Oe., S., T., St., K.
St. pneumonanthes Schleich. (1413) N.Oe.
St. pterodactyla L. (1414) überall außer S., Küst.; sibirisch.
St. paludicola Wallgr. (1415) N.Oe., Syrmien.
St. stigmatodactyla Z. (1417) B., M., Slow., G., Ban., N.Oe., T., ? St., K., Küst., Kro., Bos., Da.; orient.
Agdistis meridionalis Z. (1421) Küst., Kro., Da.; mediterran.
A. adactyla Hb. (1424) B., M., G., U., Sieb., N.Oe., K., Da.; orient.
A. paralia Z. (1427) Da.
A. tamaricis Z. (1428) Küst., Da.; orient.
A. staticis Mill. (1430) Küst., Da.

Orneodidae.

- Orneodes zonodactyla* Z. (1431) Südtirol, Küst., Kro.; verm. mediterran.
O. desmodactyla Z. (1432) B., U., Sieb., N.Oe., O.Oe., S., T., St., K., Kro., Bos., Da.
O. major Röl. Südungarn, Sieb., Bos.
O. dodecadactyla Hb. (1433) B., Sch., U., N.Oe., O.Oe., S., T., K., Kr., Da.
O. grammodactyla Z. (1434) überall außer Sch., Slow., T.; orient.
O. palodactyla Z. (1435) Da; verm. mediterran.
O. hexadactyla L. (1437) überall außer Slow., Buk., U., St., Küst.; verm. sibirisch.
O. hübnerei Wallgr. (1438) überall außer Sch., Slow., T.
O. cymatodactyla Z. (1439) G., U., Küst., Kro., Bos., Da.

Für die Mitteilung etwaiger Ergänzungen wäre ich Sammlern recht dankbar.

Zusatz der Red. Von den 77 Arten sind also 13 orientlich, 7 sibirisch, 5 (wahrscheinlich) mediterran, 4 alpin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1929/30

Band/Volume: [43](#)

Autor(en)/Author(s): Skala Hugo Otto Victor

Artikel/Article: [Federmotten in der ehem. österr.-ung. Monarchie. 197-198](#)