

Bestimmungstabelle der Brenthidae.

Von R. Kleine, Stettin.

(Fortsetzung.)

28. El. mit schwacher Reihenpunktierung . . . **robustus** Sharp
 Mit tiefer Reihenpunktierung **occlusus** Sharp
29. Metat. dreifurchig 30
 Nicht dreifurchig 31
30. Pechschwarz, Prot. eiförmig, El. mit zwei Furchen **tenuis** Suffr.
 Rotbraun, Prot. elliptisch, El. einfurchig . . . **simplex** Suffr.
31. Rotbraun, Stirn u. R. gefurcht, El. mit schwarzer, postmedianer
 Makel **adustus** Boh.
 Pechschwarz, Stirn grubig vertieft, Metat. nicht gefurcht, seitlich
 grob punktiert, El. ohne Makel **linearis** Suffr.
32. Stirnfurche schmal, aber vorhanden 33
 Stirn garnicht oder breit gefurcht 35
33. Stirnfurche bis zu den Augen reichend, Pror. tief und breit
 gefurcht **laticollis** Sharp
 Stirnfurche mit der Rüsselfurche verschmolzen, höchstens auf
 dem Metat. undeutlich 34
34. K. u. R. unterseits je eine Punktreihe mit Haaren . **prolixus** Sharp
 K. u. R. unterseits unpunktirt, unbehaart . . . **ducalis** Sharp
35. Stirn nicht gefurcht **afflictus** Kln.
 Stirn breit u. tief gefurcht, mit dem tiefdreieckigen, ausgehöhlten,
 hinten breit offenen K. verbunden **agnatus** Kln.

Trachelizus Schoenh.

1. Ganz oder zum Teil schwarz 2
 Einfarbig braun in verschiedener Tönung 3
2. Einfarbig schwarz **confinis** Kln.
 Körper \pm rotbraun, nur die El. schwarz mit rotbrauner Makel
 an der Basis, vor u. hinter der Mitte . **rufomaculatus** Senna
3. Einzelne Körperteile mit erdfarbigem Filz bedeckt 4
 Ohne Filz, am ganzen Körper glänzend 8
4. K. gefurcht 5
 K. ungefurcht oder die Kopffurche wenigstens auf der Stirn
 unterbrochen 7
5. Metat. mit nur einer, nicht filzigen Mittelfurche 6
 Metat. dreifurchig, filzig **modestus** Senna
6. Hntk. mit Tuberkeln, Prot. ganz unpunktirt, Humerus gr.,
 nach vorn blattartig erweitert **dividuus** Kln.
 Kopfseiten mit zwei tuberkelartigen Verdickungen, Humerus
 nicht vorgezogen **insularis** Senna

7. Am ganzen Körper mit erdgrauem Filz bedeckt, matt, 4.–8. Fgl. quer u. wie die anderen st. filzig, auf den El. sind alle Ri. in \pm Ausdehnung vorhanden **peregrinus** Senna
Meist nur am K. u. Prot. mit auffallenden Filzbelag, 4.–8. Fgl. quadratisch, nicht quer, ohne merkbarem Filz, außer der Sutura nur noch zwei Ri. vorhanden **bisulcatus** F.
8. K. gefurcht **moestus** Senna
K. ungefurcht, höchstens am Metat. grubig vertieft 9
9. El. unpunktirt **laevigatus** Senna
El. mit kräftiger Reihenpunktierung 10
10. El. wie das ganze Tier hochglänzend **politus** Senna
El. an den S. matt **despiratus** Kln.

Proephebocerus Calabr.

Nur eine Art **populeus** Boh.

Hemisamblys Kln.

Hellbraun, Sutura u. postmediane Makel dunkel, K. u. Prot. matt, nur die Mitte glänzend, K. einzeln, Prot. u. Rostrum kräftig punktiert, Metasternum u. Abdomen zart punktiert . . **contemptus** Kln.

Vasseletia Sharp.

Nur eine Art **Vasseleti** Boh.

Miolispa Pasc.

1. El. nur auf dem Ab. gerippt=gefurcht, sonst glatt u. nur zart punktiert 2
El. auf der ganzen Fläche gerippt=gefurcht 3
2. Einfarbige schwarze Art **paucicostata** Kln.
K. F. u. R. schwarz, Prot. zinnoberrot, El. blaumetallisch
pulchella Kln.
3. Prot. deutlich u. kräftig längsgefurcht 4
Prot. ganz obsolet oder ungefurcht 19
4. Prot. überall dicht tief grubig punktiert 5
Prot. höchstens am Hntr. in sehr geringem Umfange oder garnicht punktiert 9
5. Matte, einfarbig schwarze Art, 2. Ri. nicht gelb . **unicolor** Kln.
Glänzende Arten, 2. Ri. gelb 6

Fortsetzung folgt.

Berichtigung.

Von Fr. Dannehl, München.

Im „Nachwort“ zu meiner Arbeit „Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Südtirols“ (E. Z. 43, Nr. 12, S. 150) hat sich zuguterletzt leider ein Irrtum eingeschlichen. Unter den als für das Gebiet neu aufgefunden angeführten Arten sind *Synt. ragazzi* Tur. und *herthula* Stdr. genannt. Sie wurden mir in München so bestimmt, wohin ich sie mangels Vergleichsmaterials in Torbole schickte. Später stellte ich fest, daß es sich um eine *phegea* L.-Form und *marjana* Stdr. handelte, was auch Stauder, dem ich die Tiere zur Einsicht schickte, bestätigte. Ich bitte die irrigen Angaben in meiner Arbeit zu streichen und abzuändern.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1929/30

Band/Volume: [43](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: [Bestimmungstabelle der Brenthidæ.
\(Fortsetzung\) 226-227](#)