

Bestimmungstabelle der Brenthidae.

Von R. Kleine, Stettin.

(Fortsetzung)

25. Augen kl. **reticulata** Kln.
 Augen gr. 26
26. Metar. rundlich=walzig **consociata** Kln.
 Metar. kantig 27
27. Hinterer Augenrand knotig verdickt **compressa** Kln.
 Nicht gezahnt, sondern in einen stumpfen Zapfen endigend
colorata Kln.
 Gezahnt 28
28. Mittelfurche des Metar. flach verschwommen . **rugosa** Kln.
 Mittelfurche tief u. scharf 29
29. Mittelfurche des K. sehr schmal **conjugalís** Kln.
 Mittelfurche breiter, tief 30
30. K. dreieckig eingekerbt, Augenrand 2=spitzig . **clavata** Kln.
 K. mehrfach eingekerbt, Augenrand nur stumpf gekerbt, Metar.
 1=furchig **conspícua** Kln.

Holomiolispa Kln.

- Nur eine Art **devota** Kln.

Hígoníus Lewis.

1. Der ganze Körper matt, unbehaart, nicht filzig . **nudus** Kln.
 Körper immer $\pm$ behaart oder filzig 2
2. Körper länger behaart oder pilos u. filzig 3
 Körper nicht direkt behaart, sondern $\pm$ filzig 4
3. Prot. am Halse st. zsmgeschnürt, bucklig erhöht
bílobicollis Senna
 Prot. nicht verengt, nicht bucklig **hírsutus** Senna
4. Prot. nur mit einfacher Mittelfurche 5
 Prot. mit 4 erhabenen Ri. 7
5. Kastanienbraun, El. ohne Makel **Grouvelleí** Senna
 Rötlich u. erdbraun, El. mit schwarzer Makel 6
6. Prot. matt, El. tief gefurcht, Unters. des Körpers schwarz=braun **cílo** Lewis
 Prot. glänzend, El. flach gefurcht, Unters. des Körpers wie die Obers. gefärbt **niássicus** Senna
7. El. mit deutlichen Ri., F. und Abdomen zuw. schwarz, meist verdunkelt **crux** Olliff
 El. mit verschwommenen Ri., F. u. Abdomen von der Farbe der übrigen Körperteile **Powerí** Lewis

Taphrocomíster Senna.

- Nur eine Art **singularís** Senna

Allodapínus Hed.Nur eine Art **hospítón** Kln.**Araíorrhínus** Senna.

1. Pechschwarze Art, 2 Ri. der El. in der Mitte unterbrochen
interruptecostatus Kln.
Rotbraun bis kastanienbraun, 2. Ri. nicht unterbrochen . . . 2
2. Pror. kantig, nur 1-1½ mal so lang als das Metar.
conquisítus Kln.
Pror. rund, st. verlängert 3
3. Hntr. des K. tief eingekerbt 4
Hntr. nicht eingekerbt 6
4. Prot. nur an der Basis sehr zart gefurcht . . **Beesoní** Kln.
Prot. tief gefurcht 5
5. Furche des Prot. u. die El. filzig, letztere ohne Makel
sondaícus Senna
Furche nicht filzig, El. mit Makel **austrális** Senna
6. Metar. nicht gefurcht, nur grubig vertieft . . **Faustí** Senna
Metar. gefurcht 7
7. Hntr. des K. schwach nach innen gebogen, 2. Ri. leicht wellig
gebogen **longirostris** Senna
Hntr. des K. kurz aber breit eingeschnitten, 2. Ri. in der Mitte
st. verschmälert u. nach innen gebogen . **exportatus** Senna
Hntr. gerade, nicht eingeschnitten, Ri. nicht verschmälert,
wenig wellig nach innen gebogen **agílis** Kln.

Ceunonus Kln.Nur eine Art **minutus** Kln.**Microtrachelízus** Senna.

1. Metar. 3-furchig 2
Metar. 1-furchig 10
2. Schwarzbraun, Obers. matt **sordídus** Kln.
Rotbraun bis violettbraun, ± glänzend, selten matt . . . 3
3. K. ober. ungefurcht 4
K. ober. gefurcht 7
4. Humerus gezahnt, Furchen auf den El. filzig **aethiopicus** Calab.
Humerus nicht gezahnt, Furchen nicht filzig 5
5. Körper einzeln borstig behaart **pubescens** Senna
Körper unbehaart 6
6. K. grubig punktiert, Kanten der mittleren Fgl. gerundet,
perlíg **copulatus** Kln.
K. nur undeutlich u. zart punktiert, mittlere Fgl. quer, eckig
apertus Kln.
7. 2. Ri. in der Mitte unterbrochen **fractus** Kln.
Nicht unterbrochen 7a

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1930/31

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: [Bestimmungstabelle der Brenthidae. \(Fortsetzung\) 100-101](#)