

Bestimmungstabelle der Brenthidæ.

Von R. Kleine, Stettin.

(Fortsetzung)

Eurystellus Kln.Nur eine Art **rex** Kln.**Eremoxenus** A. Sem.Nur eine Art **chan** A. Sem.**Pericordus** Kolbe.K. vom Halse abgesetzt, Skulptur auf K., R. u. B. st., grob, rugos
latipes KolbeK. nicht abgesetzt, Skulptur an den angegebenen Organen fehlend
scutellaris Kln.**Myrmecobrenthus** Kln.Nur eine Art **Wasmanni** Kln.**Paussobrenthus** Gestro.1. Körper spiegelglatt, nicht pruinos, überall behaarte Exsudat-
gruben vorhanden, Augen den ganzen seitlichen K. ein-
nehmend, Pror. rundlich **conterminus** Kln.
Körper pruinos, Exsudatgruben fehlen 22. K. gegen das Metar. dreieckig vorgezogen, in der Mitte
tuberkelartig erhöht, Augen kl., nach vorn stehend, Schild des
Metar. nach vorn zungenförmig endigend . **Bakeri** Gestro
K. nicht dreieckig vorgezogen, nicht tuberkelartig erhöht,
Augen gr., fast bis zum Hntr. des K. reichend, Schild des
Metar. vorn rundlich, nicht zungenförmig . . **concitatus** Kln.**Thoracantharus** Kln.Violettbraun bis schwärzlich, K. zart punktiert, Prot. auf dem
Diskus unpunktirt, nach den S. u. gegen den Hntra. einigen
grobe Punkte. Schk. u. Schn. mit einzelnen Poren **curiatus** Kln.**Kleineella** Strand1. Prot. tief gefurcht, plattgedrückt 3
Prot. nur flach gefurcht, nicht plattgedrückt 22. Fgl. 4-8 quadratisch, st. behaart, Pror. unters. am Vdr. tief aus-
geschnitten, Prot. deutlich längsgefurcht **compressicornis** Kln.
Fgl. 4-8 walzig, Pror. unters. rundlich, am Vdr. nicht aus-
geschnitten, Prot. kaum gefurcht **australis** Lacord.3. K. eingesenkt **sulcicollis** Pasc.
K. gewölbt 44. Hellrotbraune Arten 5
Dunkle Arten 65. El. am Hntr. je in eine dornartige Spitze endigend, 2. Ri. im
basalen Teil platt, 3. u. 7. im apicalen Teil erhöht **fraterna** Kln.
El. ungedornt, 2. Ri. im apicalen Teil platt, 3. u. 7. nicht er-
höht **novae-guineae** Senna

6. 3. u. 4. Fgl. länger als die folgenden, 9. u. 10. einzeln nicht länger als das 8. **piceonitens** Kln.
 3. u. 4. Fgl. nicht länger als die folgenden, 9. u. 10. Fgl. einzeln länger als das 8. **barbata** Kln.

Hadramorphocephalus Kln.

Nur eine Art **Calvei** Pow.

Micramorphocephalus Kln.

1. Hinterecken des K. gerundet, Pror. verlängert, leistenförmig schmal, Sp. mit Haarbüscheln an den S., F. nach der Sp. zu keulig verdickt **soror** Kln.
 Hinterecken des K. weit über den Hals gezogen, Pror. nicht sehr verlängert, nicht leistenförmig verschmälert, an der Sp. ohne Haarbüschel, F. schlank, walzig 2
 2. F. schlank, die Gl. länger als breit **frater** Kln.
 F. gedrunken, die Gl. breiter als lang **consobrinus** Kln.

Acramorphocephalus Kln.

1. Schk. u. Schn. breit, erweitert **robustus** Kln.
 Schk. u. Schn. von verschiedener Gestalt, aber niemals erweitert, Schk. immer keulig 2
 2. El. gerippt=gefurcht **costipennis** Calabr.
 El. glatt 3
 3. Fgl. 3-8 walzig, 3. Gl. länger als die übrigen . **stabilis** Kln.
 Fgl. 3-8 nach außen gebogen, nodos, 3. Gl. sehr lang . 4
 4. Vdschk. an der Unters. des Stieles buchtig erweitert, die anderen Schk. norm., Thorax u. El. wenigstens teilweise behaart **Gebieni** Kln.
 Vdschk. nicht buchtig erweitert, Schk. klobig, keulig, Keule sehr gr. u. dick, Thorax u. El. unbehaart . **Schoutedeni** Kln.

Fortsetzung folgt.

Die Schmetterlings-Fauna (Macrolepidoptera) von Mühlhausen in Thür. und Umgebung.

Von Gustav Hobert in Mühlhausen in Thür.

Berichtigung.

Seite 52: *Gonepteryx rhamnii* L. Die Falter überwintern.

Seite 112: *Acronycta abscondita* Tr. ist zu streichen. Es hat sich nachträglich herausgestellt, daß die aus Raupen gezogenen Sammlungsstücke sich sehr stark der bezeichneten Art nähern, aber bei genauester Feststellung jedoch nichts weiter darstellen als besondere Stücke der *Acronycta euphorbiae* F.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1930/31

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: [Bestimmungstabelle der Brenthidae.
\(Fortsetzung\) 307-308](#)