

Entomologische Zeitschrift

Centralorgan des Intern. Entomologischen Vereins / E.V. / Gegründet 1884

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Entomologen u. Naturforscher.

Vereinigt mit **Insektenbörse** • Stuttgart

Für den Gesamtbezug der vereinigten Zeitschriften zahlen die Mitglieder des Internationalen Entomologischen Vereins in Deutschland und Deutsch-Oesterreich vierteljährlich im voraus 3.75 R. • Mk. auf Postscheck-Konto Nr. 48269 Amt Frankfurt a. M. Für das gesamte Ausland der gleiche Betrag und 60 Pfennig Auslandsporto = 4.35 R. • Mk. oder entsprechende Währung.

Geschäftsstelle: Frankfurt a. M., Wiesenau 52 / **Redaktion:** Otto Meißner, Potsdam, Silfstrabe 2

Inhalt: Entom. Chronik — A. Hepp, Noctuiden von Frankfurt am Main und Umg. (Forts.) — F. Heydemann, Die Arten der *Hydroecia* (*Apamea*) *nictitans* L.-Gruppe (Lep., Noct.) (Mit 6 Tafeln, 2 beiliegend) — K. Uffeln, Aberrationen von *Euchloë cardamines* — Fr. Schnack, Nachtfalterfang in Madagaskar — Kleine Mitteilungen — Auskunftsstelle — Bücherbesprechung.

Entomologische Chronik.

Von der **Tauschbörse der Groß-Berliner Entomologischen Vereine** liegen uns mehrere Berichte vor, aus denen wir zusammenfassend über den Verlauf wie folgt berichten: Die, von den vier entomologischen Vereinen Groß-Berlins, wie jedes Jahr am ersten Sonntag im Dezember, veranstaltete Börse war von 278 Entomologen besucht, darunter eine ganze Anzahl auswärtiger Entomologen. Gewöhnliches, gutes und seltenes Material von palaearkt. und exotischen Schmetterlingen war zu mäßigen Preisen reichlich vorhanden, Käfer und andere Insektengruppen waren weniger vertreten. Es herrschte reger Tauschverkehr, von Hamburg angebotene *subcoerulea* Stgr. und *onychima* H.-S. fanden willige Abnehmer. Begehrt und gut abgesetzt wurden Parnassier der verschiedensten Fluggebiete, auch der neue *tauricus* Bryk und Eisner, die neue Form *Sm. ocellata flavescens* Neum. war in schön gezogenen ♂♀ angeboten, des hohen Preises wegen aber war geringer Umsatz. *Noctuiden* waren reichlich vorhanden. Eine pal. *Sphingiden*-Sammlung, aus einem Nachlaß stammend, mit sehr guten und seltenen Arten, wie *Akb. davidi*, *Leuc. lineata*, *Rhn. mongolica* fand trotz Einzelverkaufs merkwürdigerweise keinen Liebhaber. Eine schöne Aberration von *Luc. virens* mit 3-4 mm langen tiefgelben Strahlen vom Außenrand der Vflg. zur Flügelmitte, erregte wohl Aufmerksamkeit und einige Angebote, ging aber einige Wochen später in eine bekannte Abnormitäten-Sammlung über. Exoten waren sehr zahlreich vorhanden, besonders *Ornithopteren*, *Papilio*, *Morpho*, *Saturniden* usw. Auffallend wenige Schulfalter lagen in guter Quali-

tät vor, wurden aber garnicht gefragt. Interessant waren auch die angebotenen Höhlenkäfer. Die Berliner Börsen geben kein volles Bild über den umfangreichen Tausch- und Kaufverkehr des großen Sammlerkreises, weil gutes und seltenes Material meist schon außerhalb der Börsen von den kaufkräftigen Sammlern direkt und auch in den vielen rührigen Vereinen aufgenommen wird. Sonst lag an pal. Käfern wenig vor, doch fand das Wenige guten Absatz, besonders *Sap. perforata* und *punctata* wurden restlos abgesetzt. Es würde natürlich zu weit führen, sich über das Gebotene genauestens auszulassen; dem Material entsprechend, gibt es stets Zufriedene und Unzufriedene bei solchen Veranstaltungen, die allgemein gesehen, als durchaus gelungen anzusprechen sind und, außer dem Hauptzweck, die nähere Bekanntschaft der Sammler untereinander vermitteln. Das Gebotene war reichhaltig, in guter Qualität und die Preise mäßig.

Zusammenstellung der Noctuiden, Cymatophoriden und Brehiden aus der Umgebung von Frankfurt am Main.

Von A. Hepp, Frankfurt am Main.

Fortsetzung

177. *Calocampa vetusta* Hb. Stets am K. in mehreren Stücken M. IX., A. X. Nidda bei Heddernheim, Babenhäuser Landstraße. VfL.OS. tief dunkelgelb, Innenrandpartie mehr weniger rotbraun, Ringmakel fehlt oder nur schwach angedeutet, Nierenmakel hell mit schwarzer Randzeichnung und ein oder zwei schwarzen Keilen nach der Wellenlinie. Diese je nach der Ausdehnung der rotbraunen Färbung mehr weniger hervortretend. Vorderrand mit einzelnen weißen Punkten. Hfl.OS. vor den Fransen mit einer Reihe schwarzer Punkte, die *exoleta* nicht hat. - Koch ohne Fundplatz. - Wiesbaden, Falter im VIII. und im Frühjahr auf Salweide. Rss. - Mainz, häufig in Weinbergen, R. dort an Unkraut. Rch. - Sp. Taf. 47, Fig. 13.

178. *C. exoleta* L. Mit der vorigen am K. X., aber spärlicher. VfL.OS. bedeutend dunkler angelegt. Am Vorderrand mit schwarzem Feld, am Innenrand grauweiß aufgehellt. Ringmakel länglich ausgezogen, Nierenmakel doppelt schwarz umzogen mit schwarzem Schatten. Saumfeld hell mit zwei schwarzen Keilen. Adern leicht schwarz getüpfelt. Hfl.OS. dunkelgrau mit deutlich schwarzen Adern. - Crontal (Ts.) Sauerbornwald. Bo. - Ueberall, weniger selten als die vorige. Koch. - Wiesbaden, Rss. erwähnt, daß die R. „Selbstmord“ begeht, namentlich bei ungenügendem Futter. Er fand sie am Splitter einer Holzschachtel in der Mitte geknickt zu beiden Seiten tot herabhängend. - Nach meinen Beobachtungen sind die R. stark parasitiert. Daran werden sie hauptsächlich zu Grunde gehen. Hepp. - Ueberall nicht selten, beide Arten am K. Rch. - Sp. Taf. 47, Fig. 14.

179. *Xylomiges conspicillaris* L. Lokal und mir nur aus dem Oberurseler Stadtwald bekannt. 1 St. übereinstimmend mit *intermedia* Tutt bei Sp. Taf. 47, Fig. 16. - Gf. erzog e. o. und erhielt nur die Form *melaleuca*. VfL.OS. einfarbig dunkelrotbraun mit heller Wellenlinie und gleichfarbigem Innenrand. Adern schwarz gesprenkelt. 4 Falter davon in meiner Slg. - Soden (Ts.), Altenhainer Tal. Bo. - Falter an Baumstämmen, Isenburg, Hartweg, Schwanheim, Seckbach. - Wiesbaden, einzeln. Rss. - Rheingauer Taunus (Dr. Bastelberger) Rch.

180. *Xyllocampa areola* Esp. Vereinzelt an Baumstämmen, Planken und Zäunen E. III., IV. Kirdorf (Ts.), (Hbgr.), Oberurseler Stadtwald (Gf.),

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1930/31

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Entomologische Chronik. 341-342](#)