

**Beiträge zur Schmetterlingsfauna der Grafschaft Glatz
mit besonderer Berücksichtigung des Kressenbachtals.**

G. Guder, Voigtsdorf bei Habelschwerdt.

Fortsetzung.

Hesperiidae.

62. *Hesperia malvae* L. 9. bis 27. 5. Ueberall gewöhnlich.
63. *Thaunaos tages* L. 28. 4. bis 2. 6. Wie vorige Art.
64. *Adopaea lineola* O. 24. 7. bis 3. 8. Vereinzelt.
65. *Augiades comma* L. 12. 7. bis 16. 8. Wie vorige Art.
66. *A. sylvanus* Esp. 30. 6. bis 14. 7. Ueberall, doch nicht häufig.

Sphingidae.

67. *Acherontia atropos* L. Ein ♀ am 11. 5. 26. in Voigtsdorf am Balken in einem Sägewerk sitzend gefunden.
68. *Smerinthus populi* L. 28. 5. bis 30. 7. Häufig im ganzen Gebiet.
69. *S. ocellata* L. 23. 5. bis 9. 8. Wie vorige Art.
70. *Deilina tiliae* L. 25. 5. bis 12. 7. Wie vorige Art. *ab. centripuncta* Clk. geschlüpft aus gef. Raupe am 19. 4. 26. **ab. bipuncta* Clk. Voigtsdorf; 22. 5. 24. Anflug zum ♀.
71. *Sphinx ligustri* L. 7. 6. bis 22. 7. Wie vorige Art.
72. *Protoparce convolvuli* L. 20. bis 29. 9. Voigtsdorf. Hammer, Spätenwalde. Vereinzelt, jährweise häufig.
73. *Hyloicus pinastri* L. 20. 6. bis 28. 7. Im ganzen Gebiet, doch nicht gewöhnlich.
74. *Deilephila galii* Rott. 15. 6. bis 14. 7. Im ganzen Gebiet. Bevorzugt höhere Lagen. In den Jahren 1926 und 1928 im hiesigen Gebiet der häufigste Schwärmer, sowohl als Rp. wie auch als Falter. Rp. nur auf Weidenröschen.
75. *Chaerocampa elpenor* L. 15. 6. bis 18. 7. Im ganzen Gebiet verbreitet, doch nicht häufig.
76. *Metopsilus porcellus* L. 25. 5. bis 25. 7. Wie vorige Art.
77. *Macroglossa stellatarum* L. 5. 7. bis 21. 9. Ueberall, jährweise häufig, besonders 1928.
78. *Hemaris fuciformis* L. Am 11. und 14. 6. 24. mehrere Exemplare in Hüttenguth, an Blüten saugend, gefangen.
79. *H. scabiosae* Z. Am 13. 6. 24. 1 ♂ in Hüttenguth.

Notodontidae.

80. *Cerura furcula* Cl. 1 ♂ am 26. 8. 29. in Voigtsdorf am Licht.
81. *C. bifida* Hb. 1 ♂ in Voigtsdorf am 1. 7. 26. am Licht.
82. *Dicranura ermínea* Esp. 1922/23 im Mai ziemlich häufig in Voigtsdorf, meist an Stämmen, vereinzelt am Licht. 1924 selten. 1925 nur 1 Stck. Seither fehlend.
83. *D. vinula* L. 15. 5. bis 18. 7. Häufig im ganzen Gebiet.

84. *Stauropus fagi* L. Am 26. 8. 28. als Raupe gefunden.
85. *Drymonia trimacula* Esp. v. *dodonaea* Hb. 1 Stck. am 10. 6. 24. in Voigtsdorf am Licht.
86. *Pheosia tremula* Cl. 3. 5. bis 29. 7. Vereinzelt am Licht.
87. *Ph. dictaeoides* Esp. 24. 5. bis 30. 7. Häufiger wie vorige Art. Licht, Zäunen, Mauern.
88. *Notodonta dromedarius* L. 1 ♂ am 16. 7. 28. in Voigtsdorf am Licht.
89. *N. ziczac* L. 16. 5. bis 9. 6. Häufig an Zäunen, Mauern, Licht.
90. *N. tritophus* Esp. 1 ♂ am 11. 8. 28. in Voigtsdorf am Licht.
91. *Odontosia carmelita* Esp. 29. 4. und 4. 5. 23. in Voigtsdorf am Licht.
92. *Lophopteryx camelina* L. 3. 6. bis 30. 7. Häufig am Licht.
- **ab. giraffina* Hb. 9. 6. 28. Voigtsdorf.
93. *Pterostoma palpina* L. 3. 6. bis 4. 8. Häufig am Licht.
94. *Ptilophora plumigera* Esp. 20. 10. bis 14. 11. Häufig am Licht, an Wänden. Sehr variabel. Ich besitze zeichnungslose bis rauchschwarz überzogene Stücke.
95. *Phalera bucephala* L. 17. 5. bis 5. 7. Häufig, bes. am Licht. Einer ex l. Zucht entstammt *ab. stephani* Ernst. (12. 5. 24.)
96. *Pygaera curtula* L. 30. 5. bis 4. 8. Häufig am Licht.
97. *P. pygra* Hufn. 24. 7. bis 13. 8. Wie vorige Art.

Lymantridae.

98. *Orgyia antiqua* L. 18. 8. bis 23. 9. Nicht gerade häufig. ♂♂ bei Tage fliegend.
99. *Dasychira fascelina* L. 20. 6. bis 16. 7. Häufig am Licht. Raupen auf Klee.
100. *D. pudibunda* L. 30. 5. bis 10. 6. Wie vorige Art.
101. *Porthesia similis* Fssl. 1 ♂ am 16. 7. 28. in Voigtsdorf am Licht.
102. *Stilpnotia salicis* L. 1 ♂ am Licht in Voigtsdorf, 17. 7. 25. 1 ♂ in Hüttenguth, 3. 7. 26.
103. *Lymantria dispar* L. 1 ♂ in Voigtsdorf, 11. 6. 23.
104. *L. monacha* L. 22. 8. bis 14. 9. Im ganzen Gebiet, jedoch vereinzelt. 1921 und 1922, noch 1923 Masseninvasion aus dem benachbarten Böhmen. Stammform selten; häufiger dunkle Formen. *ab. nigra* Fr., *ab. eremita* O., *ab. atra* Lst.

Lasiocampidae.

105. *Malacosoma neustria* L. 17. 7. bis 4. 8. Häufig als Raupe wie als Falter.
106. *Trichiura crataegi* L. 22. 8. bis 18. 9. Voigtsdorf. Nicht gerade häufig, Licht. *f. ariae* Hbn. mehrmals unter der Stammform.
107. *Poeliocampa populi* L. 22. 9. bis 2. 11. Häufig am Licht.

108. *Eriogaster lanestris* L. 27. 3. bis 6. 4. Oefters am Licht. Häufiger als Raupe. (Kirsche.)

109. *E. catax* L. 1 ♂ am 17. 10. 27. in Voigtsdorf am Licht.

110. *Lasiocampa quercus*. L. 7. 6. bis 7. 7. Im ganzen Gebiet. Mehrfach am Licht, auch ♀♀. ♂♂ meist bei Tage fliegend. Raupen auf Heidelbeeren.

111. *Macrothylacia rubi* L. 18. 5. bis 24. 6. Im ganzen Gebiet. ♂♂ wie ♀♀ häufig am Licht. Die ♀♀ legen gern schon in unmittelbarer Nähe der Lichtquelle ihre Eier ab. Raupen im Herbst massenhaft, bes. auf Klee. Im Frühjahr selten zu finden. *ab. grisea* Tutt. nicht selten.

112. *Cosmotriche potatoria* L. Ein ♂ am Licht in Voigtsdorf am 19. 7. 23.

113. *Dendrolimus pini* L. 15. 7. bis 15. 8. Im ganzen Gebiet, aber vereinzelt. Mehrfach am Licht.

Endromididae.

114. *Endromis versicolora* L. 10. bis 24. 4. Voigtsdorf, in Birken-schlägen, nicht gerade häufig. ♂♂ fliegen sehr weit zum ♀.

Lemoniidae.

115. *Lemonia taraxaci* Esp. 1. 8. bis 4. 9. Häufig am Licht, nur ♂♂.

116. *L. dumii* L. 1 ♂ in Voigtsdorf am 15. 10. 22. Mehrfach als Raupe gefunden. 1 ♂ am 25. 9. 30. auch im Distr. 66 a, Forstbezirk Friedrichsgrund, 780 m, gefangen.

Saturniidae.

117. *Saturnia pavonia* L. 11. 4. bis 10. 6. Häufig im ganzen Gebiet. ♂♀ in Kopula öfters an Wänden sitzend. Anflug zum ♀ schon am Vormittag. Raupen auf Heidelbeeren. *ab. macropis* Schn. *ab. reducta* Schn. *ab. deflexa* Schn.

118. *Aglia tau* L. 11. bis 23. 5. Voigtsdorf. Mehrere ♂♂ am Licht. Meistens Anflug zum ♀.

Drepanidae.

119. *Drepana falcataria* L. 9. 6. bis 8. 8. Voigtsdorf. Häufig am Licht.

Noctuidae. ¹⁾

120. *Panthea coenobita* Esp. 1 ♂ am 17. 6. 29. am Licht.

121. *Trichosea ludifica* L. 1 ♂ geschlüpft am 28. 5. 30. aus einer von Eberesche geklopften Raupe.

122. *Demas coryli* L. 9. 4. bis 13. 5. und 2. 6. bis 4. 8. Mehrfach am Licht.

123. *Acronicta leporina* L. Je 1 Stck. am 5. 7. 25. und 16. 7. 28. am Licht.

124. *A. aceris* L. 21. 6. bis 9. 7. Vereinzelt am Licht.

¹⁾ Wo nichts besonderes erwähnt, gilt Voigtsdorf als Fundort.

125. *A. megacephala* F. 4. bis 14. 7. Häufig am Köder und Licht.
126. *A. tridens* Schiff. 1 Falter 6. 7. 22. in Hüttenguth.
127. *A. psi* L. 1. bis 27. 7. Häufig am Licht und Köder.
128. *A. auricoma* F. 1 Falter am 31. 5. 30. am Licht.
129. *A. euphorbiae* F. 13. 5. 23. ein Falter am Licht.
130. *A. rumicis* L. 28. 6. bis 20. 8. Mehrfach am Licht und Köder.
131. *Craniphora ligustri* F. 22. 6. bis 20. 7. Häufig, Licht u. Köder.
132. *Agrotis strigula* Thnb. 6. 7. bis 14. 8. Vereinzelt am Licht.
133. *A. augur* F. 18. 6. bis 16. 8. Häufig am Licht und Köder.
134. *A. pronuba* L. 30. 6. bis 13. 8. Häufig am Köder und Licht.
- ab. innuba* Fr.
135. *A. comes* Hb. Je 1 Stck. 7. 8. 25. in Hammer an einem Bretterstoß sitzend und 19. 8. 27. in Voigtsdorf am Licht.
136. *A. triangulum* Hufn. 1 Stck. 26. 6. 28. am Licht, 7. 7. 30. am Köder.
137. *A. baja* F. 28. 6. bis 17. 8. Häufig am Licht und Köder.
138. *A. c = nigrum* 12. 6. bis 31. 8. und 12. bis 20. 10. Häufig am Licht, auch Köder.
- *139. *A. stigmatica* Hb. 1 ♂ 18. 8. 28. am Licht.
140. *A. xantographa* Schiff. 1 ♂ 16. 8. 22. am Licht.
141. *A. rubi* View. 1 ♂ Juli 1922 in Hüttenguth.
142. *A. brunnea* F. 6. 7. bis 9. 8. Häufig am Licht und Köder.
143. *A. primula* Esp. *f. conflua* Fr. 22. 6. bis 29. 7. Nicht selten am Köder und Licht.
144. *A. depuncta*. L. 20. 7. bis 20. 8. Nicht selten am Licht und Köder.
145. *A. cuprea* Hb. 3. bis 20. 8. Mehrfach am Licht.
146. *A. plecta* L. 24. 5. bis 9. 7. Nicht selten am Licht.
147. *A. putris* L. Je 1 Falter am 15. 6. und 6. 7. 26. am Licht.
148. *A. cinerea* Hb. 13. 5. bis 3. 7. Nicht selten am Licht.
149. *A. exclamationis* L. 23. 5. bis 24. 7. Häufig am Licht und Köder.
150. *A. ypsilon* Rott. 5. 7. bis 20. 10. Mehrfach am Licht u. Köder.
151. *A. segetum* Schiff. 20. 6. und 1. 7. 30. Mehrfach am Licht und Köder.
152. *A. prasina* F. Ein Falter 7. 8. 30. am Licht.
153. *A. occulta* L. Ein Falter 23. 7. 27. am Licht.
154. *Dachnobia rubricosa* F. 7. 4. bis 16. 5. Häufig am Licht und Weidenkätzchen.
155. *P. leucographa* Hb. 14. 4. bis 9. 3. Vereinzelt am Licht und Weidenkätzchen.

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1932/33

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Guder G.

Artikel/Article: [Beiträge zur Schmetterlingsfauna der Grafschaft Glatz mit besonderer Berücksichtigung des Kressenbachtals. Fortsetzung. 41-44](#)