

**Beiträge zur Schmetterlingsfauna der Grafschaft Glatz
mit besonderer Berücksichtigung des Kressenbachtals. 1**

G. Guder, Voigtsdorf bei Habelschwerdt.

Fortsetzung.

Noctuidae. 1)

156. *Charaeas graminis* L. 23. 7. bis 24. 8. Häufig Licht und Köder. **ab. albipuncta* Sven. nicht selten.
157. *Epineuronia popularis* F. 18. 8. bis 17. 9. Häufig am Licht.
158. *E. cespitis* F. 13. 7. bis 6. 9. Nicht selten am Licht.
159. *Mamestra leucophaea* View. Je 1 Stck. am 21. 5. 23. und 2. 6. 29. am Licht.
160. *M. advena* F. 5. bis 22. 7. Mehrfach am Licht und Köder.
161. *M. tincta* Brahm. 5. 7. bis 1. 8. Licht und Köder, vereinzelt.
162. *M. nebulosa* Hufn. 4. 6. bis 17. 7. Häufig am Licht und Köder, auch an Stämmen.
163. *M. brassicae* L. 29. 5. bis 21. 6. Am Licht und Köder. Gern in Zimmern.
164. *M. persicariae* L. 16. 6. bis 18. 7. Mehrfach am Licht.
165. *M. oleracea* L. 1. und 3. 7. 30. vereinzelt am Köder.
166. *M. genistae* Bkh. 9. und 22. 6. 28., je ein Stck. am Licht.
167. *M. dissimilis* Knoch. 17. 5. 26. und 29. 7. 28. je 1 Falter am Licht.
168. *M. thalassina* Rott. 3. bis 27. 6. und 26. 9. bis 2. 10. Nicht selten am Licht.
169. *M. contigua* Vill. 4. 6. bis 14. 7. Vereinzelt am Licht und Köder.
170. *M. pisi* L. 24. 5. bis 14. 7. Häufig am Licht, vereinzelt am Köder.
171. *M. trifolii* Rott. 1 ♂ 6. 7. 30. am Licht.
172. *M. glauca* Hb. 21. 5. 23. und 2. 6. 29. je 1 Falter am Licht.
173. *M. dentina* Esp. 30. 5. bis 26. 6. Häufig am Licht. **ab. leucostigma* Haw. 17. 5. 23. *ab. hilaris* Zett. 9. 6. 28. *ab. latenai* Pier. fast überwiegend.
174. *M. reticulata* Vill. 11. 6. bis 6. 7., vereinzelt am Licht.
175. *M. serena* F. 15. 5. bis 9. 6., vereinzelt am Licht. *ab. obscura* Stgr. 21. 5. 23.
176. *Dianthoecia nana* Rott. 29. 5. und 2. 6. 29. und 2. 6. 30. mehrmals am Licht.
177. *D. cucubali* Fuessl. 29. 6. bis 31. 8. Licht und Köder.
178. *D. capsincola* Hb. 1 Stck. 13. 5. 23. in Hüttenguth. 1. 7. 26. am Licht in Voigtsdorf und 30. 5. 30. am Köder je 1 Stck.

1) Wo nichts besonderes erwähnt, gilt Voigtsdorf als Fundort.

179. *Bombycia viminalis* F. 17. 7. bis 22. 8. öfters am Licht.
**ab. obscura* Stgr. selten unter der Art.
180. *Miana strigilis* Cl. 24. 6. bis 23. 7. Häufig am Licht und Köder. *ab. aethiops* Hw. häufig unter der Art.
181. *Diloba caeruleocephala* L. 3. bis 25. 10. vereinzelt am Licht. Sitzt gern an Baumstämmen.
182. *Apamea testacea* Hb. 29. 7. bis 11. 9. vereinzelt am Licht.
183. *Hadena porphyrea* Esp. 3. 8. bis 2. 10. Nicht selten am Licht.
- *184. *H. furoa* Hb. 1 Stck. 22. 7. 30. am Licht.
185. *H. sordida* Bkh. 5. 6. 26. 1 Falter am Licht.
186. *H. gemmea* T. 14. 8. 28., 29. 9. und 18. 10. 30. je 1 Stck. am Licht.
187. *H. monoglypha* Hufn. 1. 7. bis 1. 9. Häufig am Licht und Köder. *infusata* Wb. vereinzelt.
188. *H. lateritia* Hufn. 2. bis 28. 7. Häufig am Licht und Köder.
189. *H. lithoxylea* F. 5. bis 22. 7. 30. Häufig am Köder.
190. *H. rurea* F. 24. 6. bis 27. 7. Stammform selten; **ab. alopecurus* Esp. dagegen häufig.
- *191. *H. gemina* Hb. *ab. remissa* Tr., je 1 Stck. am 17. 7. 26. und 27. 6. 28. am Licht.
192. *H. unanimitis* Tr. 1 Stck. 28. 7. 30. am Licht.
193. *H. secalis* L. 23. 7. bis 11. 8. Licht und Köder. Stammform vereinzelt; häufiger die *ab. nictitans* Esp. **ab. leucostigma* Esp. vereinzelt.
194. *Polia xanthomista* Tr. *ab. nigrocincta* Tr. 3. bis 19. 9. 30., mehrmals an Wänden sitzend gefunden. Ein Stück steht der typischen Form sehr nahe.
195. *P. chi* L. 30. 8. bis 15. 9., häufig am Licht, auch an Steinen und Bäumen.
196. *Dasypolia templi* Thnbg. Die Noctuide scheint in der Grafschaft Glatz häufiger zu sein als bisher angenommen. Ich erbeutete am 14. 4. 23. 2 Stck. am Licht. Weitere Funde konnte ich verzeichnen am 21. und 27. 10. 27. (Licht), 5. 5. 29. (Haustür), 16. 10. 29., 16. 4. und 19. 4. 30. (Licht).
197. *Brachionycta sphinx* Hufn. 22. 9. bis 20. 10. Häufig am Licht.
198. *Miselia oxyacanthae* L. 17. 9. bis 25. 10. am Licht, auch an Baumstämmen.
199. *Dipterygia scabriuscula* L. 1 Stck. am Licht 16. 8. 30.
200. *Hyppa rectilinea* Esp. 1 Stck. 6. 6. 25. am Licht.
201. *Trachea atriplicis* L. In mehreren Exemplaren am 10. 6. 23. und 24. 5. 26. am Licht gefangen.

202. *Euplexia lucipara* L. 14. 5. bis 26. 7. Häufig am Licht und Köder.
203. *Brotolomia meticulosa* L. 14. 4. 30. an Weidenkätzchen, sonst 17. 8. bis 25. 10. nicht selten am Licht
204. *Mania maura* L. Am 15. — 16. und 21. 7. 30. je 1 Stck. an einem Schuppen sitzend gefunden.
205. *Naenia typica* L. 26. 6. bis 7. 8. Häufig am Licht und Köder.
206. *Hydroecia nictitans* Bkh. 17. 7. bis 5. 9. Nicht selten am Licht und Köder. Vereinzelt die *ab. erythrostigma* Hw. und *ab. lucens* Frr.
207. *Gorthyna ochracea* Hb. 2 Stück am 22. 9. 28. am Licht.
208. *Leucania impura* Hb. 3. 7. 26., 23. 7. 28., 20. 7. 30. vereinzelt am Licht und Köder.
209. *L. pallens* L. 13. bis 29. 7. Häufig am Licht und Köder.
210. *L. obsoleta* Hb. 1 Stück 13. 8. 28. am Licht.
211. *L. comma* L. 23. 5. bis 4. 7. Häufig am Licht und Köder.
212. *L. conigera* F. 19. 6. bis 1. 8. Wie vorige Art.
213. *L. albipuncta* F. 10. 9. 30. in mehreren Exemplaren am Licht gefangen.
214. *L. lithargyrea* Esp. 5. 7. 30. mehrfach am Köder, 17. 7. 30. in 3 Exemplaren am Licht.
215. *Mythimna imbecilla* F. 18. 6. bis 2. 7. nicht gerade selten am Licht.
216. *Grammesia trigrammica* Hufn. 23. 5. bis 2. 7. Eine der häufigsten Noctuiden am Licht und Köder. Am 17. 6. 30. habe ich an den Köderschnüren annähernd 100 Stck. gezählt.
217. *Caradrina quadripunctata* F. 9. 6. bis 22. 9. Gemein am Licht und Köder.
218. *C. alsines* Brahm. 24. 6. bis 8. 8. Häufig am Licht und Köder.
219. *C. morpheus* Hufn. 1 Stück 29. 7. 28. am Licht.
220. *C. taraxaci* Hb. 1 Stück 6. 7. 23. am Licht.
221. *Rusina umbratica* Goeze. 15. 6. bis 11. 7. Häufig am Licht und Köder.
222. *Amphipyra tragopogonis* L. 17. 7. bis 20. 8. Nicht selten am Licht und Köder. Ein verspätetes Stück noch 3. 10. 28.
223. *A. pyramidea* L. 1 Stück 16. 8. 30. am Köder.
224. *Taeniocampa gothica* L. 3. 4. bis 8. 5. Gemein an Weidenkätzchen und Licht.
225. *T. pulverulenta* Esp. 11. 4. bis 7. 5. Wie die vorige Art, jedoch nicht so häufig.
226. *T. stabilis* View. 14. 4. bis 13. 5. vereinzelt am Licht und Weidenkätzchen.
- *227. *T. populeti* Tr. 21. 3. bis 8. 5. Wie die vorige Art.

228. *T. incerta* Hufn. 21. 3. bis 7. 5. Wie die vorige Art. Gemein. Sehr variabel. **ab. atra* Tutt. selten unter der Art.
229. *T. gracilis* F. 12. 4. bis 9. 5. Wie die vorige Art, doch seltener.
230. *T. munda* Esp. 15. 4. bis 7. 5. Wie die vorige Art.
231. *Panolis griseovariegata* Goeze. 13. 4. bis 13. 5. Nicht selten am Licht, auch an Weidenkätzchen.
232. *Calymnia trapezina* L. 23. 8. 25. und 30. 8. 29. am Licht gefangen.
233. *Cosmia paleacea* Esp. 19. 7. bis 17. 9. Vereinzelt am Licht.
234. *Plastenis retusa* L. 1 Stck. 16. 8. 30. am Licht.
235. *Orthosia nitida* F. 1 Stck. im August 1928 in Brand im Graszitend gefunden. Ein 2. Stck. 3. 10. 28. in Voigtsdorf am Licht.
236. *O. pistacina* F. 1 Stück 23. 9. 30. am Licht.
237. *O. litura* L. 1 Stück August 1928 in Brand.
238. *Xanthia lutea* Ström. 3. 9. 27. und 10. 9. 29. am Licht erbeutet.
239. *X. fulvago* L. 14. und 16. 8. 28. in mehreren Exemplaren am Licht.
240. *Orrhodia pau-punctatum* Esp. 13. 3. bis 7. 5. Letztes Stück am 5. 6. Nicht selten am Licht, auch an Weidenkätzchen.
241. *O. vaccinii* L. Ueberwinternde Stücke vom 17. 3. bis 13. 5., sonst Oktober. Häufig am Licht und Köder. **ab. nigra* Bang.=H. selten unter der Art. (4. 5. 29.)
242. *Scopelosoma satellitia* L. 11. 9. bis 25. 10., überwintert bis 11. 4. Häufig am Licht, zuweilen Köder. *ab. brunnea* Lp. häufiger wie die Stammform. **ab. albipuncta* Strand. nicht selten.
243. *Xylina socia* Rott. 29. 3. 27. und 24. 4. 30. am Licht
244. *X. furcifera* Hufn. 5. 4. bis 7. 5. Häufig am Licht, auch an Weidenkätzchen.
245. *X. ornithopus* Rott. 1 Stck. 6. 9. 30. am Licht.
246. *Calocampa vetusta* Hb. 3. 3. 26. und 3. 10. 28. am Licht, 8. 11. 24. an einem Baumstamm sitzend gefunden.
247. *C. exoleta* L. 1. Stck. 11. 4. 28. am Licht.
248. *Xylomyges conspicillaris* L. *ab. melaleuca* View. 1 Stck. 4. 5. 25. am Licht.
249. *Calophasia lunula* Hufn. 22. 5. 25. um die Mittagszeit gefangen.
250. *Cucullia verbasci* L. 13. 5. bis 14. 7. Nicht selten am Licht.
251. *C. umbratica* L. 8. 6. bis 6. 7. Wie die vorige Art.
252. *C. lactucae* Esp. 9. 6. bis 9. 7. Wie die vorige Art.

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1932/33

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Guder G.

Artikel/Article: [Beiträge zur Schmetterlingsfauna der Grafschaft Glatz mit besonderer Berücksichtigung des Kressenbachtals. 89-92](#)