

**Beiträge zur Schmetterlingsfauna der Grafschaft Glatz
mit besonderer Berücksichtigung des Kressenbachtales.**

G. Guder, Voigtsdorf bei Habelschwerdt.

Fortsetzung.

253. *Anarta cordigera* Thnbg. 1 Stck. 25. 5. 29. in Hammer.
(Im Wald aufgescheucht).

254. *Heliaca tenebrata* Sc. 9. 5. bis 4. 6. Nicht selten in Waldlichtungen.

255. *Heliothis dipsacea* L. 1 Stck. am 7. 8. 30.

256. *Pyrrhia umbra* Hufn. 5. und 7. 7. 30. häufig am Köder erbeutet.

257. *Acontia luctuosa* Esp. 1 Stck. 19. 6. 21. am Licht.

*258. *Erestria fasciana* L. 1 Stck. 13. 7. 29. am Licht.

259. *Prothymnia viridaria* Cl. In Anzahl am 26. 5. 29. in Waldlichtungen.

260. *Scoliopteryx libatrix* L. Ueberwinternd bis 16. 4. am Licht und Weidenkätzchen, sonst 2. bis 23. 7. am Licht und Köder. Sitzt gern an Mauern.

261. *Abrostola triplasia* L. 7. 9. 27. am Licht in 2 Exemplaren gefangen.

262. *A. tripartita* Hufn. 14. 5. bis 10. 6. Nicht selten am Licht.

263. *Plusia moneta* F. 30. 7. 27. in Anzahl am Licht erbeutet.

264. *Pl. chrysitis* L. 25. 6. bis 4. 9. Häufig am Licht.

265. *Pl. bractea* F. 1 Stck. in Hammer am 8. 8. 25.; ein 2. Exemplar in Voigtsdorf am Licht am 28. 7. 27.

266. *Pl. festucae* L. 1 Stck. 12. 8. 29. am Licht.

267. *Pl. pulchrina* Hw. 18. 6. bis 1. 8. Nicht selten am Licht.

268. *Pl. gamma* L. 30. 5. bis 20. 10. In mehreren Generationen. Gemein. (Licht und Köder, und bei Tage.)

269. *Euclidia mi* Cl. 12. 5. bis 2. 6. Häufig auf Wiesen und Schonungen.

270. *E. glyphica* L. 24. 5. bis 11. 6. Wie die vorige Art.

271. *Catocala fraxini* L. Sehr häufig im September 1924. Seit der Zeit seltener. Von 1927 bis 29. ganz verschwunden. Vom 17. 9. 30. ab wieder zahlreich aufgetreten. Meist an Baumstämmen, selten am Köder.
ab. moerens Fchs. selten.

272. *C. nupta* L. 13. bis 28. 8. Vereinzelt am Licht.

273. *Toxocampa viciae* Hb. 9. 6. bis 31. 7. Nicht selten am Licht. **ab. caecula* Stgr. selten. (15. 6. 27.)

274. *Laspeyria flexula* Schiff. 20. 7. bis 14. 8. Nicht selten am Licht, zuweilen am Köder.

275. *Epizeuxis caloaria* F. 29. 7. und 4. 8. 30. am Licht.

*276. *Parascotia fuliginaria* L. 1 Stck. 10. 7. 30. am Licht.

*277. *Zanclognatha tarsipennalis* Tr. 18. 7. 27. und 13. 8. 28. am Licht gefangen.

278. *Z. tarsicrinalis* Hbn. 1 Stck. 18. 7. 27. am Licht.

279. *Herminia tentacularia* L. 30. 6. 29. und 19. 6. 30. öfters auf Waldwegen.

280. *Bomolocha fontis* Thnb. Zwei Stck. 4. 7. 28. auf einem Waldwege erbeutet.

281. *Hypena proboscidalis* L. 25. 6. bis 29. 7. Nicht selten am Licht und Köder. Läßt sich leicht aufscheuchen.

282. *H. rostralis* L. 1 Stck. 6. 8. 30. am Licht.

Cymatophoridae.

283. *Habrosyne derasa* L. 1. bis 27. 7. häufig am Köder, vereinzelt am Licht. Flugzeit von $21\frac{1}{2}$ bis 22 Uhr.

284. *Thyatira batis* L. 6. bis 29. 7. Vereinzelt am Licht und Köder.

285. *Cymatophora or* F. 1. 6. bis 10. 7. Nicht selten am Licht und Köder.

286. *Polyptoea flavidornis* L. 27. 3. 12. 4. Häufig am Licht.

Geometridae.

287. *Geometra papilionaria* L. 5. bis 30. 7. Häufig am Licht.

288. *Thalera lactearia* L. Am 21. 5. 30. in größerer Anzahl auf Waldlichtungen, bes. Kaiserbusch, angetroffen.

289. *Acidalia similata* Thnbg. 5. 7. 30. auf einer Wiese in Voigtsdorf in Anzahl gefangen.

290. *A. bisetata* Hufn. 17. 7. bis 17. 9. Häufig am Licht, fliegt auch bei Tage.

291. *A. aversata* L. 19. 6. bis 18. 7. In allen Waldungen. Kommt gern zum Licht; auch am Köder. ab. *spoliata* Stgr. vorherrschend.

292. *A. incanata* L. Ein Falter 12. 6. 26. am Licht.

293. *A. ornata* Scop. 31. 5. bis 18. 8. Häufig. Läßt sich leicht aufscheuchen. Kommt gern zum Licht und Köder.

294. *A. immutata* L. Ein Falter 27. 6. 30. am Licht.

295. *Ephyra pendularia* Cl. Ein Falter 13. 8. 28. am Licht.

296. *Rhodostrophia* Cl. 9. 7. bis 14. 8. Häufig am Licht.

297. *Timandra amata*. L. 29. 7. bis 21. 8. Häufig an Waldrändern, kommt zum Licht und Köder.

298. *Ortholita plumbaria* F. 29. 5. bis 11. 6. In der Dämmerung auf Wiesen gefangen.

299. *O. limitata* Sc. 9. 7. bis 4. 8. Auf Waldlichtungen, kommt auch zum Licht. Am 14. 10. 30. noch 2 Stck. am Licht.
300. *O. bipunctaria* Schiff. 17. 7. bis 7. 8. Häufig an Waldrändern, auch am Licht und Köder.
301. *Odezia atrata* L. 4. bis 14. 7. Häufig auf sonnigen Wiesen. Falter variieren beträchtlich in der Größe.
302. *Anaëtis praeformata* Hb. 9. 7. bis 5. 8. An Waldrändern, an Felsen, überaus häufig am Licht. Fliegt leicht ab.
302. *A. plagiata* L. Je 1 Stck. 9. 6. 29. und 2. 6. 30. am Licht.
303. *Lobophora polycommata* Schiff. Am 4. 4. u. 7. 4. 26., sowie 15. 4. 30. am Licht gefangen.
304. *L. sertata* Hbn. 1 Stck. am 17. 9. 28. in Neuweistritz an einem Baum sitzend gefunden.
305. *L. carpinata*. Bkh. je 1 Stck 17. 5. 29. und 12. 5. 30. am Licht.
306. *Cheimatobia boreata*. Hb. Häufig im Oktober.
307. *Ch. brumata* L. wie vorige Art.
308. *Triphosa dubitata* L. 30. 7. bis 7. 9., überwinternd bis 23. 4. Häufig am Licht, verlässt aber bald die Lichtquelle, um sich zu verkriechen.
309. *Eucosmia undulata* L. Am 30. 7. 29. am Licht erbeutet.
310. *Lygris reticulata* Schiff. Je 1 Stck. am 19. 6. und 17. 7. 30. am Licht.
311. *L. prunata* L. 13. 7. bis 1. 8. Häufig in Gebüschen, Lich.
312. *L. testata* L. Am 29. 7. 27. und 4. 8. 30. am Licht gefangen.
313. *L. populata* L. 27. 7. 14. 8. Gern an Stämmen, fliegt zum Licht.
314. *Larentia dotata* L. 14. 7. bis 14. 8. Nicht selten am Licht. Fliegt auch bei Tage.
315. *L. fulvata* Forst. 21. 7. bis 14. 8. Meist zahlreich am Licht.
316. *L. ocellata* L. 10. 6. bis 17. 8. Zahlreich am Licht.
317. *L. variata* Schiff. 28. 7. bis 20. 8. Vereinzelt am Licht.
318. *L. obeliscata* Hbn. 10. 6. 28. in Brand, 19. 6. und 10. 7. 30. in Voigtsdorf am Licht gefangen.
319. *L. siterata* Hfn. 22. 9. bis 20. 10. Vereinzelt am Licht. Überwinternd bis 6. 5. angetroffen.
320. *L. truncata* Hfn. 16. 6. bis 31. 8. Häufig, besonders am Licht. **ab. perfusata* Haw. häufiger wie die Stammform.
321. *L. olivata* Bkh. Je ein Falter am 31. 7. 27. und 18. 5. 28. gefangen.
322. *L. viridaria* F. 21. 6. bis 2. 7. In Gebüschen, auch am Licht.
323. *L. fluctuata* L. 10. 6. bis 1. 8. Häufig am Licht.

324. *L. didymata* L. 18. 7. bis 26. 8. Sitzt gern an Stämmen, kommt zum Licht.

325. *L. vespertaria* Bkh. Am 8. 9. 27. und 26. 8. 28. am Licht erbeutet.

326. *L. montanata* Schiff. 4. bis 30. 6. gern an Stämmen und an Blättern; eifriger Lichtbesucher. ab. *degenerata* Prout vereinzelt.

327. *L. suffumata* Schiff. 2. bis 24. 8. Nicht selten am Licht.

*328. *L. quadrifasciata* Cl. ab. *thedenii* Lp. 30. 6. 29. ein Stück am Licht.

329. *L. quadrifasciaria* Tr. 2 Stck. am Licht 17. 7. 30.

330. *L. ferrugata* Cl. 9. 5. bis 27. 7. Häufig am Licht und Köder. ab. *unidentaria* Haw. ebenso häufig.

331. *L. spadicearia* Schiff. 1 Stck. 13. 7. 29. am Licht, 2 Stck. 18. 5. 30. auf einem Waldwege gefangen.

332. *L. dilutata* Bkh. 3. 9. bis 6. 11. Häufig am Licht. ab. *obscurata* Stgr. vereinzelt.

333. *L. autumnata* Bkh. 16. 9. bis 20. 10. Vereinzelt. am Licht.

334. *L. caesiata* Schiff. 21. 6. bis 29. 7. Nicht selten am Licht.

335. *L. cuculata* Hfn. Am 22. 5. und 23. 7. 26. am Licht gefangen.

336. *L. galata* Hb. 1 Sk. 30. 7. 25. am Licht.

337. *L. rivata* Hb. 18. 6. bis 4. 7. Meist in Gebüchen, seltner am Licht.

338. *L. sociata* Bkh. 9. 5. bis 4. 6. meist im Gebüsch, auch an feuchten Wegstellen sitzend. Eine 2. Generation vom 5. bis 12. 8. am Licht.

339. *L. albicillata* L. 1 Sk. in Hüttenguth am 21. 6. 26.

340. *L. lugubrata* Stgr. Auf einer Schonung am 31. 7. 28. gefangen.

341. *L. molluginata* Hbn. 7. 8. 28. zwei Falter am Licht.

342. *L. alchemillata* L. 10. 6. bis 29. 7. Häufig am Licht.

343. *L. adaequata* Bkh. 14. bis 29. 7. In der Dämmerung auf Schonungen, kommt gern zum Licht.

344. *L. albulata* Schiff. 9. 5. bis 8. 6. Häufig auf Wiesen, nie an Waldstraßen.

345. *L. luteata* Schiff. 2 Stck. 15. 6. 27 am Licht.

346. *L. obliterata* Hfn. 1. 6. 27. zwei Stck. am Licht.

347. *L. bilineata* L. 4. 7. bis 4. 8. Häufig in Gebüschen, am Licht. ab. *infuscata* Gmpbg. vereinzelt.

348. *L. sorditata* F. 10. 7. bis 28. Häufig am Licht, ebenso die ab. *infuscata* Stgr.

349. *L. autumnalis* Strm. 19. 6. bis 30. 7. Vereinzelt am Licht.

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1932/33

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Guder G.

Artikel/Article: [Beiträge zur Schmetterlingsfauna der Grafschaft Glatz mit besonderer Berücksichtigung des Kressenbachtales. Fortsetzung. 101-104](#)