

FAUNA EXOTICA

Neubeschreibungen.

Von **Richard Krüger**, Leipzig.

Prepona omphale f. *dives* Fruhst. ab. *wucherpennigi* n. m. Der bekannte Sammler F. Wucherpennig hatte die Freundlichkeit, mir eine interessante *Prepona dives*-Aberration zu überlassen, die er in Santarem erbeutete.

Typische *dives* tragen auf dem Vfl. ein grünes Band, das sich nach dem Vorderrand hin verjüngert und gewöhnlich aus 4 Flecken besteht. Hin und wieder liegt vor dem Vorderrand noch eine unbestimmt begrenzte Makel, der, in Fortsetzung der grünen Binde, seltener noch 2 grüne Fleckchen vorgelagert sind, die aber infolge ihrer Unscheinbarkeit das Gesamtbild der Form *dives* nicht beeinflussen. Im Gegensatz hierzu wird das Vfl.-Band bei der Aberration *wucherpennigi* um 3 große Makeln von der Farbe der übrigen Binde vermehrt und bis zum Vorderrand weitergeführt, sodaß ein vom Hinterrand bis zum Vorderrand reichendes geschlossenes Band entsteht, welches vor der Zellspitze einen Ausschnitt zeigt. Sehr reicher Blauglanz zu beiden Seiten des grünen Bandes vermehrt die Schönheit dieser neuen Aberration.

Typen, 1 ♂, in Koll. m. von Santarem.

Siderone marthesia Cr. ♀ f. *leonora* nova f. m. Weiterhin hatte Herr F. Wucherpennig in Santarem das Glück, eine rote ♀ Form von *Siderone marthesia* Cr. aufzufinden. In der Zeichnung sind keine Abweichungen von der Stammform festzustellen. Das Rot der ♀ f. *leonora* gleicht nicht dem des ♂, es ist vielmehr ein sattes Rosa ohne Spuren des gelben Tons des typischen ♀. Ein interessanter Fund.

Typen, 2 ♀♀ in Koll. Robert Biedermann von Santarem.

Nessaea thalia Bgm., ♂ ab. *margaretha* m. n. Herr Werner Hopp sandte mir vor einiger Zeit mit einer großen Anzahl *Nessaea thalia*, die auf dem Hinterflügel einen größeren oder kleineren gelben Fleck vor dem Vorderrand tragen, 2 Stücke u. zwar 2 ♂♂, deren Hinterflügel vollständig zeichnungslos waren. Ich nenne diese Aberration *margaretha*.

Heimat: Rio Dagua. Typen, 2 ♂♂ in Koll. Rob. Biedermann.

Kleine Mitteilungen.

Am 3. 10. 32 wurden 2 ausgewachsene Raupen von *Acherontia atropos* L. auf einem Kartoffelfeld bei Beuthen O. S. gefunden. Am 4. 10. 32 flog in Hindenburg O. S. ein Falter, ein Prachtexemplar von 12 cm Flügelspannung, durchs offene Fenster ans Licht.

Franz Kirsch.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1932/33

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Krüger Richard

Artikel/Article: [Neubeschreibungen. 240](#)