

Neue Zygänenrassen. (Lep.)

Von Dr. Przegendza, Nürnberg.

(Mit 6 Abbildungen.)

Zygaena achilleae Esp. n. v. *vozea*, Abbildung 1—3.

Bei Voze, eine Stunde landeinwärts von Spotorno (Riviera di ponente) fand ich am 9. VI. 32 in ca. 300 m Höhe in Anzahl eine *achillea*-Rasse, die sich im allgemeinen von der nahestehenden *achilleae ligustica* Rocci, (Genua und Umgbg.) durch breiten Flügelbau und dadurch stark eingezogenen Apex auffällig unterscheidet. Ich fand leider nur ♂♂, das einzige gesichtete ♀ ist mir durchgegangen.


Das charakteristische dieser Rasse ist: Vorder- und Htflgl.-Spitze im allgemeinen stark abgerundet. Htflgl. mit ungleichem, aber ziemlich breitem Rand, vor allem am Apex. Die Vdflgl.-Zeichnung im Durchschnitt kleiner als bei *ligustica*. In der Hauptsache sind die Tiere 6 fleckig, doch ist der 6. Fleck bei allen sehr klein oder verschwindet fast ganz. Rein 5 fleckige sind seltener. Verhältnis 2,5:1 bei *ligustica* 3:1. — Ein einziges Stück zeigt lichtgelb umzogenen 4. Fleck. Zwei ♂♂ haben Flecke 5 und 6 deutlich getrennt; bei zwei Stücken ist Fleck 4 fast verschwunden. Fühler stark entwickelt und ziemlich stumpf abgeschnittener Kolbe.

Zyg. scabiosae Scheven, subsp. *polonia*, Abbildung 4—6.

Aus der Sammlung des Krakauer physiographischen Museums erhielt ich 7 *Zyg. scabiosae* (5 ♂♂ 2 ♀♀), die von allen bisher bekannten Rassen abstecken mit dem Fundort Szerzseniowce bei Lemberg, leg. Romaniszyn.

Trotz der geringen Anzahl kann man infolge ihrer charakteristischen Zeichnung diese als neue Rasse abtrennen. Grob betrachtet, erinnern sie durch ihre dichte schwarze Beschuppung, den verhältnismäßig breiten Htflgl.-Rand, die mittelbreiten Flügel, dem wenig gekrümmten Vdflgl.-Rand mit abgerundeten Vdflgl.-Spitzen stark an den italienischen *orion*-Typ. Die Fühler sind dünner und schwellen ganz allmählich zu einer spitzzulaufenden Kolbe an. Die Vdflgl.-Zeichnung ist stark reduziert mit starker Neigung zur Trennung der leuchtend roten Flecke. Flecke 3 und 5 sind bei 6 Stücken getrennt, bei dem 7ten schmal verbunden. Flecke 2 und 4 hängen schmal zusammen, bei dreien allerdings nur durch eine ganz feine Brücke. Der Leib ist ziemlich gut behaart. Fangdatum: 30. VI. 31. 3 ♂♂, 1 ♀ im physiogr. Museum Krakau, zwei ♂♂, 1 ♀ in meiner Sammlung.

Der in No. 12, 40. Jahrgg. der „E. Z.“ Seite 42 beschriebene Hybride „*burgeffi*“ e. cop. *loniceræ* ♂ Scheven × *peucedani* ♀ Esper muß umbenannt werden in *Zyg. hybrida peucedano-loniceroides*, nachdem „*burgeffi*“ präoccupiert ist.



Erklärung der Abbildungen:*

- No. 1 — 3 *Zyg. achillaea* v. *vozea* ♂
 No. 4 — 5 „ *scabiosae* subsp. *polonia* ♂
 No. 6 „ „ „ „ ♀

Cetoninii-Studien (Col.).

Von **Heinz Muche**, Radeberg/Sa.

Dieses Jahr sammelte ich im Mai, Juni und Juli in den montenegrinischen Bergen und möchte nicht versäumen, meine Beobachtungen über *Potosia*, *Cetonia* und *Anomala* wiederzugeben.

Potosia aeruginosa fand ich oft aber vereinzelt in Eichenwäldern bis 1500 m hoch, *Potosia cuprea* im Juni im Rumija planina in 1000 m Höhe häufig aber einzeln an Heckenrosen und Hollunder. *Cetonia aurata* von Mai—Juli sehr gemein überall auf blühenden Sträuchern. Von Aberrationen am häufigsten war ab. *purpurata*. Verstreut ab. *lucidula*, ab. *pisana*, ab. *piligera*, ab. *viridiventris* und ab. *bilucida* fand ich nur im Rumija planina bei ca. 1000 m Höhe.

Interessant ist das plötzliche Auftreten und das ebenso schnelle Verschwinden vieler Käfer. *Anomala vitis* mit ab. *cupreonitens* erbeutete ich im Juli bei Vir pasar am Skutari-See gelegen, an einem Tag in großer Menge am Wein, den nächsten Tag kaum noch einen. Im Mai fing ich einmal in Ulcinj am Adriastrand abends *vitis* ab. *lutea* fliegend in ebensolcher Menge wie *vitis*.

* Auf allen Abbildungen kommt die dichte Beschuppung nicht zum Ausdruck.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1933/34

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Przegendza Adolf

Artikel/Article: [Neue Zygänenrassen. \(Lep.\) 27-28](#)