

## Eine neue *Parnassius*-Rasse aus Japan.

Von Dr. Waro Nakahara, Tokyo.

Wie bekannt, kommt *Parnassius glacialis* Butler = *citrinarius* Motschulsky in vielen Rassen in Japan, besonders auf Hondo und Hokkaido, vor. In neuerer Zeit wurde *glacialis* auch auf der Insel Shikoku gefunden. Ich erhielt von Herrn Ken Kubo vom Ishizuchi Berg (Mittel Shikoku) einige ♂♂, die sofort ins Auge fallen, da sie deutlicher weiß als die Hondo und Hokkaido Stücke gefärbt sind. Jedenfalls wichen diese von den bisher bekannten Rassen so ab, daß sie verdienen, als neue Subspecies *Parnassius glacialis shikokuensis* Nakahara subsp. nov. benannt zu werden.

Der Form und Zeichnung nach der Stammform sehr ähnlich, doch ist *shikokuensis* reiner weiß gefärbt.

Flügel oberseits stumpfweiß mit leicht gelblichem Ton, nicht so hell ockerfarben getönt wie die Stammform. Der Mittel- sowie der Endzweifleck intensiv und kräftig, das tiefschwarze Hinterrandfeld der Hinterflügel etwas weniger breit.

Länge 18 mm, Flügelspannung: 60—65 mm.

Habitat: Ishizuchi-Berg, Mittel Shikoku, Japan, 10. Mai 1935, von Herrn Ken Kubo erbeutet. Holotype: 1 ♂, Paratypen: 4 ♂♂. Die Holotype und 3 Paratypen befinden sich in der Sammlung des Verfassers, 1 Paratype in der Sammlung von Herrn Otto Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.

---

## Zwei neue südamerikanische Saturniden.

Von Franz Sageder, Loßau, Oesterreich.

(Mit 2 Abbildungen.)

*Automeris hoffmanni* f. n. Sagd. (Abb. 1) steht der *nyctimene* Latr., in der Flügelform und Augenzeichnung der Hinterflügel aber mehr der *acutissima* Wkr. nahe. Palpen und Fühler braun, Füße, Brust und Hinterleib graubraun, der After heller. Grundfarbe der Vorderflügel graubraun, das Mittelfeld besonders gegen den Vorderrand dunkler, der Saum heller, innere Querlinie subterminal scharf geeckt, und dann bogenförmig im 1. Drittel des Innenrandes einmündend.

Postmedianen wie bei *acutissima* 3 mm vom Apex entspringend, braun, innen hellgelb angelegt und genau in der Mitte des Innenrandes 4 mm von der inneren Querlinie entfernt, verlaufend. Diskalmakel wie bei *nyctimene* geformt, von der Grundfarbe nicht verschieden, hellgelb umringt und dahinter ein kurzes Schrägband dunkler. Grundfarbe der Hinterflügel wenig verschieden, der Innenrand grauschwarz. Postmedianen schwarz, wellig, innen hellgelb gesäumt, dahinter eine rotbraune durch die Adern durchbrochene Binde, der Saum rosabraun. Das sehr große Auge oval, fein gelb und schwarz umzogen, mit dunkelbrauner Iris und rosabrauner in 4 Spitzen ausgezogener innen schwarz gekernter Pupille. Spannweite 105 mm.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1935/36

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Nakahara Waro

Artikel/Article: [Eine neue Parnassius-Rasse aus Japan. 76](#)