

- Orrhodia v. punctatum* Esp. Bisher nur in Brackwede am Rosenberg gefangen. Cirka 20—25 Stück. Erstmalig am 25. 10. 34 ein ♂. Letzmalig 22. 11. 34 vier ♂♂.
- Calccampa exoleta* L. f. *pallescens* Warren. Ein ♂ am 18. 10. 30 am Köder in Schildesche.
- Telesilla amethystina* Hb. Ein ♀ am 29. 5. 26 in Schildesche.
- Toxocampa pastinum* Tr. Nicht selten in Schildesche an einer Hecke. 1934 cirka 50 Stück.
- Epizeuxis calvaria* F. Ein ♀ am Licht 1935 am „Waldkrug“.

Kleine Mitteilungen.

In E. Z. 48, 1934 S. 47 hatte ich ein ♂ von *Pieris rapae* L. erwähnt, eine Form mit schwarzem Randstreif am Saum der Hinterfl. (oben) und sie als Analogform von *Pieris brassicae* L. f. *marschneri* Busse hingestellt. Beide Formen sind bereits früher benannt worden als *P. rapae* ab. *marginata* G. S. Graham-Smith und W. Graham-Smith (Ent. Rec. vol. 41 p. 174 en note 1929) *Pieris brassicae* ab. *marginata* G. S. Graham-Smith und W. Graham-Smith (l. c. p. 174 129.) *P. brassicae* f. *marschneri* Busse (E. Z. 48. J., Nr. 1, 8. 4. 34) ist also synonym von *P. brassicae* ab. *marginata* Graham-Smith etc. Ich entnehme die Urbeschreibung der *rapae*-Form dem Aufsatz des Herrn Lempke-Amsterdam „*Pieris rapae* L. et ses formes“ Lambillionea 1934 S. 78 (insbesondere S. 87) ab. *marginata* Graham-Smith etc. Description originale*): „Une bande d'écaillés noires soit reliée à la tache costale, soit séparée d'elle par le pli internervural existe parallèlement distante d'environ 1 mm à la marge externe du recto des postérieures, allant parfois jusqu'au bout du pli internervural entre les nervures 5 et 6“. Die außerdem noch von mir in dem oben erwähnten Artikel besprochene Form ♂ *P. rapae* „*leucotera* Stef.“ mit oberseits ausgetilgtem Vorderrandfleck der Hinterfl. entspricht der Form *P. rapae* ab. *immaculata* de Selys.

Rudolf Boldt, Wyler Kr. Kleve.

Nach einer Mitteilung des Zoologischen Kabinetts der Universität zu Kowno, Kauras, Litauen, wurde am 18. September 1934 von dem Schüler Wagner des dortigen Gymnasiums in der Straße der Stadt ein mittelgroßes Stück von *Deilephila (Daphnis) nerii* L. gefunden.

Dieser Fund ist für Litauen, wo diese Art bisher nie beobachtet wurde, ganz neu.

Prof. W. v. Straszewicz, Naudvaris, Litauen.

*) Original-Beschreibung: Ein Band schwarzer Schuppen, das teils mit dem Seitenfleck verbunden teils von demselben durch die Falte zwischen den Ädern getrennt ist, geht ungefähr in 1 mm Entfernung parallel zum Außenrande der Vorderseite der Hinterflügel und erstreckt sich manchmal bis zum Ende der Aderfalte zwischen Ader fünf und sechs.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1936/37

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Boldt Rudolf, Straszewicz W.

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen. 148](#)