

## Beitrag zur Lepidopterenfauna von Iran (Persien)

insbesondere des Elbursgebirges in Nordiran.

Von Leo Schwingenschuss, Wien. (Fortsetzung)

Die Zusammenstellung erfolgt nach Seitz unter Berücksichtigung der Nachträge, mit Ausnahme der Lycaeniden, die nach Forster geordnet sind, und der Noctuiden, die, soweit sie erschienen ist, nach der von Boursin verfaßten Staudingerliste 61 geordnet sind.

Die Bestimmungen aller nur irgendwie fraglichen Noctuiden hat Boursin vorgenommen, jene der Aegeriden Le Cerf. Auch Professor Draudt und Dr. Zerny haben mitgewirkt, wofür ihnen allen bestens gedankt sei.

Gefangen wurden insgesamt 354 Arten Makrolepidopteren, und zwar von den im

		am Kendevan	im Tarseegebiet	bei Pelur	am Demavend	insgesamt versch. Arten
Seitz Band I enthaltenen		56	39	27	36	91
" " II	"	9	11	16	12	42
" " III	"	78	54	65	83	156
" " IV	"	25	32	21	29	65
zusammen		168	136	129	160	354

Darunter sind nicht weniger als 28 neue Arten, 36 neue Subspezies und einige neue Abarten, also bestimmt für Nordiran und für die kurze zur Verfügung gestandene Zeit ein schönes Ergebnis.

Von den Abkürzungen bedeutet: Pf. = Ernst Pfeiffer in München, Sch. = Leo Schwingenschuss in Wien, W. = † Fritz Wagner sen. in Wien.

(Leider ist Fritz Wagner am 17. Juni 1938 gestorben, so daß er das Erscheinen dieser Arbeit, an der er durch seine unermüdliche Forschung einen regen Anteil hatte, nicht mehr erlebte.)

### Neubeschreibungen.

(Die mit \* bezeichneten wurden schon früher an anderen Stellen veröffentlicht, die übrigen werden hier aufgestellt.)

Band I: *Satyrus ferula* F. nov. ssp. *iranica* Sch. — *Coenonympha leander* Esp. nov. ssp. *iranica* Sch. — \* *Thecla marcidus* Ril. nov. ssp. *alboabdominalis* Pf. — \* *Chrysophanus thetis* Klug. nov. ssp. *elbursina* Pf., \* *hippothoe* L. nov. ssp. *candissima* Pf. — \* *Lycena euryptilus* Frr. nov. ssp. *iranica* Forster, \* *loewi* Z. nov. ssp. *schwingenschussi* Pf., \* *ripartii* Frr. nov. ssp. *demavendi* Pf., \* nov. sp. *corona* Verity, \* *meleager* Esp. nov. ssp. *brandti* Pf., \* *coelestina* Ev. nov. ssp. *iranica* Pf., *posthumus* Chr. nov. ab. *caeca* Sch., *posthumus* Chr. an? *phyllis* Chr. ♀ ab. *marginemaculata* Sch.

Band II: \* *Zygaena ecki* Christ. nov. ssp. *schwingenschussi* Reiss, \* *carniolica* Scop. nov. ssp. *demavendi* Holik. und nov. ab. *albomaculata* Sch. — \* *Volgaretia (Lacides)* nov. sp. *elbursi* Daniel = (*ninyas* W.), \* nov. sp. *kendevani* Sch. — \* *Dipsosphecia ichneumoniformis* F. nov. ssp. *apyra* Le Cerf, \* nov. sp. *schwingenschussi* Le Cerf, \* nov. sp. *iranica*

Le Cerf. — \* *Chamaesphecia* nov. sp. *turbida* Le Cerf (*iranica* ♀ Allotype), \* nov. sp. *morosa* Le Cerf. — \* *Cossus* nov. sp. *iranii* Daniel. — \* *Holocerus* nov. sp. *firdusi* W. — \* *Catopta* nov. sp. *kendevanensis* Daniel. — *Dyspessa* nov. sp. *wagneri* Schw. —

Band III: \* *Bryophila galathea* Mill. nov. ssp. *solimana* Draudt (= *iranica* Sch.) — \* *Euxoa* nov. sp. *scurrilis* Draudt, \* nov. sp. *dolomedes* Brs. — \* *Mesoeuxoa* nov. sp. *difficillima* Draudt. — *Agrotis forficula* Ev. nov. ab. *roseotincta* Sch. — *Ogygia celsicola* Bell. nov. ssp. *iranica* Sch., \* nov. sp. *elbursica* Draudt. — \* *Dichagyris terminicincta* Cti. nov. ssp. *phaenotaenia* Brs., \* nov. sp. *psammochroa* Brs., \* nov. sp. *humilis* Brs. — \* *Chersotis* nov. sp. *firdusii* Sch. — \* *Rhyacia* nov. sp. *damnata* Draudt, \* *nyctymerina* Stgr. nov. ssp. *rehnensis* W., \* nov. sp. *demavendi* W. — \* *Epipsilia* nov. sp. *cacumana* Brandt. — \* *Polia* nov. sp. *draudti* W. — \* *Harmodia* nov. sp. *thecaphaga* Draudt, \* *drenowskii* Reb. nov. ssp. *kendevani* Sch., *compta* Esp. nov. ssp. *persica* Sch. — \* *Oncocnemis mongolica* Stgr. nov. ssp. *iranica* Sch. — \* *Bryomima carducha* Stgr. nov. ssp. *dilutior* Sch. — *Eremobia ochroleuca* Esp. nov. ssp. *pelurica* Sch. — \* *Crymodes mutica* Christ. nov. ssp. *griseoviridis* Sch. — \* *Paradrina* nov. sp. *boursini* W. — \* *Eremodrina* nov. sp. *xanthorhoda* Boursin. — *Autophila luxuriosa* Zerny nov. ssp. *nigromarginata* Schw. — \* nov. gen. *Hyrcanypena* W. nov. sp. *schwingenschussi* W. ( *Zanclostathme elbursalis* Draudt).

Band IV: *Rhodostrophia badiaria* Frr. nov. ssp. *iranica* Sch. — *Sterrhia palaestinensis* Sterneck. nov. ssp. *peluraria* Reisser (ined.). — *Ortholitha octodorensis* Favre nov. ssp. *decolor* Sch. — *Stamnodes depeculata* Led. nov. ssp. *progressiva* Sch. — \* *Cataclysme riguata* Hb. nov. ssp. *elbursica* W. — *Eupithecia fuscopunctata* Brandt nov. ssp. *nigrobrunneopunctata* Sch., nov. sp. *undulifera* Sch., *semigraphata* Bsd. nov. ssp. *lutulentaria* Sch., nov. sp. *tarensis* Sch. — \* *Nychiodes divergaria* Stgr. nov. ssp. *elbursica* Wehrli. — \* *Gnophos pollinaria* Christ. nov. ssp. *kendevani* Wehrli, \* *annubilata* Christ. nov. ssp. *persula* Wehrli und nov. ssp. *aethalodes* Wehrli, \* nov. sp. *stachyphorus* Wehrli. —

### Systematisches Verzeichnis der Lepidopteren

#### *Papilionidae.*

1. *Papilio machaon* L. ssp. Am Kendevanpaß am 3. Juli beobachtet und im Tagebuch vermerkt (Sch.).
2. *P. podalirius* L. ssp. *persica* Verity. In der Umgebung des Ortes Demavend, wo sich bei jedem Dorfe weithin ausgedehnte Obstgärten befinden, mehrfach (Pf., Sch., W.) beobachtet und je ein Exemplar von W. und mir erbeutet.
3. *Parnassius mnemosyne* L. ssp. bei *nubilosus* Christ. Am Kendevan zwischen 2800 und 3200 m nur mehr ganz einzeln in meist schon ganz verflohenen Stücken (Sch., W.).

(Fortsetzung folgt)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Schwingenschuss Leo

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopterenfauna von Iran  
\(Persien\) insbesondere des Elbursgebirges in Nordiran.  
\(Fortsetzung\) 13-14](#)