

Bestimmungshelfer zum Bestimmen ähnlich aussehender Großschmetterlinge der mitteleuropäischen Fauna.

Von Günter Wenzel, Magdeburg. (Fortsetzung)

T. castigata Hb. Grundfarbe der Vorderflügel bräunlichschwarz. Die Zeichnung viel deutlicher als bei der vorigen. Die Vorderflügel tragen drei weißgraue Querbinden, die von schwarzen Linien begrenzt und durch solche geteilt sind. Die Wellenlinie deutlich weißlich, gezackt. Auf der Unterseite sind die Hinterflügel weißlich mit sehr deutlicher Zeichnung.

T. trisignaria H. S. Grundfarbe der Vorderflügel rötlichschwarz mit schwarzem Mittelfleck und drei schwarzen Vorderrandflecken. Wellenlinie grau und deutlich erkennbar mit einem W unter dem Vorderrand.

T. vulgata Hw. Grundfarbe der Vorderflügel rötlichgrau mit weißlichen Doppelbändern, die sich aber nur undeutlich hervorheben. Die Wellenlinie weißlich gezackt. Hinterflügel rostbraun, auf den Rippen weiße Punkte.

T. tripunctaria. Grundfarbe der Vorderflügel dunkelgrau mit schwarzem Mittelfleck und undeutlichen Mittelbändern. Leicht erkennbar an weißen Flecken, die von der Wellenlinie gebildet werden und auf allen Flügeln in der Mitte und am Innenwinkel deutlich erkennbar sind. Die Unterseite fast unbestäubt.

Tephroclystia absinthiata Cl., *indigata* Hb., *pimpinellata* Hb.,
dodoneata Gn., *exiguata* Hb., *lanceata* Hb., *sobrinata* Hb.

T. absinthiata Cl. Grundfarbe der Vorderflügel rötlichviolettbraun, mit dunklen, undeutlichen Querlinien, mehreren schwarzen Vorderrandflecken und schwarzem Mittelfleck. Die Wellenlinie wird aus weißen Punkten gebildet und zeigt über dem Innenwinkel einen weißen Fleck.

T. indigata Hb. Grundfarbe der Vorderflügel bräunlichgrau, im Gegensatz zur vorigen schmal und spitz. Mittelfleck deutlich schwarz, mondformig. Die Querlinien am Vorderrand als schwarze Flecken erkennbar. Wellenlinie nicht erkennbar. Hinterflügel etwas heller.

T. pimpinellata Hb. Grundfarbe der Vorderflügel rötlichgrau. Der Mittelfleck schwarz, strichförmig. Die Querlinien deutlich, die hintere sehr breit, in der Mitte unterbrochen, am Vorderrande schwarze Punkte bildend. Auf den Rippen schwarze Punkte. Die Wellenlinie weiß. Hinterflügel mit undeutlichen Querlinien und schwarzem Mittelpunkt.

T. dodoneata. Grundfarbe der Vorderflügel bräunlichgrau, im Wurzel- und Mittelfeld aschgrau. Der Mittelfleck schwarz, kurz und dick, nach außen von einem weißlichen Felde begrenzt. Die Querlinien deutlich. Vor dem Saum schwarze dreieckige Flecke, deren Spitzen nach innen gerichtet sind.

T. exiguata Hb. Grundfarbe der Vorderflügel hellgelblichgrau mit drei lichten Querbinden, von denen die äußere am Vorderrande gebrochen ist und eine nach innen gerichtete Spitze bildet. In dem Feld zwischen äußerer Querlinie und Saum mehrere große dunkle Flecke. Hinterflügel hellgrau.

T. lanceata Hb. Grundfarbe rostbräunlich und grau gemischt. Flügelform schmal und spitz mit strichartigem Mittelfleck. Das Mittelfeld in der Mitte verengt und durch eine schwarze Linie geteilt. Hinterflügel weißlich, grau gewellt.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Wenzel Günter

Artikel/Article: [Bestimmungshelfer zum Bestimmen ähnlich aussehender Großschmetterlinge der mitteleutschen Fauna. \(Fortsetzung\) 124](#)