

Entomologische Zeitschrift

vereinigt mit

Entomologische Rundschau, Internationale Entomologische Zeitschrift, Entomologischer Anzeiger und Societas entomologica.

Herausgegeben unter Mitarbeit hervorragender Entomologen u. Naturforscher vom Internationalen Entomologischen Verein e. V., Frankfurt/M. (gegr. 1884)

Schriftleitung: Ein Redaktionsausschuß unter Leitung von Dr. Georg Pfaff, Frankfurt a. M.-Oberrad, Seeheimerstraße 11, unter Mitarbeit von G. Calliess, Guben u. a.

Manuskripte an die Geschäftsstelle: Frankfurt am Main, Kettenhofweg 99.

Verlag Alfred Kernen, Stuttgart W, Schloßstraße 80.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint gemeinsam mit dem Anzeigenblatt Insektenbörse.
Bezugspreis laut Ankündigung dort.Inhalt: Franz Bander mann, Ein Kombinationsfalter von *C. euphorbiae* L. — Otto Meißner, Noch einige Beobachtungen über Ameisenlöwen. — Günther Wangrin, Tagfalter-Versteinerung in einer „Stettiner Kugel“. — Kleine Mitteilungen.

Ein Kombinationsfalter von *C. euphorbiae* L.

Von Franz Bander mann.

Aus meinen im Sommer 1938 eingetragenen 64 Raupen von *Celerio euphorbiae* erzielte ich wieder ganz extrem gefärbte Tiere, die ich bisher noch nicht in meiner *Euphorbiae*-Sammlung hatte.

Am 2. Juni 1929 saß ein ♂ im Kasten, welches ein recht farbenfreudiges Kolorit aufweist. Die Vorderflügel sind in der Grundfarbe weißgrau, der isolierte große Mittelfleck ist schwarzgrün. Neben der hell olivgrünen Schrägbinde zeigt sich von der Spitze bis zum Innenrand ein schmaler dunkelgrauer Streifen (atavistische Linie). Das Außenfeld ist dunkel graublau, das Wurzelfeld weit ausgedehnt. Die Hinterflügel oben sind im Wurzelfeld tief schwarz, die Mittelbinde zeigt sich in helloranger Farbe. Das sonst schwarze Band ist graublau. Das Saumfeld macht einen besonderen Eindruck, in dem hellgrauen Felde sind zahlreiche Stricheln eingestreut. Die hellorange Farbe oben tritt auch unten auf dem Hinterflügel auf. Die Unterseite aller Flügel ist graurot gemischt, Körper und Fühler normal.

Außer dem beschriebenen ♂ erhielt ich noch zwei solcher Aberrationen. Der Falter vereinigt in sich drei schon beschriebene Formen, die *ab. demaculata* Schultz, *ab. testata* Wl. und die *ab. mediofasciata* Mayer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Bandermann Franz

Artikel/Article: [Ein Kombinationsfalter von *C. euphorbiae* L. 189](#)