

B. Beitrag zur Fauna von Bithynien, besonders von Boli (jetzt Bolu).

Von Leo Schwingenschuß, Wien.

Mit Beiträgen von E. PFEIFFER und F. DANIEL in München.

(Fortsetzung.)

Cossidae.

- Cossus cossus* L. 1 ♀ wie das Stück aus Akschehir (D).
Dyspessa (ulula ssp. ♀) *marmorata* Rmb. Eine derart unhomogene Rasse, wie mir bisher noch keine zu Gesicht kam. Von absolut typischen *ulula* in allen Übergängen zur echten *marmorata* und schließlich zu einer Mutante, die von *pallidata mut. nigrata* Wagn. kaum zu trennen ist (D). Ich erbeutete eine größere Serie sehr variabler Stücke (und zwar von fast weißen, an *aculeata* Trti. erinnernden bis zu fast schwarzen, an *nigrata* Wagn. erinnernden), vermag jedoch in dieser schwierigen Gruppe trotz reichen Materials mir kein klares Urteil zu bilden (SCH).

Noctuidae.

- Acronycta taurica* Stgr. Von PFEIFFER am Licht erbeutet (SCH).
Acronycta aceris judaea Stgr. Am 14. VI. 1 ♂ am Licht (SCH).
Acronycta euphorbiae F. Die Raupen waren bei B einzeln zu finden (SCH).
Acronycta megacephala Schiff. Beim Sesiensuchen waren die geschlüpften Puppen unter losen Pappelrinden zahlreich (SCH).
Euxoa conspicua Hbn. Ein frisches ♂ am Licht (SCH).
Agrotis cinerea Hbn. 1 ♀ am 15. VI. am Licht (SCH).
Agrotis exclamationis L. Mehrfach am Licht (SCH).
Ogygia forcipula Schiff. subsp. *obscurior* Corti. Einzeln am Licht (SCH).
Chersotis multangula Hb. ssp. *subdissoluta* Wgnr. 1 ♂ am Licht (SCH).
Rhyacia flammatra Schiff. Einzeln am Licht (SCH).
Rhyacia lucipeta Schiff. Von PFEIFFER am Licht gefangen (SCH).
Rhyacia (Diarsia) plecta L. Desgleichen.
Polia genistae Bkh. Die häufigste Eule am Licht und sehr kontrastreich (SCH).
Polia nana Hufn. Ein kleines ♂ am Licht (SCH).
Polia serena Schiff. Einzeln am Licht (SCH).
Polia spinaciae View. Desgleichen (SCH).
Harmodia lepida Esp. Ein der f. *brunnea* Tutt. nahestehendes ♂ am Licht (SCH).
Harmodia bicruris Hufn. 1 ♂ am Licht (SCH).
Harmodia filigramma Esp. ssp. *xanthocyanea* Hbn. 1 ♂, 2 ♀♀ am Licht (SCH).
Harmodia asiatica Wgnr. Nicht selten am Licht (SCH).
Harmodia pumila Stgr. Am 12. VI. 1 ♂ am Licht (SCH).

- Harmodia luteago* Schiff. Im ganzen kamen 3 ungewöhnlich kleine, sehr dunkle, der Form *nigrescens* Wagn. angehörige ♂♂ ans Licht (SCH).
- Aplecta nebulosa* Hufn. 1 sehr großes helles ♂ mit ungewöhnlich breiten Vorderflügeln am Licht (SCH).
- Hadena reticulata* Vill. Am Licht nicht selten (SCH).
- Epia mendax* Stgr. Die schöne und seltene Art kam in 2 reinen Exemplaren ans Licht (SCH).
- Hyphilare l-album* L. Einzeln am Licht (SCH).
- Sideritis vitellina* Hbn. Desgleichen (SCH).
- Cucullia anceps* Stgr. In einigen Exemplaren am Licht (SCH).
- Cucullia barthae* Boursin. Am Licht und auch im April des nächsten Jahres aus Raupen gezogen (det. BOURSIN) (SCH).
- Cucullia lychnitis* Rbr. Aus Raupen, die ich an *Verbascum* fand, im nächsten Jahre gezogen (det. BOURSIN) (SCH).
- Cucullia prenanthis* B. Nördlich und südlich von B fand ich unter *Scrophularia* grüne Raupen, von denen anfangs Mai nächsten Jahres ein Falter schlüpfte (det. BOURSIN) (SCH).
- Cucullia* spec. 3 mir unbekannt Raupen an *Scrophularia* gefunden. (Siehe auch Fauna von Aksehir.) (SCH).
- Copiphana olivina* H.-Schäff. Einzeln am Licht (SCH).
- Omphatophana antirrhinii* Hbn. Einzeln am Licht (SCH).
- Calophasia lunula* Hufn. nov. ssp. *anatolica* Drt. Von PFEIFFER 1 Exemplar am Licht (SCH).
- Parastichtis monoglypha* Hufn. 1 ♂ am Licht (SCH).
- Parastichtis basilinea* F. Desgleichen (SCH).
- Athetis alsines* Brahm. 2 ♂♂ am Licht (SCH).
- Athetis wullschlegeli* Pgl. nov. ssp. *schwingenschussi* Bours. Bei B mehrfach am Licht. Auch bei Akschehir gefunden (SCH).
- Pyrrhia victorina* Sodoff. Um B an Stellen, wo die Futterpflanze (eine prächtige Salbeiart) zahlreicher blühte, mehrfach in schön variierenden Stücken, darunter auch die Form *prazanoffzkyi* Gn. Auch bei Tage war die Art an den Deckblättern der Salbeiart zu finden. Sie ist in der Farbe diesen so angepaßt, daß selbst das geübte Auge den Falter nur schwer findet (SCH).
- Pyrrhia treitschkei* Friv. Kam am 12. und 13. VI. 6 km nördlich von B in 3 ganz reinen Stücken ans Licht (SCH).
- Meristis trigrammica* Hufn. 1 ♂ am Licht (SCH).
- Dicycla oo* L. Ein ganz frisches, der Form *ferruginago* Hbn. angehöriges ♂ am Licht (SCH).
- Chloridea dipsacea* L. Einzeln am Licht (SCH).
- Acdophron rhodites* Ev. Beim Heimwege vom Leuchtplatz nördlich von B kam 1 Stück etwa 5 km von B entfernt an die Handlampe (SCH).
- Leptostia dardouini* B. Am Bahnhofe von Arifie am 10. VI. ein schon etwas beschädigtes ♀ am Licht (SCH).

(Schluß folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Schwingenschuß[ss] Leo

Artikel/Article: [B. Beitrag zur Fauna von Bithynien, besonders von Boli \(jetzt Bolu\). 273-274](#)