

III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

Von H. Kiefer, Admont (Steiermark).

(Fortsetzung von Seite 144.)

289. *A. augur* F. Ein ♂ mit nur 16 mm Vorderflügelänge am Licht, Admont 15. VII., ist lichtgrau (K), ein ♂ schwacher Übergang zu ab. *helvetina* Knaggs, Mühlau am Licht Mitte VII. (K), rev. Hoffm. — * ab. *hippophæa* H. G. ein ♀ Krumauer Moor am Köder 29. VIII. (K).

295. * *A. hyperborea* var. *carnica* Hering. Schladminger Tauern (Dr. MACK).

296. *A. collina* B. Zwei ♂♂ Admont am Licht 8. VI. und 3. VII. (K) (det. Hoffm.).

301. *A. candelarum* Stgr. Ein ♂ Mühlau bei Admont am Licht VII. (K), rev. Hoffm.

302. *A. c-nigrum* L. Ein ♀ Mühlau bei Admont am Licht VIII., mit stark schwarzbraunen Vorderflügeln, jedoch deutlicher Makelzeichnung (K).

306. *A. rubi* View. Ein ♂ Krumauer Moor am Köder 5. IX. (zweite Generation) (K).

307. *A. dahlia* Hb. Ein ♂ Admont am Licht 18. VIII. und ein ♀ 5. IX., letzteres stark geflogen (K), det Dr. MACK (rev. Dr. ZERNY).

308. *A. brunnea* F. Zwei ♂♂ Admont am Licht VII. mit etwas verdunkelten Vorderflügeln (K), rev. Klos.

313. *A. multangula* Hb. Ein ♀ Palfau (leg. P. BONIFAC SEEBACHER), det. Hoffm.

315. *A. cuprea* trans. ad. * ab. *pallida* Hoffm. Ein ♂ Kamleralm bei Hall 16. VIII. (K).

317. *A. plecta* L. Ein ♂ Admont am Licht 8. VII. Wellenlinie der Vorderflügel durch starke, weiße, nach innen radial verlaufende Flecke markiert (K), rev. Dr. REBEL.

322. * *A. lucipeta* F. Schladminger Tauern (Dr. MACK).

326. *A. simplonia* H. G. Ein ♂ Admont am Licht 30. V., sehr schwach gezeichnet, mehr bleigrau und ein ♀ am selben Abend auch schwach gezeichnet und sehr licht (K), rev. Dr. ZERNY, ein ♂ sehr

schön blaugrau mit gelben Schuppen (wie die typische Stammform, vgl. SEITZ!) und ein ♂ ebendort, weißgrau bestäubt (K).

327. *A. grisescens* Tr. ♂♂ in Anzahl am Gipfel des Stein am Mandl (Rottenmanner Tauern) am Licht 18. VII.; bei fünf Stück ist der Bogenstreif der Hinterflügel auf der Unterseite stärker vortretend (K).

331. *A. putris* L. Ein ♂ Palfau (leg. P. BONIFAC SEEBACHER), ein ♂ Admont am Licht 12. VI. abgeflogen (K).

335. *A. nigricans* * ab. *fumata* (= *fumosa* Hw.). Ein sehr dunkles ♀, auch die Hinterflügel geschwärzt; obere Makeln licht umzogen (K), Mühlau am Licht VIII. (K).

340. *A. ypsilon* Rott. Ein ♂ Umgebung von Admont (Ennsanlage) am Köder 6. XI. Mittelfeld und Saumfeld bilden eine gleichmäßig gelbgraue Fläche; innere Begrenzung des Mittelfeldes wie bei der Stammform (K), rev. Hoffm.

341. *A. segetum* * ab. *catenatus* Hw. (Übergangsform) ein ♂ Admont 5. IX., Vorderflügel grau, deutliche Zeichnung (K); ein typisches ♂ Admont am Licht 20. IX. (leg. SCHNEIDER).

342. *A. saucia* ab. *margaritosa* Hw. Ein ♂ Umgebung von Admont e. l. 28. VIII. (K), rev. Hoffm.

349. * *Soria* (= *Pachnobia*) *leucographa* Hb. Ein ♂ Admont am Licht 2. V. geflogen (K), det. Hoffm., zwei ♂♂ Mühlau am Licht IV. (K). — * ab. *tenebricosa* Rbl. Ein ♀ Mühlau am Licht IV. (K), det. Hoffm.

350. *Charaas graminis* L. Stammform und * ab. *tricuspis* Esp., letztere nicht selten: Admont und Umgebung und auf Almböden VII., VIII. ♂ und ♀ (K), ein ♂ mit braunroter Grundfarbe 16. VIII. Kammleralm bei Admont (K).

351. *Epineuronia popularis* F. Admont am Licht VIII., IX. ♂♂ häufig, ♀♀ selten (K), Mühlau ein ♂ mit nur 16 mm Vorderflügel-länge (K).

352. *E. cespitis* F. Ein ♂ Gesäuse am Licht IX. von schwarzbrauner Grundfarbe und schwacher Zeichnung (K).

353. *Mamestra leucophaea* View. Ein ♂ Palfau (leg. P. BONIFAC S.), dunkel, mit scharfer, weißer Zeichnung (K). (Siehe auch HOFFMANN-KLOS, Bd. II, S. 382.)

358. *M. brassicae* ab. * *albidilinea* Hw. Admont ♂♂ 17. V., 27. VIII., ein ♀ 24. VII. am Licht, sind lauter Übergänge zu dieser Form! (K).

360. * *M. albicolon* Sepp. Ein ♂ Admont (leg. STROBL).
365. *M. dissimilis* Knoch. Ein ♂ der Stammform 3. VIII. Admont am Licht (K).
366. *M. thalassina* Rott. Ein ♂ Umgebung von Admont an einer Mauer 10. VII., ist dunkler als die Stammform, aber nicht *humeralis*! (K).
368. *M. pisi* L. Ein ♀ e. l. 8. V. (Raupe im Krumauer Moor geleuchtet), sehr licht, mehr ockergelb mit deutlicher Zeichnung (K), Admont ♂ e. l. 7. III. dunkelbraunrot, aber nicht *aestiva*! (K).
371. *M. dentina* Esp. Admont am Licht ♂ und ♀, mit Übergängen zu ab. *latenai* Pier. VII. (K), Rottenmanner Tauern bei 2000 m geleuchtet, zahlreich, darunter starke Übergänge zu ab. *latenai* 17. VII., lauter ♂♂ angefliegen (K).
372. *M. marmorosa-microdon* Gn. * ab. *obscura* Hoffm. Ein ♀ Rottenmanner Tauern am Licht bei 2000 m 17. VII. (K), rev. KLOS.
375. *M. serena* * ab. *obscura* Stgr. Ein ♂ Admont am Licht 29. V. (K).
378. *Dianthoecia caesia* Bkh. Admont, Mühlau, Wald, am Licht VI.—VII. ♂ und ♀ (K). — ab. *nigrescens* Stgr. Ein ♂ Admont am Licht VI., ist Übergangsform! (K).
386. *D. carpophaga* ab. *capsophila* Dup. "Admont (Bahnhof), ein ♂ 21. V. (K), det. Dr. MACK, rev. Dr. ŽERNY.
388. *Bombycia viminalis* F. Ein ♀ mit rotgelben Schuppen eingestreut, Mühlau am Licht VIII. (K), rev. Hoffm. — *ab. *obscura* Stgr. ein ♂ Admont am Licht 5. IX., typisch mit Übergängen ebendort 24. VII. bis 6. X., ♂ und ♀ (K).
392. *Miana latruncula* * *intermedia* Horm. Ein ♂ Admont 12. VII. am Licht, fast einfarbig lichtbraungrau mit weißer Begrenzung der Querstreifen der Vorderflügel (K), det. Dr. REBEL. — * ab. *fasciata* Tutt. ein ♂ Hoffeld bei Admont am Zaun 15. VI. (K).
394. *M. captiuncula* Tr. Gesäuse ein ♂ 26. VII. (leg. STROBL).
406. *Hadena porphyrea* Esp. Ein ♂ mit kräftiger, lichtgelber Wellenlinie. Ennsanlage bei Admont am Köder 5. IX. (K).
407. *H. adusta* Esp. Ein ♀ Rottenmanner Tauern bei 2000 m 17. VII. am Licht (geflogen) (K). Das in HOFFMANN-KLOS aus Admont (Klosterkogel) als *H. rubrivena* Tr. angeführte ♀ 1873 (leg. SCHIEFERER) ist eine etwas aberrative *adusta* Esp.! (det. Dr. MACK).

409. *H. maillardi* H. G., sehr ähnlich der * var. *schildei* Stgr. Ein ♂ 19. VIII. e. l., Puppe fand ich unter einem Stein am Wege vom Scheiplsee zum Bösenstein am 5. VIII. (K), det. Dr. ZERNY.

411. *H. sordida* Bkh. Ein ♀ Admont am Licht 4. IX.! (K), rev. Hoffm.

414. *H. monoglypha* Hufn. Ein ♀ 24. VII. e. l. Admont, mit nur 20 mm Vorderflügel. (K), rev. Dr. REBEL. — * ab. *intacta* Peters ein ♂. Übergang zu dieser Form im Krumauer Moor 4. VIII., im Sonnenschein schwärmend (K), rev. Hoffm.

417. *H. lithoxylea* F. Ennsanlage bei Admont am Köder VIII. zwei ♀♀ (K). Mühlau am Licht zwei ♂♂ (K).

421. *H. scolopacina* Esp. Ein ♂ Aigner Moor 4. VIII., im Sonnenschein schwärmend (K), rev. Hoffm. ein ♂ Admont am Licht 5. VIII. (K).

422. * *H. basilinea* F. Ein ♀ Wald am Licht Ende VII., ein ♂ desgleichen Mitte VI. (K).

423. * *H. gemina* Hb. Ein ♂ Admont am Licht 21. VI. (K), det. Dr. REBEL.

426. *H. secalis* * ab. *oculea* Gn. Ein ♂ Admont am Licht 29. VII. (K). — * ab. *uniformis* Spul. ein ♀ Krumauer Moor am Köder 13. VIII. (K), det. Hoffm. — ab. *leucostigma* Esp. ein ♂ Admont am Licht 5. VIII. (K).

427. *Episema soriacea* Esp. Ein ♂ sehr dunkel! Palfau (leg. P. BONIFAC), det. Hoffm.

433. *Dasypolia templi* Thnbg. Admont und Mühlau nur ♀♀ am Licht 18. III. bis 2. V. Stammform und Übergang zu ab. *alpina* Rghfr., letztere 13. IX. Admont am Licht (K).

434. *Brachionyta nubeculosa* Esp. Drei ♂♂ Admont am Licht Ende III. (K).

435. *B. sphinx* Hufn. Ein ♀! Admont am Licht 29. X. (K).

439. *Dichonia aprilina* L. Ein ♀ Hoffeld bei Admont am Stamme eines Apfelbaumes 30. IX. (K).

443. * *Dryobota protea* Bkh. Umgebung von Gröbming (Dr. MACK).
(Fortsetzung Seite 157.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1941-1942

Band/Volume: [55](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales 149-152](#)