# III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

Von *H. Kiefer*, Admont (Steiermark).

(Fortsetzung von Seite 152.)

Band III: *Noctuidae* (Fortsetzung).

447. *Chloantha polyodon* Cl. Mühlau am Licht V. ein ♂ (K) am Frauenfeld bei Admont abends ein ♂ 17. VI. (K).

451. *Trachea atriplicis* * ab. *similis* Stgr. Ein ♂ Admont am Licht VII. (K).

454. *Brotolomia meticulosa* L. Ein ♀, Zwerg, nur 17 mm Vorderflügellänge 5. IX. Krumau am Köder (K). — * ab. *suffusa* Warz. Ein ♂ Aigen bei Admont 23. IX. (K), rev. Hoffm.

455. *Mania maura* ab. *striata* Tutt. Admont 3. VIII. (K) ist noch Stammform! (Siehe HOFFMANN-KLOS!)
— *Helotropha leucostigma* * ab. *albipuncta* Tutt. Krumau bei Admont 18. VIII. Ein ♀ im Schilf geleuchtet (K), rev. Hoffm.

461. *Gortyna ochracea* Hb. Admont ein ♂ am Licht 24. IX. (K).

463. * *Nonagria typhae* Thnbg. Eine angestochene Raupe zwischen Gröbming und Pruggern im VIII. in Typha gefunden (Dr. MACK).

470. *Calamia lutosa* Hb. Ein ♂ Admont am Licht 4. X. Punktreihen sehr zart, kaum sichtbar! (K), det. Hoffm.

494. *Caradrina alsines* Brahm. Hall bei Admont ein ♂ VII. 1906 (K), siehe HOFFMANN-KLOS, fälschlich als *superstes* Tr. angegeben! (det. Dr. MACK, rev. Dr. ZERNY).

503. *Rusina umbratica* Goeze. Zwei ♂♂, eines davon sehr düster gefärbt, Mühlau am Licht VII. (K).

507. *Amphipyra perflua* F. Admont, Mühlau am Licht VII., VIII. ♂ und ♀ (K).

510. *Taeniocampa gothica* L. Ein ♂ Admont am Licht 27. IV. mit unterbrochener schwarzer Begrenzung der Makeln (K). — * ab. *pallida* Tutt. Admont und Mühlau am Licht IV., ♂♂ (K). — ab. *conflua* Kiefer (beschrieben Ent. Rundschau, 30. Jahrg. Nr. 6) ein ♂ Mühlau am Licht IV. (K).

515. *T. incerta* Hufn. Ein dunkelgraues und ein rötliches ♂ Admont am Licht IV. (K), rev. Hoffm.

520. *Mesogona oxalina* * ab. *unipuncta* Kiefer (beschrieben Kranchers Ent. Jahrbuch 1916), mit fehlender Punktreihe und Wellenlinie im Saumfelde. Ein ♂ Admont am Licht 9. X. (K), rev. Doktor REBEL.

522. *Hiptelia ochreago* Hb. Kamleralm bei Admont ein ♂ und 3 ♀♀ 5. und 16. VIII. (K).

530. *Dyschorista fissipuncta* Hw. Krumauer Moor am Köder ♂ und ♀ 25. VIII., darunter ein ♂ der * ab. *nigrescens* Tutt. (K), det. Hoffm.

531. *Plastenis retusa* L. Drei ♂♂ Krumauer Moor am Köder 18. bis 25. VIII. (K).

536. *Orthosia circellaris* Hufn. Ein ♂ Admont am Licht 9. IX. dunklere Stammform (K), det. Hoffm. Ein ♂ desgleichen 5. X. lichtockergelb mit schwarzer Zeichnung (K).

539. *O. nitida* ab. *obscurata* Spuler. Als Übergänge zu dieser Form zwei ♀♀ am Köder in Krumau bei Admont 21. VIII. (K).

543. *Xanthia citrago* L. Zwei ♂♂ Admont am Licht 17. und 21. VIII., ein ♂ 5. IX. (K).

550. * *Orrhodia fragariae* Esp. Zwei überwinterte ♀♀ Admont (Bahnhof) am Licht III. 1934 und 21. II. 1936 (leg. Vorstand SCHNEIDER).

554. *O. vaccinii* L. Ein graubraunes ♂ (Stammform) 31. III. Ennsanlage am Köder (K). — * ab. *ochrea* Tutt. ein ♂ Ennsanlage am Köder 7. IV. ist Übergang zu dieser Form (K). — ab. *mixta* Stgr. Ein ♀ Mühlau am Licht IV. (K), rev. Hoffm. — * Ein ♂ graubraun mit *signata*-ähnlicher Zeichnung. Mühlau 18. IV. am Licht (K). Zum Formenkreis *mixta* gehörend! (det. Dr. REBEL).

561. *Xylina ingrica* ab. *obscura* Carad. Ein ♂ Mühlau am Licht IV. Übergang zu dieser Form (K), rev. Hoffm.

571. *Calophasia lunula Hufn.* Ein ♀ e. l. 26. VI. (Raupe im Krumauer Moor auf Vaccinium geleuchtet) (K).

579. *Cucullia asteris* Schiff. Ein ♂ Mühlau VI. am Licht (K). rev. Hoffm.

585. * *C. chamomillae* ab. *chrysanthemi* Hb. Ein ♀ Admont am Licht 13. V. (K), det. Hoffm.

588. *Anarta myrtilli* L. Hinterwinkel (Buchstein) Mitte V. 1932 (leg. Fachlehrer RABUSE).

589. *A. cordigera* Thnbg. * ab. *suffusa* Tutt. Ein ♀ Lorenzengraben im Paltentale auf dem Fahrwege 20. IV.! (K).

590. *A. melanopa* var. *rupestralis* Hb. Schladminger Tauern und Stoder Zinken (Dr. MACK).
— * *A. nigrita* B. Stoder Zinken (Dr. MACK).

601. *Erastria uncula* Cl. Krumauer Sumpfwiesen 12. VI. ♂♂ und ein ♀ welches Eier legte; sie waren lichtgrün, nicht gelb! (K).

607. *Prothymnia viridaria* Cl. Ein ♀ Gesäuse 18. V. 1916 (K) ist eine * nov. ab. ***semipurpurea*** Kiefer, rev. HOFFMANN und Dr. REBEL. Diagnose: Grundfarbe dunkelolivgrau, Querband ohne Unterbrechung bis zum Saum, auch die Fransen purpurrot ausgefüllt und verbreitert! (K). — * ab. *fusca* Tutt. Ein ♂ Tamischbachturm (Gesäuse) bei 2000 m, 27. VI., zeichnungslos, einfarbig graubraun (K).

609. *Scoliopteryx libatrix* L. Ein ♂ am Licht Gstatterboden, Raupen auf Salix (W).

612. *Abrostola tripartita* Hufn. ♂ und ♀ Admont am Licht 22. V. bis 7. IX., Wald ein ♂ am Licht 11. VII. (K).

618. *Plusia chryson* Esp. Sieben Stück am Licht in Gstatterboden VII., VIII. (W). Ein ♀ Admont 15. VIII. am Licht, stark geflogen (K).

619. *P. bractea* F. Sechs Stück am Licht in Gstatterboden VII., VIII. (W), Admont und Mühlau ♂ und ♀ am Licht VII./VIII. (K). Kaiserau bei Admont ein ♂ auf Wiesenblumen (Sumpfwiesen) schwärmend 31. VII. (K). Unter den Stücken aus Admont befinden sich auch solche der ab. *argentea* Gronemeyer ♂ und ♀ mit silbernen Makeln. Ein ♂ auch aus Wald (Paßhöhe zwischen Palten und Liesing) erhalten (K).

621. *P. festucae* L. Ein ♀ Admont 31. VII. 1939 am Licht (K).

624. *P. jota* L. Sechs Stück am Licht VII., VIII. Gstatterboden (W). — ab. *percontationis* Tr. ein ♂ Mühlau am Licht VIII. 1916, linker Vorderflügel Aberration, rechter Vorderflügel Stammformzeichnung (K).

625. *P. gamma* * ab. *rufescens* Tutt. Ein ♂ Admont am Licht 28. III. (K).

627. *P. interrogationis* L. Zwei Stück am Licht Gstatterboden VII. (W). Krumauer Moor auf Heidekraut schwärmend ♂♂ und ♀♀ 24. VII. bis 5. IX., ein ♀ vom 5. IX. noch rein! (K). Unter den Faltern befand sich auch die Aberration * *flammifera* Heyne, det. Hoffm.

628. *P. ain* Hochenw. Ein ♀ Admont am Licht 21. VII. (K).

631. *Euclidia mi* Cl. Aigner Moor und Sumpfwiesen V., VI. ♂♂ und ♀♀, darunter die ab. *illuminata* Warren, ein ♂ (siehe SEITZ Bd. III).

632. *E. glyphica* ab. *obsoleta* Strand. Ein ♂ Admont (K).

636. * *Catocala fraxini* L. Krumau bei Admont 20. IX. ♀ (K), ein ♂ aus Admont an Mauerwerk 2. X. 1930 mit schmaler Binde ist starker Übergang zu * ab. *angustata* Schultz (K).

639. *C. nupta* * ab. *concubina* Brkh. Ein ♂ Admonter Umgebung 14. VIII. (K). Ein ♀ *trans, concubina* Krumauer Moor an Köder 25. VIII. (K).

649. *Laspeyria flexula* Schiff. Ein Stück Gesäuse 15. VII. (W).

650. *Parastcotia fuliginaria* L. Mühlau VIII. ein ♂ mit 10 mm Vorderflügellänge (K).

662. *Bomolocha fontis* Thubg. Ein ♂ Pleschalm bei Hall 13. VII. (K).

664. *H. obesalis* * ab. *trans obscura* Rbl. Ein ♂ Mühlau am Licht V. (X), rev. Hoffm.

667. *Thyatira batis* L. Ein ♂ Krumauer Moor am Köder 21. VIII. (K).

Band IV: *Geometridae.*

675. *Brephos parthenias* L. Ein ♀ Krumauer Moor. 16. IV. Eine Anzahl sah ich schon Ende III. und dann bis Ende IV. um die Wipfel hoher Birken schwärmen (K).

684. *Nemoria porrinata* Z. ♂ und ♀ besonders auf Sumpfwiesen in Krumau und Aigen V., VI. (K).

691. *Acidalia similata* Thnbg. ♂ und ♀ besonders auf Sumpfwiesen und Mooren in der Umgebung von Admont und Selztal VII. bis VIII. (K).

712. *A. inornata Hw.* Admont ein ♀ 3. VIII. (K), det. Dr. MACK, rev. Dr. ZERNY.

714. *A. aversata* ab. *spoliata* Stgr. Ein ♀ ob. Hall bei Admont bei 900 m 29. VIII. (K), ein ♀ Schafferweg zur Kaiserau 20. VII. (K), ein ♀ Admont am Licht 3. VIII. hellere Form (K), rev. Hoffm. Stammform bisher nicht gefunden! (K).

(Fortsetzung folgt.)

Druck von H. Laupp jr in Tübingen.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1941-1942

Band/Volume: 55

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales. 157-160