10. Januar 1942 Nr. 28 55. Jahrgang

Entomologische Zeitschrift

vereinigt mit

Entomologische Rundschau, Internationale Entomologische Zeitschrift, Entomologischer Anzeiger und Societas entomologica. Herausgegeben unter Mitarbeit hervorragender Entomologen und Naturforscher vom Internationalen Entomologischen Verein e. V., Frankfurt am Main (gegr. 1884).

Schriftleitung: Dr. Georg Pfaff, Frankfurt a. M. mit einem Redaktionsausschuß, unter Mitarbeit von Rektor G. Calliess, Guben u. a. Manuskripte an den Redaktionsausschuß der Entomologischen Zeitschrift: Frankfurt am Main, Kettenhofweg 99.

Verlag Alfred Kernen, Stuttgart W, Schloßstraße 80.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint gemeinsam mit dem Anzeigenblatt Insektenbörse. Bezugspreis laut Ankündigung dort.

Eine neue *Melanargia*-Form aus China.

Von Dr. *Walter Forster*.

(Zoologische Staatssammlung, München.)

Vom Museum A. KÖNIG in Bonn wurden mir die Melanargien der Sammlung HÖNE zur Bearbeitung übergeben, wofür ich auch an dieser Stelle herzlichst danke. Die Ergebnisse dieser Bearbeitung stimmen völlig mit den Arbeiten SHELJUSHKOS (Entom. Anzeiger IX. 1929, S. 13 ff.; XI. 1931, S. 7 ff.) überein, so daß ich mir eine



Abb. 1



Abb. 2

ins einzelne gehende Besprechung des Materiales ersparen kann. Lediglich zu der Zusammenstellung der *Melanargia halimede*-Gruppe l. c. XI. S. 68 sei bemerkt, daß *lugens* Honr. nach dem zahlreichen mir vorliegendem Material nicht als Aberration, sondern

als gute, von *meridionalis* Feld. abzutrennende Subspezies zu werten ist, zu welcher *fuscissima* Houlb. als Aberrationsname für die extrem dunklen Tiere zu stellen ist. SHELJUSHKOS ursprüngliche Ansicht bezüglich *lugens* Honr. (l. c. IX. S. 50) besteht also zu Recht.

Meridionalis Feld., welche mit der Abbildung der FELDERSCHEN Type bei SHELJUSHKO (l. c. XI. S. 7 und 8) übereinstimmen, liegen mir vor von: Schanghai, dem Ningpo-shan, Ost-Tienmu-shan, Kiangsu und Nanking. Etwas dunkler, aber auch noch zu *meridionalis* Feld. zu rechnen sind Tiere vom Mokan-shan und Hoengshan. Typische *lugens* Honr., welche genau mit den als *meridionalis* Feld. bezeichneten Abbildungen bei LEECH (Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, t. VIII f. 5 und 5 a; Butt. of China t. XI f. 1), sowie den Abbildungen HOULBERTS (Oberth. Et. Lep. Comp. XIX. p. 133 f. 2—4) übereinstimmen, liegen mir in Anzahl vor von Kiukiang und vom Tapai-shan im Tsinling-shan, Süd-Schensi.

Eine umfangreiche Serie aus dem Mien-shan, Prov. Schansi dagegen kann zu keiner der bis heute beschriebenen Formen gestellt werden und soll ssp. *p s e u d o l u g e n s* nov. benannt werden.

Diese Form ist im Durchschnitt nie so dunkel wie *lugens* Honr., ganz dunkle Stücke, der *fuscissima* Houlb. entsprechend, liegen trotz der umfangreichen Serie keine vor. Der Hauptunterschied der neuen Form gegenüber *lugens* Honr. liegt in der Grundfarbe, welche bei *lugens* Honr. immer gelb zu sein scheint mit mehr oder weniger brauner Bestäubung, bei *pseudolugens* dagegen immer rein weiß ist mit meist nicht so starker brauner Bestäubung. Hinsichtlich der Grundfarbe gleicht diese Form also der typischen *meridionalis* Feld. und nimmt im Gesamthabitus eine Mittelstellung ein zwischen *lugens* Honr. und *meridionalis* Feld.

Holotypus: ♂ Mien-shan 1000 m, Prov. Schansi 6. 7. 36 (Abb. 1).

Allotypus: ♀ Mien-shan 2000 m, Prov. Schansi 1. 8. 37 (Abb. 2).

Die Typenserie im Museum A. KÖNIG, Bonn, einige Paratypen in der Zoologischen Staatssammlung, München und in der Sammlung E. PFEIFFER, München.

Melicleptria (Heliothis) scutosa Schiff. in Norddeutschland.

Von Dr. *E. Urbahn*, Stettin.

In dieser Zeitschrift (53, 1940, Nr. 40) hat WARNECKE vor einiger Zeit die Frage nach der Heimatberechtigung von *scutosa* in Deutschland aufgeworfen und betont, daß die Art hier seit 1900, ja schon seit 1880, nur noch ganz vereinzelt und als Irrgast gefunden sei, während sie früher häufiger und regelmäßiger auftrat. Denselben

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1941-1942

Band/Volume: 55

Autor(en)/Author(s): Forster Walter

Artikel/Article: Eine neue Melanargia-Form aus China. 217-218