

*stabilis* ♂ × *gothica* ♀ zur Beute. Weder durch den Fall aus über vier Meter Höhe noch beim Einbringen in ein Kästchen wurde die Verbindung gelöst, sondern erst nach einer reichlichen Stunde. Das *gothica*-♀ wurde gut gefüttert und legte innerhalb weniger Tage sämtliche Eier in der bekannten Häufchenform ab. Diese ließen jedoch keinerlei Anzeichen einer Befruchtung oder Entwicklung erkennen, sondern fielen alle ein und vertrockneten. Eine fruchtbare Kreuzung zwischen *stabilis*-♂ und *gothica*-♀ halte ich demnach für ausgeschlossen.

### III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

Von H. Kiefer, Admont (Steiermark).

(Fortsetzung von Seite 184.)

861. *L. sordidata* F. Ein ♀ stark moosgrün, Admont am Licht 22. VII. (K), rev. Dr. REBEL. — ab. *infuscata* Stgr. ein ♀ Mühlau am Licht VII. (K). — ab. \* *albomaculata* Kiefer (jetzt syn. zu *constricta* Strand.!) (beschrieben in Krancher Ent. Jahrbuch 1916), ein ♀ aus Mühlau am Licht Ende VII., mit zwei weißen Makeln im Mittelfelde der Vorderflügel; dazu eine Übergangsform der ab. *fuscoundata* Don. ein ♀ Admont am Licht 3. VIII. (K). Beide Falter rev. Dr. REBEL, ein ♂ Rottenmanner Tauern-Vorberge 26. VII. (K).

862. *L. autumnalis* Ström. ♂ und ♀ Admont und Umgebung V., VI., auch die ab. *ob soletaria* Schille darunter. Ein ♀ von Fichten geklopft Krumau 10. V. (K).

863. *L. ruberata* Frr. Ein ♂ Admont am Licht 9. V. und ♂ und ♀ Mühlau am Licht V. (K).

865. *L. silaceata* Hb. ♂ und ♀ Admont am Licht VI., VII. (K).

866. *L. corylata* Thnbg. Zwei ♀♀ Krumauer Moor von Fichten geklopft 15. VII. (K).

867. \* *L. badiata* Hb. Admont drei ♂♂ am Licht 26. IV. bis 13. V. (K).

868. *L. berberata* Schiff. Zwei ♂♂ ein ♀ Palfau (leg. P. BONIFAC), ein ♂ ein ♀ Admont am Licht 15. V. und 22. VIII. (K), ein ♀ am Frauenfeld bei Admont 17. VI. (K), zwei ♀♀ Plesch-Vorberg bei Hall 8. VII. (K).

871. \* *L. comitata* L. Ein ♀ Admont am Licht 13. VII. (K).

Band V: *Geometridae* (Fortsetzung).

875. \* *Tephroclystia* Hb. (= *Eupithecia* Curt.) *oblongata* Thnbg. ein ♀ Admont am Licht (abgeflogen) 14. V. (K), det. Dr. REBEL.
881. *T. pusillata* F. Admont am Licht ♂♂ V., VI. und ein Stück im Gesäuse (Heindlkar) auf Föhren 14. VI. (K), alle det. Dr. REBEL.
883. *T. indigata* Hb. (Siehe Fauna) ein ♀ Kematenwald bei Admont 28. V., leg. STROBL war fälschlich als *castigata* Hb. bestimmt! (det. Dr. MACK, rev. Dr. ZERNY).
884. *T. strobilata* Bkh. Ein großes ♂ in Aigen bei Admont an einem Zaune 27. V. (K), det. Hoffm., rev. KLOS.
886. \* *T. insignata* Hb. Ein ♂ Admont am Licht 27. IV. (K), det. Hoffm.
893. \* *T. distinctaria* H. S. Umgebung von Gröbming (Dr. MACK).
895. *T. expallidata* Gn. Ein ♀ Admont am Licht 18. VIII. (K), det. KLOS.
896. *T. assimolata* Gn. (Siehe II. Nachtrag) ein dunkles Stück aus Admont vom 22. VIII. (K), von HÖFNER seinerzeit als *trisignaria* H. S. bestimmt (det. Dr. MACK, rev. Dr. ZERNY).
897. *T. absinthiata* Cl. Ein ♀ Admont am Licht 6. VIII. (K), det. KLOS.
900. \* *T. actaeata* var. *bergunensis* Dtz. Umgebung von Gröbming (Dr. MACK).
902. *T. vulgata* Hw. Ein ♂ Admont 20. V. (K), det. Dr. MACK, rev. Dr. ZERNY.
906. *T. lariciata* Frr. Ein ♂ Rottenmanner Tauern 21. VI. (K), det. Dr. REBEL. Das am 15. VII. 1912 in Admont gefangene ♂ (K), von HÖFNER als *virgaureata* Dbld. bestimmte Stück gehört auch hier! (det. Dr. MACK, rev. Dr. ZERNY).
907. *T. castigata* Hb. Ein ♂ ein ♀ Admont am Licht V. (K), det. Dr. REBEL — ein Stück am Frauenfeld bei Admont 17. VI. (K), rev. Dr. REBEL —, ein ♀ Rottenmanner Tauern 18. VII. (K), rev. KLOS. — Alle drei als *satyrata* Hb. bestimmten Stücke aus Admont vom VI. 1913 (K) sind *castigata*! (det. Dr. MACK, rev. Dr. ZERNY).
909. *T. veratraria* H. S. ♂ und ♀ Hoffeld bei Admont an Zäunen VI. (K), rev. KLOS — var. \* *cynensata* Grasl. Ein großes, liches ♀ 30. V. Hoffeld am Zaun (K), rev. Dr. REBEL, zwei ♀♀ ebendort VI. (K), rev. HOFFMANN-KLOS —, ein ♀ Kematen ob Admont auf Blumen 7. VI. (K), rev. Dr. REBEL.

912. *T. satyrata* Hb. Ein ♂ Mühlau (Hall bei Admont) V. am Licht (K), ein ♂ Gstattmeier Alpe (Mühlau) 5. VII. (K), beide Stücke det. Dr. MACK, rev. Dr. ZERNY.
923. *T. plumbeolata* Hw. Zwei ♀♀ Aigen und Krumau auf Sumpfwiesen anfangs VI. (K), det. Dr. REBEL — ein ♂ Admont 27. V. (K), rev. Dr. REBEL — Kaiserau 29. VI. (K), rev. Dr. REBEL.
- 923 a. \* *T. thalictrata* Püng. Eine Raupe an *Thalictrum* in Pürgg, Ende VII. 1940 (Dr. MACK) (neu für Steiermark!).
932. \* *T. exiguata* Stph. Ein ♀ Admont 26. V. (K) rev. Klos.
933. *T. lanceata* Hb. Ein ♂ Admont am Licht 25. IV. (K), det. Hoffm. — ein Stück von Rötelstein bei Admont 13. IV. aus Fichten aufgescheucht (K).
934. *T. sobrinata* Hb. ♂ und ♀ Admont am Licht VIII., darunter ein ♀ vom 9. V.! (K) det. Hoffm.
937. *Chloroclystis rectangulata* L. ab. *cydoniata* Bkh. Ein ♂ Gesäuse 8. VI. 1905 (K) det. Dr. MACK, rev. Dr. ZERNY.
939. *Chl. chloërata* Mab. Zwei ♂♂ Umgebung von Admont an Zäunen im VI. (K) det. Hoffm.
942. *Phibalapteryx tersata* Hb. Ein ♀ Admont am Licht 17. VI. (abgeflogen) (K), rev. Dr. REBEL.
943. *Ph. aemulata* Hb. Ein ♂ dunkel bestäubt 19. VI. Admont am Licht (K), det. Dr. REBEL.
944. \* *Ph. calligraphata* H. S. Drei Raupen an *Thalictrum* in Pürgg, Ende VII. 1940 (Dr. MACK).
950. *Bapta bimaculata* F. Ein ♀ Palfau (leg. P. BONIFAC), ein ♂ Kematen 14. V. (K).
953. *Deilinia pusaria* L. Ein ♂ Frauenfeld bei Admont 17. VI. Die äußeren Querstreifen kräftig, die anderen fast ganz erloschen, sowohl auf den Vorder- als auf den Hinterflügeln (K).
954. *Deil. exanthemata* Sc. Ein ♂ schwacher Übergang zu ab. \* *unicolorata* Teich. Mühlau im V. am Licht (K), rev. Hoffm.
955. *Numeria pulveraria* L. Ein ♀ Mühlauerwald bei Admont 10. V. starker Übergang zu ab. \* *unicolor* Hirschke (Begrenzung des Bandes nur nach innen deutlich; Band kaum dunkler als die Grundfarbe der Vorderflügel (K).

B a n d VI: *G e o m e t r i d a e* (Fortsetzung).

963. *Ennomos fuscantaria* Hw. Ein ♀ trans ad ab. \* *perfuscata* Rbl. Admont am Licht! 4. X. (K), rev. Hoffm.

966. *Selenia bilunaria* Esp. g. ab. *juliaria* Hw. Ein ♂ Mühlau am Licht (K).

968. *S. tetralunaria* Hfn. g. ab. \* *aestiva* Stgr. Ein ♀ 24. VII. ein ♂ 1. VIII. am Licht Admont (K).

971. *Gonodontis bidentata* Cl. ab. \* *edentata* Rebel (= *edentula* Krulik). Ein ♂ Admont am Licht 30. V. (K).

ab. \* *defasciata* Kiefer (beschrieben Krancher, Ent. Jahrbuch 1916), ein ♂ der Form *edentata* mit fehlenden Querstreifen der Vorderflügel 4. IV. am Licht Admont (leg. Frater OTTO SOHERR).

972. *Himera pennaria* L. trans ad ab. \* *bifidaria* Hw. Ein ♂ Admont 5. X. am Licht (K) trans ad ab. \* *castanearia* Lamb. Ein ♂ Admont am Licht 20. IX. (K).

973. *Crocallis elinguaris* L. Admont (Stiftsgarten) eine Puppe gefunden, ergab den Falter, ein ♀, am 31. VIII. (K). — ab. *trapezaria* B. Ein ♂ Admont am Licht 10. VIII. (leg. P. OTTO), rev. Hoffm. — ab. \* *fasciata* Gillmer ein ♂ Mühlau am Licht VII. (K), rev. Hoffm.

974. *Angerona prunaria* L. nov. ab. \* *minor* Kiefer. Die Falter unserer Gegend sind auffallend klein: ♂ 20 mm, ♀ 23 mm Vorderflügelänge. Das ♂ ist sehr reich braungrau gestrichelt, Fransen an den Adernenden der Vorderflügelspitze durch einen tiefbraungrauen, etwa  $\frac{1}{2}$  cm langen Wisch verbunden, dann deutlich gefleckt. ♀ licht ockergelb, schwach gezeichnet, aber mit kräftigem dunkelbraungrauen Mittelstrich aller Flügel. Adernenden schwach braungrau markiert. — Gesäuse, Veitlgraben gegen Kaiserau, Spitzenbachgraben bei St. Gallen (KIEFER, STROBL) im Juni — Johnsbach, Weichselboden (Dr. ZERNY); auch bei Krieglach auffallend kleine Falter! (Siehe HOFFMANN-KLOS, Bd. VI, S. 16).

NB. Unsere Falter dürften vielleicht mit der im SEITZ, Suppl. Bd. IV, Tafel 27 h, abgebildeten *alpina* Kitt (beschrieben in Lieferung 90, S. 354 — ausgegeben am 2. März 1940) identisch sein, nur vermisse ich bei dem abgebildeten ♂ den dunklen Wisch in der Vorderflügelspitze, der auch in der Beschreibung nicht erwähnt ist; auch die Beschreibung der weiblichen Form fehlt (K).

ab. \* *spanbergi* Lampa, ein ♂ dieser prächtigen, auffallenden und seltenen Form, ohne braune Querstrichelung, Grundfarbe schön ockergelb (kleiner als die Stammform!), fing HELMUT SCHNEIDER im Kematenwald ob Admont am 22. V. 1934. Das Stück wurde von mir für die »steirische Sammlung« des Naturhistorischen Museums in Admont (jetzt im Joanneum in Graz) erworben (K).

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1942-1943

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales 13-16](#)