

### III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

Von H. Kieffer, Admont (Steiermark).

(Fortsetzung von Seite 32.)

1047. *Cleogene niveata* Sc. Rottenmanner Tauern (Stein am Mandl) VII., VIII., ♂♂ häufig auf Almböden schwärmend, auch ♀♀ (K).

1048. *Scoria lineata* Sc. Aigen bei Admont auf Sumpfwiesen 22. V., nicht selten, darunter ein ♂ mit kräftig gezeichneter und stark schwarz bestäubter Vorderflügel-Unterseite (K).

Band VII: Fortsetzung der *Bombycidae*.

(*Sarrothripidae*, *Chloephoridae*, *Syntomidae*, *Arctiidae*.)

1058. \* *Sarrothripus revayana* Sc. Ein ♂ Admont e. l. 31. VII. aus einer Puppe vom Stiftsgarten in Admont (K), det. KLOS.

1061. *Hylophila prasinana* L. Aus einer Raupe (Umgebung von Admont), ein ♂ e. l. 29. III. (leg. P. OTTO SOHERR). — Ein ♂ Mühlau am Licht VI. (K). — Ein ♀ Palfau (leg. P. BONIFAC). — ab. \* *rubrostrigata* Rbl. ein schön rot gezeichnetes ♂ Admont am Licht 19. V. 1936 (K).

1064. \* *Dysauxes ancilla* L. Ein Stück Ende VII. 1940 in Pürgg (Dr. MACK).

1066. *Spilosoma lutea* Hufn. ab. \* *pauper* Hoffmann. Zwei ♂♂ Mühlau am Licht VI. (K), rev. Hoffm.

1067. *Sp. lubricipeda* L. (= *menthastri* Esp.) ab. *paucipuncta* Fuchs. Ein ♂ Admont und ein ♂ Mühlau am Licht V. (K).

1068. *Sp. urticae* Esp. Ein ♂ Mühlau am Licht 19. VI. (K), det. Dr. ZERNY.

1071. *Parasemia plantaginis* L. Nicht selten im Juli, August im Gesäuse (W), ♂♂ am Pleschgipfel Mitte VII. nachmittags im Sonnenschein schwärmend angetroffen; auch Variationen darunter! (K.) — ab. *hospita* Schiff. ein ♂ Stein am Mandl 21. VI. (K). — ab. *hospita* trans ab. \* *bicolor* Rätz. ein ♂ Pleschgipfel VII. (K). — ab. *subalpina* Schaw. ein ♀ Kaiserau bei Admont auf Sumpfwiesen 31. VII.; es legte 166 Eier ab. Eine Puppe unter einer Felsplatte am Stein am Mandl-Gipfel 18. VII. ergab während des Transportes den ♀ Falter (K). — Ein ♀ Mühlau am Licht Anfang VIII., ein ♀ Kematen 22. VI. — ab. *lutea-obsolata* Tutt. ein ♂ Pyhrngas-Gatterl.

29. VI. (K). — Ein ♂ Zeiritzkampel bei 1800 m 12. VIII. (K). — ab. *matronalis* Frr. zwei ♂♂ am Pleschgipfel 13. VII., ein ♂ Kaiserau auf Sumpfwiesen 17. VI., ein ♂ Zeiritzkampel bei 1800 m 12. VIII. (K). — ab. *nigrociliata* Schaw. ein ♀ Aigen bei Admont 29. VI. der Form *lutea-subalpina* Schaw. mit schwarzen Fransen! (K.) — ab. *subalpina-nigrociliata* Schaw. ein ♀ Hinterwinkel (Buchstein) 4. VIII. 1931 (K).

1072. *Rhyparia purpurata* L. Zehn Stücke am Licht ♂♂ und ♀♀ auch unter Tags fliegend angetroffen: Gesäuse Anfang VII. (W). — Eine Raupe vom Aigner Moor ergab den Falter, ein ♂ am 18. VII. (K).

1073. *Diacrisia sannio* L. Nicht selten im Gesäuse VII., VIII. (W). — Zwei ♀♀ aus Palfau (leg. P. BONIFAC). — trans ab. *moerens* Strand. zwei ♀♀ Kainisch Moor 15. VII. und Hall (Ennswiesen) 26. VI. (K).

1075. *Arctia caja* L. Ein ♂ Mühlau am Licht mit zwei nur ange deuteten Fleckchen am Hinterleib ist Übergang zu *rubro-dorsalis* Schultz. — ab. \* *confluens* Rbl. Admont am Licht 25. VIII. ein ♂, 14. VIII. ein ♀ e. l. — Ein ♀ Umgebung von Admont, 4. VIII.: Grundfarbe der Vorderflügel tief dunkelbraun, die Hinterflügel rot und gelb gefleckt und zusammengeflossene schwarze Flecke, sehr bunt aussehend! (K.)

1078. \* *A. villica* L. Ein ♂ erhielt ich von einem Fischer aus dem Gesäuse am 28. V., leider abgeflogen, daher die Flecke der Vorderflügel nahezu weiß; es ist dies aus dem Ennstale der erste Falter dieser Art! (K.)

1079. *Pericallia matronula* L. Ein ♀ der Stammform aus Palfau (P. BONIFAC S.). — Ein ♀ wurde mir von einem Schüler am 4. VI. gebracht, das er am Wege von Unter-Laussa zum Bahnhofs in Weißenbach a. d. Enns fing (K). — Ein Stück wurde Mitte VII. von einem Studenten auf der Straße über den Radstatt nach Gams bei Hieflau im grellen Sonnenschein gefangen (K).

1080. *Callimorpha dominula* L. Im Gesäuse nicht selten VII., VIII. (W). — ab. *minor* Bartel. ein ♂ Admont 30. VI. (K) und ab. \* *hame lensis* Pfluemer; ein ♂ fing seinerzeit STROBL im Gesäuse (det. KIEFER, rev. Dr. ZERNY).

1081. *C. quadripunctaria* Poda. Gesäuse ♂ und ♀ 2. VIII. (K).

1082. \* *Coscinia cribrum* var. *punctigera* Frr. Krumpental bei Eisenerz (Dr. MACK).

1087. *Endrosa irrorella* Cl. Mühlau bei Admont ein ♂ VIII. am Licht (K), Stoderzinken ein ♂ 11. VIII., Kaiserau ein ♀ 20. VII.,

ein ♂ Admonter-Haus 3. IX. (K). — var. *nickerli* Rbl. ein ♂ Scheibl-  
egger Hochalm 27. VII. (K), rev. Dr. ZERNY.

1089. *Cybosia mesomella* L. ♂ und ♀ Krumauer Sumpfwiesen  
23. VII. (K). — ab. \* *cremella* Krul. ein ♀ und ein ♂ (letzter ohne  
Punkte!) ebendort 14. VII. (K).

1090. *Gnophria rubricollis* L. Zwei Stücke im Gesäuse VII. (W).

1092. *Lithosia deplana* Esp. Ein ♀ 25. VIII. Krumauer Sumpf-  
wiesen am Köder gefangen (K).

1100. *L. cereola* Hb. ♂♂ Kamleralm ob Hall 14. VIII. (K), rev.  
Hoffm. — Das Stück aus Admont vom 18. VII. (siehe HOFFMANN-  
KLOS Bd. VII, dort als *sororcula* Hufn. angegeben!) ist eine *cereola*!  
(det. Dr. MACK).

♂ ♀ ♂ ♂      *Zygaenidae*.

1102. *Zygaena purpuralis* Brunn. Zwei ♂♂ ein ♀ Kainisch-Moor  
15. VII. und ein ♂ Dörfelstein bei Hall 12. VII. (K).

1104. *Z. achilleae* Esp. ab. *confluens* Dziurz. Ein ♂ Gesäuse 3. VII.,  
ein ♀ (Übergangsform) Kamleralm 25. VIII. (K), det. Hoffm.

1106. *Z. meliloti* Esp. Admont und Umgebung ♂ und ♀ auf Sumpf-  
wiesen, aber nicht häufig! VII., VIII.; auch auf der Kaiserau auf  
sumpfigem Gebiet gefangen (K). Das von STROBL in Admont am  
18. VII. 1896 gefangene Stück, fälschlich als *angelica* O. bestimmt,  
gehört hierher! (det. Dr. MACK).

1108. *Z. lonicera* Scheven. Zwei ♂♂ Kamleralm ob Hall 16. VIII.  
Flecke durch rote Bestäubung verbunden, wie bei *filipendulae*! (K),  
rev. KLOS. — ab. \* *carnea* Spul. ein ♀ Kamleralm 16. VIII. mit  
breitem Rand der Hinterflügel und fleischfarbigen Flecken der  
Vorderflügel (K), rev. KLOS.

1109. *Z. filipendulae* L. trans ad ab. \* *miniata* Tutt. Ein ♂ Selz-  
tal auf Sumpfwiesen 23. VI. (K), rev. Hoffm. — ab. \* *bipunctata*  
Selys. ein ♂ Selztal auf Sumpfwiesen 8. VII. (K), rev. Hoffm. —  
ab. \* *stephensi* Dup. ein ♂ Gesäuse (leg. STROBL). Die *transalpina* v.  
*astragali* Bkh. aus dem Gesäuse vom 13. VIII. 1903 (siehe HOFF-  
MANN-KLOS, Bd. VII) ist eine *filipendulae* L. (det. Dr. MACK).

1110. *Z. angelicae* O. Gesäuse ein ♂ 21. VII., Kamleralm ein ♂  
7. VIII. (K), det. Dr. MACK.

(Schluß folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1942-1943

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [III. Nachtrag zur Mäkrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales 38-40](#)