

auch noch weit im Vorgelände nördlich der Karpathen. Dr. PRZEGENDZA (Ent. Zeitschr. 47, 1933, S. 27) hat nach einer kleinen Serie aus Szerszeniowce im Dniestrgebiet die var. *polonia* Przeg. beschrieben, deren Hauptmerkmal ebenfalls die dem *orion*-Typ nahestehende Flügelform ist. Ich konnte größeres Material aus Szerszeniowce und von verschiedenen anderen Standorten des gleichen Gebietes untersuchen und ich fand den Befund Dr. PRZEGENDZAS vollauf bestätigt. Doch ist dieses Merkmal bei der var. *polonia* Przeg. nicht mehr so auffällig wie bei der var. *austrocarpathica* m. oder gar bei der var. *praecarpathica* m. Sonst steht die var. *polonia* Przeg. der var. *austrocarpathica* m. sehr nahe.

Zu der gleichen Rassengruppe, die ich in einer Unterart ssp. *polonia* Przeg. (nach der zuerst beschriebenen Rasse des Gebietes) zusammenfassen möchte, dürften auch noch weitere Populationen Ostgaliziens gehören, obwohl bei ihnen das charakteristische Merkmal des *orion*-ähnlichen Flügelschnittes schon bedeutend abgeschwächt ist. Mir lag eine größere Serie aus Lesienice bei Lemberg und Einzelstücke aus verschiedenen Standorten des gleichen Gebietes vor. Selbst aus Pyry bei Warschau konnte ich eine Rasse feststellen, die neben anderen Besonderheiten einen breiten, runden Flügelschnitt aufweist, der auffallend *orion*-ähnlich ist (var. *warszawiensis* Hol.). Diese Rasse dürfte aber nicht mit ssp. *polonia* Przeg. in Zusammenhang stehen, sondern eine isolierte Rasse mit zufällig ähnlichem Flügelschnitt sein.

Die im Gebiet der Bialowieser Heide fliegende, zu var. *osterodensis* Reiß gehörige Population, ebenso die var. *irpinjensis* Hol. u. Reiß aus der Umgebung von Kiew gleichen im Flügelschnitt den mitteldeutschen Rassen.

Die Schuppenform dieser Karpathen- und polnischen Rassen mit *orion*-ähnlichem Flügelschnitt kennzeichnet sie als richtige *scabiosae* Schew. Sie haben die einfachen, schmallanzettlichen, an der Spitze ungeteilten Schuppen, der nördlich der Alpen, auf dem Balkan und ostwärts bis nach Zentralasien fliegenden *scabiosae*-Rassen. Die zur *orion*-Gruppe gehörenden subalpinen, italienischen und südfranzösischen Rassen haben dagegen breitere, an der Spitze eingekerbte Schuppen.

Anfrage:

Wann und wo sind folgende Schwärmerhybriden beschrieben? Bitte um Benachrichtigung bis Mitte Dezember 1942, da ich die Angaben zu einer Arbeit benötige.

- Col. hybr. *euphorbiae* L. × *mauretanica* Stgr.
 » » *tithymali* Bsd. × *conspicua* R. u. J.
 » » *conspicua* R. u. J. × *vandalusica* Rbb.

- Col. hybr. *conspicua* R. u. J. \times *deserticola* Brtl.
 » » *grentzenbergi* Stgr. ♂ \times (*euphaës* Dso. \times *grentzenbergi* Stgr.) ♀.
 » » *grossei* Dso. \times *vandalusica* Rbb.
 » » *hippophaës* Esp. \times *grentzenbergi* Stgr.
 » » *galiphorbiae* Dso. \times *dahli* Geyer
 » » *grossei* Dso. \times *dahli* Geyer
 » » *castissima* Aust. \times *euphorbiae* L.
 » » *castissima* Aust. \times *conspicua* R. u. J.
 » » *helenae* Gr. \times *grossei* Dso.
 » » *grossei* Dso. \times *helenae* Gr.
 » » *gallii* Rott. \times *helenae* Gr.
 » » *gallii* Rott. \times *vandalusica* Rbb.
 » » *grentzenbergi* Stgr. \times *gallii* Rott.
 » » *gallii* Rott. \times *selmonsi* Fisch.
 » » *gallii* Rott. \times *hippophorbiae* Dso.
 » » *euphaës* Dso. \times *euphorbiae* L.
 » » *livornica* Esp. \times *grentzenbergi* Stgr.
 » » *livornica* Esp. \times *vandalusica* Rbb.
 » » *gallivornica* Gr. u. K. \times *euphorbiae* L.
 » » *gallivornica* Gr. u. K. \times *helenae* Gr.
 » » *gallivornica* Gr. u. K. \times *gallii* Rott.
 » » *lineata* F. \times *gallii* Rott.
 » » *lineata* F. \times *hippophaës* Esp.
 » » *lineata* F. \times *conspicua* R. u. J.
 » » *walteri* (= *dahli* \times *euphorbiae*) Tur. \times *lineata* F.
 » » *lineata* F. \times *walteri* Tur.
 » » *tenerifana* Fisch. \times *euphorbiae* L.
 » » *elpenor* L. \times *grentzenbergi* Stgr.
 » » *elpenor* L. \times *vandalusica* Rbb.
 » » *tithymali* Bsd. \times *elpenor* L.
 » » *galiphorbiae* Dso. \times *elpenor* L.
 » » *euphorbiae* L. \times *euphaës* Dso.
 » » *populi* L. \times *excaecatus* Abb.
 » » *excaecatus* Abb. \times *populi* L.
 » » *excaecatus* Abb. \times *myops* Abb. u. Sm.
 » » *ocellata* L. \times *langi* Stdfs.
 » » *geminatus* Abb. \times *myops* Abb. u. Sm.

Für kurze Nachricht an meine Privatanschrift wäre ich sehr verbunden.

GÜNTHER PRACK, Frankfurt a. M./Süd, Oskar-Sommer-Str. 10.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1942-1943

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Prack Günther

Artikel/Article: [Anfrage: 199-200](#)