Seltenere Arten und Formen: *Tephrocl. dodoneata* Gn. am 30. 4.; *Lob. halterata* Hfn. am 8. 5.; *Eub. murinaria* F. am 14. 5.; *Lept. sinapis* L. am 20. 5.; *Col. hyale* ♀ f. *flava* Husz. am 22. 5.; ♂ und ♀ *Zyg. achilleae cingulata* Dzsz. am 4. 6.; *Thecla pruni* L. am 5. 6.; *Apl. ononaria* f. *faecataria* Hb. am 13. 8. Ich bemerke hierzu, daß diese *L. sinapis* L. und *Th. pruni* L. die ersten Falter ihrer Art sind, die ich in 30jähriger Sammeltätigkeit bei Naumburg beobachtet habe. Ferner ist hier noch ein am 6. 5. gefangener zwerghafter ♂ von *Euchl. cardamines* zu erwähnen. Er hat die Größe eines ♂ von *Lyc. bellargus* Rott.

Melanismen: 1 *Acronicta psi*, dunkelgrau übergossen, gefunden an einem Kirschbaume auf einem Feldwege; eine stark verdunkelte *Xanthia ocellaris* Bkh., geschlüpft am 11. 9.

Albinismen wurden nicht beobachtet.

Sonstiges: Am 16. 6. früh 8¾ Uhr beobachtete ich, wie 1 ♂♀ von *Asthena candidata* Schiff. in Copula gingen.

Die *Larentia*-Raupen, die man im Herbst von Waldlabkraut einträgt, sind fast alle von Schmarotzern besetzt. So war es auch wieder 1943. Von etwa 90 Raupen erhielt ich nur 10 Puppen. In diesem Jahr war der Anteil der Parasiten an diesem Ergebnisse aber umgekehrt als sonst. Während nach meinen bisherigen Beobachtungen eine *Microgaster*-Art gewöhnlich mit 90 v. H. und eine Braconide mit 10 v. H. beteiligt waren, stellten sich diese Anteile diesmal auf etwa 10 v. H. für die *Microgaster* und 90 v. H. für die Braconiden.

»Entomologischer Frühling in der Ukraine«.

In Anbetracht der zahlreichen Veröffentlichungen über das Vorkommen der *Hel. scutosa* in Deutschland möchte ich meine unter obiger Überschrift in Nr. 13, Jahrg. 57 der Ent. Ztg. erschienene Notiz dahin berichtigten, daß es sich bei der in der Ukraine sehr häufig auftretenden Tageule nicht um *Hel. armigera*, sondern um *Hel. scutosa* handelte. *H. scutosa* war in weiten Gebieten (von Poltawa bis Kriwoy-Rog) zusammen mit einer großen Form von *H. dipsaceus* (wohl v. *bulgaricus*) die häufigste Tageule.

NADBYL.

Berichtigung.

Zu meinem Artikel über *Gonospileia mi* Cl. in Nummer 4 vom 1. Juli 1944 in der Ent. Zeitschrift ist zu bemerken, daß sich inzwischen herausgestellt hat, daß die Form mit der in Wien befindlichen Type der *explanata* Rbl. zu identifizieren, also nicht neu ist und der neue Name zu kassieren ist. FRANZ LENZEN.

Druck von H. Laupp jr in Tübingen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1944

Band/Volume: 58

Autor(en)/Author(s): Nadbyl Hans P.

Artikel/Article: "Entomologischer Frühling in der Ukraine" 48