© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Zur Synonymie einiger europäischen Staphylinen.

(Aus **Erichson's** Nachlasse.)

Als Erichson die Genera et Species Staphylinorum herau gab, war ihm eine Anzahl nordischer, von Gyllenhal, Mannerhei und Sahlberg beschriebener Arten dieser Familie unbekannt g blieben. Später lernte er einen Theil derselben durch eine Z sendung typischer Exemplare von Graf Mannerheim kennen. D Exemplare wurden von Erichson an den Besitzer zurückgesan dem letzteren auch die Aufschlüsse, die sich bei der Vergleichu derselben ergeben hatten, zur Publication mitgetheilt.

Da seitdem mehrere Jahre vergangen sind, und Graf Ma nerheim Nichts über diesen Gegenstand veröffentlicht hat, so ha ich hier die Bemerkungen zusammengestellt, welche sich Eric son in sein Exemplar seiner Monographie eingetragen hat Wahrscheinlich machen sie den grössten Theil derjenigen a welche Erichson an Graf Mannerheim übersandt hat. Sollte d letztere noch einige weitere Aufklärungen zu geben im Stan sein, so erfüllt er hoffentlich die hier öffentlich ausgesproche Bitte, sie den Coleopterologen nicht länger vorzuenthalten.

H. Schaum.

Ocalea badia Er. Gen. et spec. Staph. p. 61 pica Steph. = Aleoch. prolixa Gyll., Ocalea? prol. Er. p. 63.

Calodera protensa Mannh. (Er. p. 69.) — Erichs hat dazu bemerkt „A C. humili Er. p. 65, nonnisi thora paulo longiore distinctius canaliculato antennisque paulo forti ribus differt et nonnisi sexu distincta videtur."

Calodera testacea Mannh. Sahlb. ist aus den Synon men der C. aethiops p. 68 zu streichen, sie gehört zu Phloe pora reptans.

Aleochara flavitarsis Sahlb. (Tachyusa? f. Er. p. 7 = T. chalybaea Er. p. 916.

Bolitochara carbonaria Mannh. (Tachyusa? c. E p. 75) „Specimen typicum Mannerheimii omnino cum T. coer lea p. 76 convenit et nonnisi pinguedine corruptum est. coerulea a T. chalybaea satis distincta."

Homalota vestita Er. p. 84. — Hierher gehört au Aleochara crassicornis Gyll., Bolit. crass. Mannh., Hom crassic. Er. p. 134.

Homalota elongatula Er. p. 89. Bolitochara pl niuscula Mannh. und depressiuscula Mannh. sind aus d Synonymen dieser Art zu streichen, die erste gehört zu H. linea ris, die letzte zu H. plana.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Homalota aequata Er. p. 92 = Bol. linearis Mann. Gnum. Brach. 79. 24.

H. plana Er. p. 93. Zu den Synonymen dieser Art gehört ausser Bol. depressiuscula Mannh. auch B. compressa Mannh. (Er. p. 136 H. angustata.)

Homalota socialis Er. p. 102. — Bol. castanoptera Mannh. gehört zu var. b, nicht zu var. a, wie Erichs. Gen. et Spec. Staph. p. 103 angegeben ist.

Homalota ochracea Er. p. 104 = Bol. axillaris Mann. —

Homalota clancula Er. p. 114 = Bol. atrata Mannh. Placusa atr. Er. p. 198.

Homalota testudinea Er. p. 131 = Oxypoda melaaria Mannh. Er. p. 151.

Homalota? parva Er. p. 139. Erichson hat dazu bemerkt „H. orphanae proxima, differt prothorace canaliculato anorsum magis angustato.

Oxypoda heluola Er. p. 147 = Oxyp. cingulata Mannh. Er. p. 153 = Bolit. annularis Mannh. Hom.? ann. Er. p. 135.

Oxypoda promiscua Er. p. 148 = Bol. haemorhoa Mann. Homalota h. Er. p. 135 = Oxyp. obfuscata Mannh. Brach. 72. 12, von Erichson irrig zu Homalota aterrima . 134 gezogen.

Oxypoda prolixa Er. p. 155. = Bol. elegantula Mannh. Oxypoda e. Er. p. 158.

Oxypoda pulchella Er. p. 157, Bol. pulchella Mannh. Zu dieser Art hat Erichson bemerkt: „O. anali proxima et nonnisi antennis apice fortiter incrassatis vix distincta."

Oxypoda suturalis Er. p. 157, Bol. suturalis Mannh. Eigene Art.

Oligota subtilis Er. p. 180 = Microcera inflata Mannh.

Boletobius speciosus Er. p. 277 = Bol. lunulatus Mannh.

Boletobius lunulatus Er. p. 278 = Bol. pulchellus Mannh. Er. p. 281, ist eine Varietät, an welcher die Basis der Flügeldecken bis zur Mitte roth ist.

Staphylinus inauratus Mannh. Er. p. 363. Von St. murinus durchaus nicht verschieden.

Ocypus brunnipes Er. p. 410 = St. erythropus Mannh. Brach. 24. 22, irrig als Synonym von St. fulvipes Er. . 383 aufgeführt.

Ocypus fuscatus Er. p. 411 = St. uralensis Mannh., von Erichson irrig als Synonym von O. ater p. 416 angesehen.

 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Philontus aeneus Er. p. 437 = St. cyanicorn Mannh. Brach. 27. 45.

Philontus caucasicus Er. p. 466 = Ph. dimidiat Mannh. Er. p. 480.

Omalium rivulare Er. p. 875, hierher auch O. Oxy canthae Mannh., welches als Synonym von O. caesum p. 8 aufgeführt ist.

Anthobium flavipenne p. 896 = lapponicum Ma Er. p. 899.

Anthobium fimetarium p. 899 = Lathrimaeum.

Notiz.

In diesem Jahre habe ich das südliche Spanien in zoolog scher, besonders entomologischer Hinsicht bereisen lassen. D Sammeln geschah vom 18. Februar an bei Cadiz und in dess Umgegend, dann bei Algeciras, Malaga, in der Sierra de Ron bei Granada und in der Sierra Nevada und wurde mit d 16. September geschlossen. — Die Ausbeute befindet sich s 3 Tagen in meinen Händen und kann ich dieselbe nur eine se gute nennen. Ueber die Doubletten derselben werde ich spät der entomol. Zeitung ein Verzeichniss beilegen und hoffe beso ders viele Wünsche nach andalusischen Coleopteren befriedig zu können. Ich will beispielsweise nur einige, in Mehrzahl e haltene Arten namhaft machen, als: Cymindis cordata, Aptin ballista, Siagona Jenissonii, Dejeanii, Ditomus cordatus, pilos Apotomus rufus, Carabus Dufourii, maurus, melancholicus, Pe cus politus, Dasytes scutellaris, Geotrupes Hoffmanseggii, An mala vagans, Asida Ramburii, montana, cincta, die beiden M rica, Adelostoma carinatum, Anthicus coeruleipennis. Auch a den übrigen Thierklassen habe ich schätzbare Arten erhalten, z. B. den neuen Steinbock Ibex hispanica Schimp., den neu Hasen Lepus granatensis Schimp. in zahlreichen Exemplare dann Vögel u. s. w.

Erlangen, den 5. December 1849.

Dr. Med. Rosenhauer.

Einladung zur Actienzeichnung.

Der Unterzeichnete gedenkt im Anfang des nächsten Jahr seine dritte Actienreise und zwar nach Manfredonia im östlich Neapel anzutreten und erlaubt sich dazu in der Art einzulade Die Bedingungen sind dieselben wie bei der Reise nach Sard nien, 1 Actie zu 10 Thlr. Pr., wofür 350 Käfer in 150 — 20 Arten gegeben werden. Neu eintretende Actionaire können a Verlangen auch von den noch übrigen Spanischen und Sardin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitung Stettin

Jahr/Year: 1849

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Schaum Hermann Rudolph

Artikel/Article: Zur Synonymie einiger europäischen Staphylinen 372-374