

- Juni.** Vereinsangelegenheiten. Zeller: Lepidopterologische Mittheilungen. v. Heyden: Antwort. Schneider: Recension der Revue des Odonates von Sélvs und Hagen. v. Fahraeus: Käferfauna von Bad Ems. Intelligenz. Zebe: Synopsis der deutschen Käfer (Forts.).
- Juli.** Vereinsangelegenheiten. Nicelli: Lithocolletis Stettinensis. Grimm: Hister ruficornis. Dohrn: Ueber entomologisches Küchenlatein. Kraatz: Bemerkungen über Cryptophagus. Hagen: Neuroptera Linn. (Schl.). Mannerheim: Bemerkungen über einige seltene Coleoptera Finnlands. Intelligenz. Zebe: Synopsis der deutschen Käfer (Forts.).
- August.** Vereinsangelegenheiten. Dohrn: Uebersetzung einer anatomisch - physiologischen Abhandlung von De Filippi. Dohrn: Literarisches. Speyer: Verbreitung der Schmetterlinge in Deutschland. Zebe: Synopsis der deutschen Käfer (Forts.).
- September.** Vereinsangelegenheiten. Dohrn: Literarisches (Schl.) Bemerkungen über Geotrupes (von einem süddeutschen Entomologen). Intelligenz. Speyer: Verbreitung der Schmetterlinge in Deutschland (Forts.). Zebe: Synopsis der deutschen Käfer (Forts.).
- October.** Speyer: Verbreitung der Schmetterlinge in Deutschland (Schluss). Zebe: Synopsis der deutschen Käfer (Fortsetzung).
- November.** Kraatz: Bemerkungen über Anisotoma Knoch. F. Schmidt. Zwei neue Arten von Leptoderus. Boie: Bemerkungen über einige Lepidoptera. Küster: Beiträge zur europäischen Rhynchotenfauna. Kraatz: Revision der europäischen Arten der Gattung Catops. Zebe: Synopsis der deutschen Käfer (Forts.). Intelligenz: Käfercatalog.
- December.** Dohrn: Rede zur Stiftungsfeier. Vereinsangelegenheiten. Zeller: Die Raupe von Polyommatus Corydon. Kraatz: Revision der europäischen Arten der Gattung Catops (Schluss). Kraatz: Synonymische Bemerkungen über Staphylini. Intelligenz. Zebe: Synopsis der deutschen Käfer (Forts.). Inhalt. Register.

Register.

A.	pag.		pag.
Abia mutabilis . . .	106	Aelia Germari . . .	391
Acidalia siccanaria. . .	180	„ acuminata . . .	392
„ calabraria . . .	183	„ Burmeisteri . . .	393
„ tabidaria . . .	184	„ pallida . . .	394
„ emutaria . . .	184	„ Klugii . . .	396
„ flaccidaria . . .	185	Aleochara maura, languida	117
Acylophorus flavicollis .	143	Allantus rufocingulatus .	108

Ampedus ustulatus. . .	237
Anisotoma (sexuales). . .	378
„ Triepekii . . .	378
„ obesa . . .	379
„ silesiaca . . .	380

Aphodius conspurcatus . . .	100
Asindulum flavum . . .	49

B.

Blennocampa bicolor . . .	108
Boletobius angularis . . .	122
„ sellatus . . .	122

C.

Cardiophorus ustulatus . . .	237
Catocha latipes . . .	49
Catops (Revision) . . .	397
„ . . .	sqq.
Cephus orientalis, pulcher . . .	139
Conurus pulicarius . . .	120
Corynoneura atra . . .	50
„ celeripes . . .	50
Cryptophagus baldensis . . .	227
„ quercinus . . .	228
„ fasciatus . . .	229

D.

Diadocidia ferruginosa 51. . .	53
Ditomyia fasciata . . .	54
„ macroptera . . .	54
Dolichurus Dahlbomi . . .	140

E.

Elater ustulatus . . .	237
------------------------	-----

F.

Falagria amabilis . . .	116
„ longicornis . . .	116

G.

Geometra gachtaria, pro-	
luata, scriptu-	
rata . . .	153
„ simplata, scri-	
pturata . . .	312
„ sicanaria . . .	180
„ calabrararia ⁸⁷ . . .	183
„ tabidaria . . .	184
„ emutaria . . .	184
„ flaccidaria . . .	185

Geotrupes stercorarius,	
mutator, putri-	
darius . . .	303
„ alpinus . . .	310

H.

Heterocnemis graeca . . .	46
Heteropeza nervosa . . .	50
Hister ruficornis . . .	221
Hylotoma Frivaldszkyi . . .	107

L.

Leptinus testaceus . . .	100
Leptophya . . .	74
Lithocoll. elatella, lautella,	
triguttella . . .	78
„ nigrescentella . . .	79
„ quinqueguttella . . .	80
„ pomifoliella, co-	
ryli, pomonella,	
deflexella . . .	81
„ spinicolella fa-	
ginella . . .	82
„ carpinicolella,	
salicicolella, ul-	
mifoliella, spi-	
nolella . . .	83
„ quercifoliella,	
messaniella, ca-	
ledoniella . . .	84
„ corylifoliella . . .	85
„ viminiella . . .	86
„ scopoliella, uli-	
cicolella . . .	87
„ Dunningiella . . .	88
„ tristigella, stri-	
gifasciella, tri-	
fasciella . . .	89
„ stettinensis . . .	219
Liochton arcticus . . .	99
Lithosia depressa, helveola . . .	101

M.

Macrophya Ratzeburgi,	
superba . . .	137
„ flavipes . . .	138
Megarthus americanus . . .	149
Melly Nekrolog . . .	67

Monophadnus thoracicus.	pag. 107
„ rufoniger .	108
Mycetobia pallipes . .	52
Myrmedonia pygmaea. .	115
N.	
Narycia(Priorität d.Namens)	156
Nematus betularius . .	104
Neuroptera - Literatur. .	90

O.

Omalium Märkelii, rufum	148
Orthosia rubivora . . .	63
Oxypoda minuta . . .	116

P.

Pediaspis sorbi . . .	141
Philonthus paederinus. .	126
„ laetus . . .	127
„ caffer . . .	141
„ georgianus .	142
Planipennia (Gruppierung)	71
Platystethus armatus . .	146
Plesiastina annulata . .	55
„ apicalis . . .	56

Prognatha convergens. .	pag. 147
Pronomaea dalmatina. .	119
S.	

Silusa alternans . . .	118
„ gracilis . . .	119
Staphylinus synonym. 447	sqq.
„ capensis . . .	125
„ varipes . . .	126
Stilicopsis paradoxa . .	144
Stilicus capicola . . .	145

T.

Tachinus colonus . . .	120
„ rufus. . .	121
Tenthredo albopunctata	138
„ hungarica . . .	138
Tetragoneura sylvatica .	57
Thais Polyxena . . .	177

X.

Xantholinus Kiesenwetteri,	
hottentottus .	123
„ pusillus . . .	124
„ fallax . . .	125

Errata.

In dem Aufsätze „Neue Käfer“ von Dr. Sachse (s. No. 4 und 5.) sind folgende Unrichtigkeiten zu verbessern:

Boletobius angularis.

Das Halsschild ist nach der Spitze zu stark verengt, anstatt nach der Seite zu.
Xanth. hottentottus.

Die Flügeldecken — in unregelmässigen Reihen, statt in regelmässigen.
X. Kiesenwetteri.

Die Flügeldecken sind unregelmässiger punctirt (Punct). Schwarz glänzend etc.
X. pusillus.

Das Halsschild eher in das dunkel pechrothe ziehend, anstatt das Halsschildchen.

Die Punctreihen aus 9 — 10 Punkten, statt aus 9 — 19.

Philonth. paederinus.

Die Fühler — — gegen die Spitze zu kaum verdickt, anstatt: gegen die Spitze braun etc.

Die Flügeldecken sind kaum ein wenig länger als das Halsschild, anstatt braun etc. Schwarz, glänzend.

Vaterland Georgia.

Phil. caffer.

Statt dem Ph. nitidus ähnlich, lies dem Ph. rubidus ähnlich.

Nach der Spitze zu braun verdickt, lies kaum.

Stilicopsis paradoxa.

Der Kopf etc. ganz von der Form eines Stilicus. Es ist einzuschieben, ganz von der Form des Kopfes eines Stilicus.

Stilicus capicola.

Statt: Der Kopf — schwarz glänzend, lies schwarz, nicht glänzend.

Omalinus Märkelii.

Der Kopf — — ziemlich glatt: lies statt dessen flach.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Register 452-454](#)