

Monophadnus thoracicus.	107	pag.	Prognatha convergens.	147	pag.
„ rufoniger .	108		Pronomaea dalmatina .	119	
Mycetobia pallipes . .	52		S.		
Myrmedonia pygmaea. .	115		Silusa alternans . . .	118	
N.			„ gracilis . . . . .	119	
Narycia (Priorität d. Namens)	156		Staphylinus synonym.	447	sqq.
Nematus betularius . .	104		„ capensis . . . . .	125	
Neuroptera - Literatur . .	90		„ varipes . . . . .	126	
O.			Stilicopsis paradoxa . .	144	
Omalium Märkelii, rufum	148		Stilicus capicola . . .	145	
Orthosia rubivora . . . .	63		T.		
Oxypoda minuta . . . . .	116		Tachinus colonus . . . .	120	
P.			„ rufus. . . . .	121	
Pediaspis sorbi . . . . .	141		Tenthredo albopunctata	138	
Philonthus paederinus. .	126		„ hungarica . . . . .	138	
„ laetus . . . . .	127		Tetragoneura sylvatica .	57	
„ caffer . . . . .	141		Thais Polyxena . . . . .	177	
„ georgianus . . . . .	142		X.		
Planipennia (Gruppierung)	71		Xantholinus Kiesenwetteri,		
Platystethus armatus . .	146		hottentottus . . . . .	123	
Plesiastina annulata . .	55		„ pusillus . . . . .	124	
„ apicalis . . . . .	56		„ fallax . . . . .	125	

### Errata.

In dem Aufsätze „Neue Käfer“ von Dr. Sachse (s. No. 4 und 5.) sind folgende Unrichtigkeiten zu verbessern:

Boletobius angularis.

Das Halsschild ist nach der Spitze zu stark verengt, anstatt nach der Seite zu.  
Xanth. hottentottus.

Die Flügeldecken — in unregelmässigen Reihen, statt in regelmässigen.  
X. Kiesenwetteri.

Die Flügeldecken sind unregelmässiger punctirt (Punct). Schwarz glänzend etc.  
X. pusillus.

Das Halsschild eher in das dunkel pechrothe ziehend, anstatt das Halsschildchen.

Die Punctreihen aus 9—10 Punkten, statt aus 9—19.

Philonth. paederinus.

Die Fühler — — gegen die Spitze zu kaum verdickt, anstatt: gegen die Spitze braun etc.

Die Flügeldecken sind kaum ein wenig länger als das Halsschild, anstatt braun etc. Schwarz, glänzend.

Vaterland Georgia.

Phil. caffer.

Statt dem Ph. nitidus ähnlich, lies dem Ph. rubidus ähnlich.

Nach der Spitze zu braun verdickt, lies kaum.

Stilicopsis paradoxa.

Der Kopf etc. ganz von der Form eines Stilicus. Es ist einzuschieben, ganz von der Form des Kopfes eines Stilicus.

Stilicus capicola.

Statt: Der Kopf — schwarz glänzend, lies schwarz, nicht glänzend.

Omalinus Märkelii.

Der Kopf — — ziemlich glatt: lies statt dessen flach.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Errata 454](#)