

Synopsis

der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera

von **Gustav Zebe,**

Oberförster in Volpersdorf (Grafsch. Glatz.)

(Schluss.)

Chrysomeloidae.

(Fortsetzung.)

- Cryptocephalus** pallifrons Gyll. Mch. Oestr. Rgsbg.
 „ bistrispunctatus Crtz. Gl. auf jungen Eichen s. 8.
 Tyr. Oestr. Pr.
 — „ 2-punctatus L. Deutschl.
 „ 6 pustulatus Rossi. Gl. auf Blumen s. Han. Mch.
 Hbg. Oestr. Brl.
 — „ vittatus F. Deutschl.
 „ tessulatus Grm. Oestr.
 „ 2-lineatus L. Deutschl.
 „ vittula Suffr. Tyr.
 — „ pygmaeus F. Deutschl.
 „ minutus F. Deutschl.
 „ pusillus F. Schles. Han. Kl. Pr. Mch.
 „ gracilis F. Deutschl.
 — „ Hübneri F. Deutschl.
 — „ labiatus L. Deutschl.
 „ Wasastjernii Gyll. Gl. auf Birken. Han. Rhn.
 — „ geminus Gyll. Deutschl.
 „ querceti Suffr. Gl. auf Birken s.
 „ frontalis Msh. Pr. Thrg.
 „ strigosus Grm. Oestr.
Pachybrachys hippophaes Suffr. Tyr.
 — „ hieroglyphicus F. Deutschl.
 „ histrio Oliv. Han. Rhn. Pr. Mch. Oestr. Rgsbg.
 „ fimbriolatus Suffr. Mhr. auf Blumen s. 5. Erl. Tyr.
 Oestr.
Stylosomus minutissimus Grm. Baiern.
 — **Timarcha** laevigata L. Deutschl.
 „ pratensis Mgl. Mch. Tyr. Frbg. Triest.
 — „ coriaria F. Deutschl.
 „ metallica F. Gl. Mhr. unter Steinen, Moos n. s. 8–10.
 Deutschl.
 „ splendens Koch. Schl. unter Moos u. Steinen s. s. 5. 6.
Chrysomela atra Dhl. Schles.
 — „ Göttingensis L. Deutschl.
 „ acraea Dfts. Mch. Oestr.

Chrysomela crassimargo Grm. Tyr. Oestr.

„ *Dahlia* Knoch. Gl. s. s.

„ *hemisphaerica* Dfts. Gl. i. Frühj. a. Wegen herumlaufend.

„ *purpurascens* Grm. Gl. auf feuchtem Moos n. s. gesiebt. Mhr. 3—10.

„ *rufa* Dfts. Gl. s. s. Mch. Tyr. Oestr.

— „ *haemoptera* L. Deutschl.

— „ *sanguinolenta* L. Deutschl.

„ *marginalis* Dfts. Gl. s. Rhn. Thrg. Oestr. Pr.

„ *gypsophilae* Kstr. Danzig.

„ *Rossii* Ill. Rhn. Tyr.

„ *limbata* L. Deutschl.

„ *carnifex* F. Rhn. Pr. Hbg. Oestr. Frbg.

— „ *marginata* L. Deutschl.

— „ *analis* L. Deutschl.

„ *Banksii* F. Deutschl.

„ *opulenta* Fisch. Gl. Mhr. aus Moos n. s. gesiebt. 4—10.

„ *lamina* F. Deutsch.

„ *molluginis* Dhl. Oestr. Thrg.

„ *salviae* Grm. Oestr.

— „ *geminata* Pk. Deutschl.

„ *fucata* F. Deutschl.

„ *4-gemina* Suffr. Gl. auf Hyper. perforat. manchmal h. 6—8.

„ *cuprina* Dfts. Rhn. Oestr.

— „ *varians* F. Deutschl.

„ *Islandica* Grm. Auf dem Kamme des Riesengebirges.
Gl. unter isländ. Moos n. s. Oestr.

„ *fulgida* F. Deutschl.

„ *graminis* L. Deutschl.

— „ *fastuosa* L. Deutschl.

„ { *menthae* Schott. Deutschl.

„ { *menthastri* Suffr.

— „ *cerealis* L. Deutschl.

„ *relucens* Rosenhr. Tyr.

„ *mixta* Kstr. Tyr.

— „ *violacea* Pnz. Deutschl. Mhr.

„ *americana* L. Oestr.

— „ *staphyleae* L. Deutschl.

— „ *polita* L. Deutschl.

„ *lurida* L. Deutschl.

„ *olivacea* Suffr. Gl. unter Moos s. 4.

„ *squalida* Suffr. Gl. unter Moos s. 4.

„ *punctata* Chl. Gl. auf Senecio gem. 6—8. Oestr.

„ *calaciae* Schrk. Schles s. Rhn. Tyr. Oestr.

„ *senecionis* Schum. Gl. auf Senecio gem. Tyr.

Chrysomela elongata Zettst. Steier. Alpen.

„ *monticola* Dfts. Tyr. Oestr.

„ *gloriosa* F. Schles. Mch. Tyr. Hbg. Frbg.

„ *alpicola* Hoppe. Schles. Oestr.

„ *phalerata* Ill. Schles. Oestr.

— „ *speciosa* Pnz. Schles.

„ *nivalis* Heer. Tyr. Oestr.

„ *melancholica* Heer. Oestr.

„ *intricata* Grm. Gl. auf *Senecio* z. h. 6—8.

„ *Peirolerii* Brullé. Oestr.

„ *melanocephala* Dfts. Oestr.

„ *vittata* Dhl. Gl. auf *Senecio* s. 8.

— *Lina populi* L. Deutschl.

— „ *tremulae* F. Deutschl.

— „ *cuprea* F. Deutschl.

— „ *aenea* L. Deutschl.

„ *Lapponica* L. Gl. Mhr. s. 6—8. Deutschl.

„ *20-punctata* Scop. Mhr. auf Weiden n. s. 4. Deutschl.

„ *collaris* L. Deutschl.

— „ *alpina* Zettst. Darkehmen in Pr.

„ *longicollis* Suffr. Bei Putzig in Pr. h.

Eutomoscelis adonidis F. Erl. Mch. Hbg. Oestr.

— *Gonioctena viminalis* L. Deutschl.

— „ *rufipes* DG. Deutschl.

— „ *affinis* Schh. Heutschl.

— „ *pallida* L. Deutschl.

— „ *5-punctata* F. Thrg. Pr.

„ *6-punctata* Pnz. Schles. Mhr. Han. Rhn. Mch. Oestr.

„ *aegrota* F. Hbg.

— „ *litura* F. Deutschl.

„ *triandrae* Suffr. Putzig in Pr. n. s.

Plagiodera armoraciae L. Deutschl.

Gastrophysa polygoni L. Deutschl.

„ *raphani* F. Gl. Mhr. n. s. 4 — 9. Erl. Han. Pr.

Thrg. Oestr.

— *Phratora vitellinae* L. Deutschl.

— „ *vulgatissima* L. Deutschl.

„ *tibialis* St. Schles. Thrg.

Phaedon Carniolicus Dfts. Gl. an sumpfigen Stellen h. Han. Rhn.

Tyr. Thrg. Oestr.

„ *pyritosus* Rossi. Deutschl.

„ *graminicola* Dfts. Mhr h. 5. Han. Kl. Rhn. Hbg. Oestr.

„ *sabulicola* Hbst. Han.

„ *grammicus* Dfts. Oestr.

„ *neglectus* Dj. Schles.

— „ *betulae* L. Deutschl.

- Phaedon egenus Zgl. Mhr. Kl. Pr. Tyr. Hbg.
 „ salicinum Heer. Oestr.
 „ {concinus Steph. Putzig i. Pr. auf Triglochin maritimum.
 „ {Triglochinis Schaum. Halle.
 — Helodes marginella L. Deutschl.
 — „ Hannoverana F. Deutschl.
 — „ aucta F. Deutschl.
 — „ phellandrii F. Deutschl.
 — „ beccabungae Hellw. Deutschl.
 Colaphus sophiae Schall. Mhr. z. h. 5. Kl. Rhn. Pr. Thrg. Oestr.
 — Adimonia tanacetii L. Deutschl.
 — „ rustica Schall. Deutschl.
 „ Florentina Redtb. Mch. Tyr. Oestr.
 „ interrupta Geoffr. Erl. Han. Rhn. Pr. Thrg. Oestr.
 „ pallida Mgl. Thrg.
 „ rufa Grm. Rhn. Oestr.
 „ haematidea And. Pr. Oestr.
 „ sanguinea F. Deutschl.
 „ capreae L. Deutschl.
 — Gallerna viburni Pk. Deutschl.
 „ nymphaeae F. Deutschl.
 „ sagittariae Gyll. Rhn. Pr. Hbg. Thrg.
 — „ lineola F. Deutschl.
 „ Calmariensis L. Deutschl.
 „ tenella F. Deutschl.
 Malacosoma Lusitanica Oliv. Tyr.
 — Agelastica alni L. Deutschl.
 „ Halensis L. Deutschl.
 Phyllobrotica 4-maculata L. Gl. s. s. 6. Deutschl.
 „ adusta Crtz. Oestr.
 — Luperus rufipes F. Deutschl.
 — „ flavipes L. Deutschl.
 „ coerulescens Dfts. Oestr.
 „ pallipes Dj. Mhr. auf Viburn. lantana s. s. 5.
 „ xanthopus Ill. Oestr.
 — „ pinicola Andr. Deutschl.
 „ circumfusus Mrsh. Gl. auf Genista tinctor. h. 6—8.
 Rhn. Oestr.
 — Haltica mercurialis F. Mhr. n. s. 4—9. Deutschl.
 „ vitis Chvr. Baiern.
 „ eruae Dfts. Gl. s. Rhn. Mch. Oestr.
 — „ oleracea F. Deutschl.
 „ consobrina Dfts. Oestr.
 „ lythri Aubé. Gl. s. s.
 „ transversa Mrsh. Gl. z. h. 6—8. Rhn. Hbg. Frbg. Augsb. g.
 „ ferruginea Schr. Deutschl.

- Haltica impressa* F. Thrg. Oestr.
 — „ *rufipes* L. Deutschl.
 „ *melanostoma* Redtb. Oestr.
 „ *femorata* Dfts. Gl. Pr. Mch. Thrg. Oestr.
 „ *cyanescens* Dfts. Mch.
 „ *nigritula* Gyll. Gl. s. 6—8.
 — „ *nitidula* L. Deutschl.
 — „ *helxines* L. Deutschl.
 — „ *Modeeri* L. Deutschl.
 „ *ventralis* Ill. Rhn.
 „ *pubescens* E. H. Deutschl.
 „ *atropae* Mkl. Gl. auf Atrop. belladonna n. s. 6—8. Sachs.
 — „ *armoraciae* E. H. Deutschl.
 „ *tetrastigma* Knz. Schles.
 „ *brassicae* F. Deutschl.
 — „ *sinuata* Redtb. Deutschl.
 „ *excisa* Redtb. Rhn. Oestr. Mhr.
 „ *flexuosa* Ill. Deutschl.
 — „ *nemorum* L. Deutschl.
 „ *vittula* Redtb. Gl. Thrg. Oestr.
 „ *antennata* E. H. Erl. RhnHb g. Thrg. Oestr. Rgsbg. Schl.
 — „ *atra* F. Deutschl.
 „ *procera* Redtb. Mch. Oestr.
 — „ *lepidii* E. H. Deutschl.
 — „ *cyparissiae* E. H. Deutschl.
 „ *lutescens* Gyll. Han. Kl. Rhn. Pr. Frbg. Brl.
 — „ *euphorbiae* Schrk. Deutschl.
 „ *cyanella* Redtb. Rhn. Oestr.
 „ *palustris* Chvr. Erl.
 „ *coerulea* Pk. Deutschl.
 „ *campanulae* Redtb. Gl. Thrg. Oestr.
 „ *divaricata* Redtb. Oestr.
 — „ *rubi* Pk. Deutschl.
 „ *obtusata* Gyll. Rhn. Pr.
 „ *chrysanthemi* E. H. Deutschl.
 „ *fuscipes* F. Deutschl.
 „ *fuscicornis* L. Deutschl.
 „ *malvae* Ill. Erl. Rhn. Oestr. Pr. Rgsbg.
 „ *striatella* Ill. Mch.
Longitarsus fuscoaeneus Redtb. Oestr.
 „ *coerulea* Pk. Deutschl.
 „ *echii* E. Hft. Deutschl.
 „ *Linnaei* Dfts. Oestr.
 — „ *niger* E. H. Kl. Mch. Oestr.
 — „ *anchusae* Pk. Deutschl.
 „ *analís* Crtz. Rhn. Tyr. Thrg. Oestr.

- Longitarsus** apicalis Beck. Mch.
 " Holsaticus L. Deutschl.
 " 4-pustulatus F. Erl. Han. Mch. Thrg. Rgsbg. Frbg.
 " dorsalis F. Erl. Rhn. Rgsbg.
 " sisymbrii F. Han. Mch. Rgsbg.
 " verbasci Pk. Schles. Kl. Rhn. Pr. Rgsbg. Frbg.
 " melanocephalus Gyll. Deutschl.
 " ochroleucus Mrsh. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Rgsbg.
 " nigriceps Redtb. Oestr.
 " lutescens Gyll. Oestr. Mch. Thrg.
 " tabidus F. Deutschl.
 " atricillus L. Deutschl.
 " brunneus Dfts. Oestr.
 " femoralis Mrsh. Gl. Mch. Tyr. Oestr.
 " nasturtii F. Deutschl.
 " pratensis Pnz. Deutschl.
 " longicornis Web. Schles. Han. Kl.
 " pusillus Gyll. Deutschl.
 " spretus Schpp. Brl.
 " luridus Oliv. Deutschl.
 " parvulus Pk. Deutschl.
- Psylliodes** dulcamarae E. H. Deutschl.
 " chalcomera Ill. Rhn. Thrg.
 " hyoscyami L. Deutschl.
 " ecalcarata Redtb. Oestr.
 " chrysocephala L. Deutschl.
 " picipes Redtb. Oestr.
 " alpina Redtb. Oestr.
 " melanophthalma Dfts. Oestr.
 " cyanoptera Ill. Hbg. Oestr. Brl.
 " rapae Ill. Deutschl.
 " cuprea E. H. Deutschl.
 " fuscicornis Ill. Oestr.
 " attenuata E. H. Erl. Mch. Tyr. Hbg.
 " serpylli Kn. Tyr.
 " cucullata Ill. Deutschl.
 " picea Redtb. Rhn. Oestr.
 " rufilabris E. H. Rhn. Mch. Oestr.
 " circumdata Redtb. Oestr.
 " affinis Pk. Deutschl.
 " propinqua Redtb. Oestr.
 " marcida Ill. Pr.
- Plectroscelis** semicoerulea E. H. Deutschl.
 " chlorophana Dfts. Oestr.
 " dentipes E. H. Deutschl.
 " tarda Mkl. Sächs. Schweiz.

- Plectroscelis Mannerheimii* Gyll. Schles. Mch. Oestr. Brl.
 „ *Salzbergii* Gyll. Deutschl.
 — „ *aridella* Pk. Deutschl.
 — „ *aridula* Gyll. Deutschl.
 „ *angustula* Rosenhr. Tyr.
 „ *compressa* Letzn. Schles.
 — *Dibolia femoralis* Redtb. Kl. Mch. Thrg. Oestr. Hr. Dalmatien.
 „ *rugulosa* Redtb. Mch. Oestr.
 „ *cynoglossi* E. H. Deutschl.
 „ *cryptocephala* E. H. Mch. Tyr. Thrg. Oestr.
 „ *occultans* E. H. Deutschl.
Argopus hemisphaericus Dfts. Han. Rhn. Tyr. Oestr. Rgsb. Mgdb.
 — *Sphaeroderma testacea* Pnz. Deutschl.
 „ *cardui* Gyll. Dl. Rhn. Mch. Thrg. Oestr.
Apteropeda ovulum Ill. Thrg.
 — „ *ciliata* Oliv. Gl. n. s. Deutschl.
 „ *conglomerata* Ill. Erl. Mch. Hbg. Oestr. Sachsen. Kl.
 „ *caricis* Mkl. Gl. auf nassen Waldwiesen n. s. 6—8;
 Tyr. Thrg. Sachsen.
Mniophila muscorum E. H. Gl. in feuchtem Moos gem. 4—10.
 Han. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.
 — *Hispa atra* L. Deutschl.
Cassida equestris F. Deutschl.
 „ *hemisphaerica* Hbst. Deutschl. überall s.
 — „ *Austriaca* F. Deutschl.
 „ *vittata* F. Deutschl.
 — „ *Murraea* L. Deutschl.
 — „ *sanguinosa* Crtz. Deutschl.
 — „ *rubiginosa* Müll. Deutschl.
 „ *thoracica* Kug. Mhr. n. geschöpft. 4. 5. Deutschl.
 „ *rufovirens* Suffr. Rhn. Hbg. Thrg. Hr.
 — „ *vibex* L. Deutschl.
 „ *denticollis* Suffr. Gl. Mhr. z. s. 5—9. Deutschl.
 — „ *chloris* Suffr. Deutschl.
 „ *sanguinolenta* Müll. Deutschl.
 „ *lineola* Crtz. Schles. Oestr. Leipz. Frbg.
 „ *azurea* F. Mch. Tyr. Oestr. Sächs. Erzgebirge.
 „ *lucida* Suffr. Ems.
 — „ *margaritacea* Schall. Deutschl.
 „ *subreticulata* Mgl. Oestr.
 — „ *nobilis* L. Deutschl.
 — „ *oblonga* Ill. Deutschl.
 „ *Berolinensis* Suffr. Brl. Stettin s. s.
 — „ *obsoleta* Ill. Deutschl.
 — „ *ferruginea* F. Deutschl.
 — „ *nebulosa* L. Deutschl.

- Cassida atrata* F. Schles. Mhr. Meh. Oestr.
 „ *languida* Cornelius. Elberfeld.

Erotyloidae.

- Engis sanguinicollis* F. Mhr. unter Steinen s. 5. Deutschl.
 „ *humeralis* F. Gl. Mhr. unter Rinde an Schwämmen gem.
 Deutschl.
 „ *rufifrons* F. Deutschl.
 „ *2-pustulata* F. Kl. Pr. Thrg. Oestr. Schles. in Schwämmen z. s. 5.
Triplax Russica L. Deutschl.
 „ *elongata* Lacord. Oestr.
 „ *ruficollis* Steph. Rhn.
 — „ *aenea* Pk. Gl. aus Schwämmen h. erzogen. Deutschl.
 „ *bicolor* Mrsh. Gl. in Schwämmen s. 7. Rhn. Oestr.
 „ *rufipes* Pnz. Han. Pr. Meh. Oestr.
 — *Tritoma 2-pustulata* F. Deutschl.
Alexia pilifera Müll. Deutschl.
 „ *pilosa* Pnz. Rhn. Thrg. Oestr. Kl.
 „ *globosa* St. Han. Meh. Oestr.
Leiestes seminigra Gyll. Oestr.
Orestia alpina Grm. Oestr.

Endomychoidea.

- Endomychus coccineus* L. Gl. Mhr. an alten Stöcken h. Deutschl.
Mycetina cruciata Schall. Gl. an Schwämmen alter Stöcke n. s.
 6—8. Erl. Han. Pr. Meh. Oestr. Tyr.
Lycoperdina succincta L. Pr. Hbg. Oestr.
 „ *bovistae* F. Deutschl.
 — *Dapsa 3-maculata* Motsch. Han. Kl.
 „ *denticollis* Grm. Oestr.

Securipalpes.

- *Hippodamia 13-punctata* L. Deutschl.
 „ *7-maculata* F. Deutschl.
 — *Anisosticta 19-punctata* L. Deutschl.
 — *Coccinella mutabilis* Ser. Deutschl.
 „ *livida* D. G. Deutschl.
 „ *Bothnica* Gyll. Schles. Tyr.
 — „ *2-punctata* L. Deutschl.
 „ *alpina* Villa Meh. Tyr. Oestr.
 „ *11-notata* Schn. Erl. Meh. Tyr. Oestr.
 — „ *11-punctata* L. Deutschl.
 — „ *7-punctata* L. Deutschl.
 „ *magnifica* Redtb. Meh. Oestr.
 „ *hieroglyphica* L. Deutschl.

- Coccinella* 14-punctata L. Deutschl.
 „ variabilis Ill. Deutschl.
 „ marginepunctata Schall. Deutschl.
 „ impustulata L. Deutschl.
 „ 12-pustulata F. Schles.
 „ 18-guttata L. Deutschl.
 „ oblongoguttata L. Deutschl.
 „ ocellata L. L. Deutschl.
 „ tigrina L. Deutschl.
 „ 14-guttata L. Deutschl.
 „ 10-guttata L. Deutschl.
 „ bis-7-punctata Schall. Deutschl.
 „ 16-guttata L. Deutschl.
 „ 12-guttata Poda. Deutschl.
 „ 14-punctata L. Deutschl.
 „ 22-punctata L. Deutschl.
 — *Micraspis* 12-punctata L. Deutschl.
 — *Chilocorus* renipustulatus Scr. Deutschl.
 „ 2-pustulatus L. Deutschl.
 — *Exochomus* 4-pustulatus L. Deutschl.
 „ auritus Scr. Deutschl.
Hyperaspis reppensis Hbst. Deutschl.
 „ 4-maculata Redtb. Oestr.
 „ campestris Hbst. Deutschl.
Epilachna Argus Fourc. Han. Rhn. Frbg. Pr. Hbg. Kl.
 „ chrysomelina F. Oestr.
 — *Lasia* globosa Schneid. Deutschl.
 „ impunctata L. Deutschl.
Novius cruentatus Muls. Brl. unter Rinde starker Kiefern. Dan-
 zig. Oestr.
Platynaspis villosa Fourc. Deutschl.
Scymnus nigrinus Kug. Deutschl.
 „ pygmaeus Fourc. Deutschl.
 „ marginalis Rossi. Han. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.
 „ flavicollis Redtb. Oestr.
 „ Apetzii Muls. Oestr.
 „ frontalis F. Deutschl.
 „ 4-lunulatus Ill. Deutschl.
 „ biverrucatus Pnz. Deutschl.
 „ Redtenbacheri Muls. Oestr.
 „ fasciatus Fourc. Hbg. Oestr. Dresden.
 „ abietis Pk. Deutschl.
 „ capitatus F. Hbg. Oestr.
 „ analis F. Deutschl.
 „ haemorrhoidalis Hbst. Gl. Mbr. Erl. Han. Thrg. Oestr.
 „ ater Kug. Deutschl.

- *Seymnus discoideus* Ill. Deutschl.
- „ *minimus* Pk. Deutschl.
- „ *arcuatus* Rossi. Hbg.
- *Nundina litura* F. Deutschl.
- *Coccidula scutellata* Hbst. Deutschl.
- „ *rufa* Hbst. Deutschl.
- *Clambus pubescens* Redtb. Rhn. Thr. Oestr. Gl. aus trockenem
Laube n. s. gesiebt. 5.
- „ *armadillus* D. G. Deutschl.
- *Calyptomerus alpestris* Redtb. Oestr.
- *Microsphaera corticalis* Redtb. Oestr.
- *Orthoperus atomus* Gyll. Rhn. Pr.

Clypeastres.

- *Clypeaster pusillus* Gyll. Kl. Rhn. Tyr. Hbg. Pr. Oestr.
- *Gryphinus lateralis* Gyll. Thrg. Oestr. Pr.
- „ *piceus* Comolli. Hbg. Oestr.
- *Corylophus cassidiodes* Mrsh. Deutschl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Zebe Gustav

Artikel/Article: [Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera 173-182](#)