

Scymnus Kugelann.

Die bei uns einheimischen Arten können in folgende Gruppen vertheilt werden: -

A. Abdominis laminae extus omnino oblitteratae

- a. Elytra maculis discoidalibus notata . . Sp. 1 — 5.
 b. Elytra macula apicali notata Sp. 6 — 7.

B. Abdominis laminae integrae vel vix imperfectae

1. Abdominis laminae extus interruptae. . . Sp. 8 — 9.
 2. Abdominis laminae integrae.
 c. Elytra testacea Sp. 10—13.
 d. Elytra nigra, apice testacea Sp. 14—21.
 e. Elytra nigra immaculata Sp. 22—27.

A. a.

1. *S. amabilis* Lec. 2. *S. ornatus* Lec. 3. *S. guttulatus* Lec.
 4. *S. flavifrons* Melsh. 5. *S. bioculatus* Muls.

A. b.

6. *S. terminatus* Say. 7. *S. femoralis* Lec.

B - 1.

8. *S. americanus* Muls. 9. *S. nebulosus* Lec.

B - 2 - c.

10. *S. pallens* Lec. 11. *S. debilis* Lec. 12. *S. cinctus* Lec.
 13. *S. suturalis* Lec.

B - 2 - d.

14. *S. fraternus* Lec. 15. *S. haemorrhous* Lec. 16. *S. chatchas* Muls.
 17. *S. caudalis* Lec. (? *Scymn.* (*Pullus creperus* Muls.))
 18. *S. consobrinus* Lec. (*caudalis* ♂ Lec. olim).
 19. *S. puncticollis* Lec. 20. *S. cervicalis* Muls.
 21. *S. socer* Lec.

(Schluss folgt.)

Beschreibung einer neuen Art *Rhyncolus pilosus*

von

M. Bach in Boppard.

Bei der Bearbeitung der Gattung *Rhyncolus* fand sich eine von Herrn E. von Bruck aus Crefeld eingesandte neue Art, die derselbe in zwei Stücken bei Ostende gesammelt hat. Da das Gebiet meiner Fauna sich nicht bis zu jenem Fundorte ausdehnt, so erlaube ich mir die Beschreibung dieses Thieres hier mitzutheilen.

Rhyncolus pilosus. n. sp. Pechbraun, glänzend, Fühler heller; Kopf fein und entfernt punktirt, doppelt so breit als der

walzenförmige Rüssel; dieser gebogen, undeutlich punktirt; Hals schild stark und tief punktirt; Flügeldecken punktirt gefurcht, in der Mitte merklich erweitert; Zwischenräume entfernt, fast reihig punktirt und behaart. $1\frac{1}{2}$ “.

Pechbraun, Kopf und Halsschild etwas dunkler, Fühler heller, Oberseite mit feinen grauen und langen Borstenhärchen besetzt. Kopf doppelt so breit als der walzenförmige Rüssel und so wie dieser fein punktirt. Stirn fein punktirt, stark gewölbt, dann stark abfallend, so dass zwischen der Stirne und dem Anfang des Rüssels eine sattelförmige Vertiefung entsteht. Rüssel fast so lang als das Halsschild, auf der Oberseite in der Mitte erhöht und daher stark gebogen. Halsschild kaum länger als breit, seine Scheibe mit starken und tiefen Punkten, die Seiten ziemlich stark gerundet erweitert. Flügeldecken breiter als das Halsschild, etwas mehr als um die Hälfte länger als zusammen breit, in der Mitte merklich erweitert, stark punktirt gefurcht, Zwischenräume mit einer feinen fast reihig gestellten Punktirung.

Dadurch, dass der Kopf doppelt so breit als der Rüssel ist und die Flügeldecken behaart sind, kann er nur mit *Rh. culinaris* zusammengestellt werden. Er unterscheidet sich jedoch hauptsächlich dadurch, dass die Zwischenräume der Flügeldecken gegen die Spitze hin keine Höckerchen besitzen und dadurch, dass die Seiten der Flügeldecken nicht gleichlaufend, sondern in der Mitte merklich erweitert sind und sich gegen die Spitze hin mehr zurunden.

Literatur.

Das systematische Verzeichniss der **europ. Schmetterlinge** von Herrn Dr. Heydenreich, Leipzig 1851. Verlag von Julius Klinkhard, dritte Ausgabe, ist eine Erscheinung im Gebiete der Lepidopterologie, die jeder Lepidopterolog, dem es um das ächt Wissenschaftliche zu thun ist, herzlich begrüsst haben wird. Es ist nicht nur mit grosser Mühe und ausserordentlichem Fleiss und Eifer zusammengestellt, sondern auch, was die Zahl der in solchem enthaltenen Falterarten betrifft, ausserordentlich vollständig, indem es eine Uebersicht über 5172 Falterarten, einschliesslich der Microlepidoptera, zeigt. Der Hauptinhalt ist in systematischer Ordnung vorgetragen und bei jeder Art sind fast alle Autoren, vorzüglich solche, welche die Falter in Abbildung lieferten, citirt. Nach dieser systematischen Ordnung ist ein alphabetisches Verzeichniss der Hauptarten von den Papiliones bis zu den Aluciten beigelegt, und am Schlusse ein

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Bach Michael

Artikel/Article: [Beschreibung einer neuen Art Rhyncolus pilosus
361-362](#)