

VIII. Accedunt species incertae, mihi

ignotae cel. Degeerio descriptae.

vid. Htg. Aderflügler P. 1. pag.

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 218—220 . . . . . | 92. ochraceus m.     |
|                   | 93. melancephalus m. |
|                   | 94. Betulae m.       |
|                   | 95. nigratus Retz.   |
|                   | 96. gallarum m.      |

Genus *Cryptocampus* Htg.

a. Antennis totis nigris:

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1, <i>Squamulis albis</i> . . . . .  | 97. <i>angustus</i> m.    |
| 2, <i>Squamulis nigris</i> . . . . . | 98. <i>medullarius</i> m. |

b. Antennis pro parte rufis:

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1, Antennis apice rufis . . . . . | 99. <i>mucronatus</i> m. |
| 2, — subtus apicique rufis        | 100. <i>Populi</i> m.    |

Genus *Diphadnus* Htg.

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1, Antennis fuscis . . . . .  | 101. <i>fuscicornis</i> m. |
| 2, — nigris, areis cubita-    |                            |
| libus 2 . . . . .             | 102. <i>nigricornis</i> m. |
| 3, Ant. nigr. ar. cub. sub 3. | 103. <i>semineurus</i> m.  |

Bemerken muss ich zu Vorstehendem nur noch, dass die eingeklammerten Artnamen ohne Nummer dem männlichem Geschlechte solcher Arten angehören, deren Weibchen durch abweichende Charactere in der Uebersicht getrennt werden mussten. Wo nichts bezeichnet ist, bezieht sich die Characteristik entweder auf beide Geschlechter oder nur auf das Weibchen; wo sich die Charactere auf ein Männchen beziehen deren Weibchen noch unbekannt ist, wie Z. B. unter No. 56, 69—72, ist dies stets durch mar. angedeutet.

Verzeichniß böhmischer Käfer.

Vom Regierungsrath Schmidt zu Stettin.

Da der Entomologische Verein zu Stettin sich die genaue Erforschung und Aufklärung der Insekten-Faune Deutscher Lande zur besonderen Aufgabe gestellt hat, so möge das nachfolgende Verzeichniß der von mir in Böhmen gefundenen Käfer als eine Leistung in dieser Hinsicht dienen.

Ich habe das Königreich Böhmen, des Besuchs der Badeorte Karlsbad und Marienbad wegen, in den Jahren 1829 in den Monaten Juni und Juli, 1830 in den Monaten Juli und August, und 1839 in den Monaten Juni und Juli bereiset, und die von mir bei dieser Gelegenheit mit grossem Fleisse gesuchten Käfer sind hauptsächlich in der Umgegend von Karlsbad und Marienbad, — mithin am südlichen Abhange des westlichsten Theils des Erzgebirges, — einzelne aber auch in der Umgegend von Prag, Teplitz u. s. w., gesammelt worden.

Da wir über die Insekten Böhmens, ausser Preyssler's Verzeichnisse \*) und einzelnen Notizen in Mayer's Sammlung physikalischer Aufsätze \*\*), meines Wissens nichts besitzen, so kann mein Verzeichniss zugleich als Beitrag zur Käfer-Faune Böhmens, so wie auch zum Theil als Charakteristik der Gebirgs-Käfer-Faune des mittleren Deutschlands dienen.

Ich habe übrigens weder die Faunen von Karlsbad noch die von Marienbad besonders reich gefunden, so wenig an Arten als an Individuen; — doch war die erstere im Ganzen reicher als die letztere.

Der Aufzählung der vorgefundenen Arten werde ich Beschreibungen der von mir entdeckten neuen und der bisher noch unbeschriebenen Arten, so wie einige Bemerkungen folgen lassen.



*Cicindela hybrida* Linn. — *Dromius agilis* Fabr. — *Brachinus crepitans* Linn. — *Cychrus rostratus* Linn. — *Procrustes coriaceus* Linn. — *Carabus cancellatus* Illig., cum variet. *femoralis* Meg. — *granulatus* Linn. — *auratus* Linn. — *auronitens* Fabr. — *violaceus* Linn. — *nemoralis* Illig. — *convexus*

\*) Joh. Dan. Preyszler, Verzeichniss Böhmischer Insekten. Erstes Hundert, mit 2 Kupfertafeln. Prag, 1790. 4.

\*\*) Sammlung physikalischer Aufsätze, besonders die Böhmische Naturgeschichte betreffend, von einer Gesellschaft Böhmischer Naturforscher. Herausgegeben von Dr. Joh. Mayer. Mit Kupfern. Dresden, 1791. 8.

Ich habe dies Werk nicht erhalten und benutzen können.

Fabr. — *hortensis* Linn. — *intricatus* Linn. — *Notophilus biguttatus* Fabr. — *Loricera pilicornis* Fabr. — *Calathus cisteloides* Illig. — *fulvipes* Fabr. — *Anchomenus angusticollis* Fabr. — *prasinus* Fabr. — *Agonum sexpunctatum* Fabr. — *parumpunctatum* Fabr. — *Pterostichus lepidus* Fabr. — *cupreus* Fabr. — *versicolor* Sturm — *melanarius* Illig. — *melas* Creutz. — *aethiops* Illig. — *oblongopunctatus* Fabr. — *niger* Fabr. — *metallicus* Fabr. — *striola* Fabr. — *parallelus* Duftsch. — *ovalis* Meg. — *elatus* Fabr. — *Amara fulva* Degeer. — *apricaria* Fabr. — *similata* Gyll. — *trivialis* Gyll. — *vulgaris* Linn. — *spreta* Zimmerm. — *ferrea* Sturm — *bifrons* Gyll. — *familiaris*, Sturm. — *Harpalus ruficornis* Fabr. — *aeneus* Fabr. cum variet. *confusus* Dej. — *fulvipes* Fabr. — *tardus* Illig. — *Bembidium rufipes* Illig. — *velox* Erichs. — *celer* Gyll. *Ocypus olens* Fabr. — *similis* Fabr. — *fuscatus* Gravh. (*subpunctatus* Dej. Gyll.) — *Staphylinus pubescens* Fabr. — *caesareus* Cederh. (*erythropterus* auctor., non Linn.) — *flavicornis* Dej. — *erythropterus* Linn. (*castanopterus* Gravh.) — *fossor* Fabr. — *aeneus* Rossi — *decorus* Gravh. — *varians* Fabr. — *sanguinolentus* Gravh. — *virgo* Gravh. — *Quedius fuliginosus* Gravh. — *Xantholinus punctulatus* Payk. — *Paederus ruficollis* Fabr. — *Stenus oculatus* Gravh. — *Oxyporus rufus* Fabr. — *Piatysthetus morsitans* Payk. — *Oxytelus complanatus* Erichs. (*depressus* Gyll., non Gravh.) — *Deleaster dichrous* Gravh. — *Omalium rivulare* Payk. — *Anthobium ophthalmicum* Payk. — *minutum* Fabr. (*ranunculi* Gravh.) — *Megarthrus marginicollis* Dej. (*hemipterus* var. a Illig.) — *Micropeplus porcatus* Payk. — *Tachinus rufipes* Fabr. (*pullus* Gravh.) — *marginellus* Fabr. — *Tachiporus littoreus* Linn. (*cellaris* Fabr.) — *Chrysobothris chrysostigma* Fabr. — *Anthaxia morio* Fabr. — *quadripunctata* Linn. — *Agrilus cyanescens* Ratzeb. — *Trachys minuta* Fabr. — *Cratonychus fulvipes* Herbst-niger Fabr. — *Agrypnus fasciatus* Linn. — *murinus* Linn. — *Athous hirtus* Herbst, cum var. *elytristestaceis* — *ruficaudis* Gyll. — *vittatus* Fabr. — *dilutus* Illig. — *Limonius bructeri* Panz. — *lythrodes* Germ. — *Cardiophorus ebeninus* Germ. — *Ampedus sanguineus* Fabr. — *praeustus* Fabr. — *Cryptohypnus der-*

*mestoides* Herbst (quadrimaculatus auctor., non Fabr.) — *Ludius cupreus* Fabr. — *pectinicornis* Linn. — *tesselatus* Linn. — *holosericeus* Fabr. — *aeneus* Linn., cum variet. — *impressus* Fabr. — *affinis* Payk. — *haematodes* Linn. — *Agriotes obscurus* Linn. — *blandus* Germ., var. *gilvellus* Zieggl. — *vilis* Illig. — *Sericosomus brunneus* Linn. — *Dolopius marginatus* Linn. — *Adrastus limbatus* Fabr. — *Dascillus* \*) *cervinus* Linn., cum variet. *cervinus* Fabr. — *Elodes pubescens* Fabr. — *Lygistopterus sanguineus* Linn. — *Drilus concolor* Ahr. — *Podabrus alpinus* Payk. — *Tephorus fuscus* Linn. — *dispar* Fabr. — *montanus* nob. — *cincticollis* nob. — *nigricans* Fabr. — *maculicollis* nob. — *obscurus* Fabr. — *rufus* Fabr. — *melanurus* Fabr. — *fuscicornis* Oliv. — *bicolor* Fabr. — *pallidus* Fabr., var. *pallipes* Fabr. — *paludosus* Fall. — *lateralis* Fabr. — *thoracicus* Gyll. — *Malthinus biguttatus* Linn. — *biguttulus* Gyll. — *frontalis* Marsh. — *geniculatus* nob. — *Malachius bipustulatus* Fabr. — *equestris* Fabr. — *angulatus* Fabr. — *Dasytes obscurus* Gyll. — *niger* Fabr. — *coeruleus* Fabr. — *flavipes* Fabr. — *Opilo mollis* Fabr. — *Clerus apiarius* Linn. — *Thanasimus formicarius* Linn. — *Corynetes violaceus* Linn. — *Dorcatoma dresdense* Herbst. — *Anobium pertinax* Linn. — *paniceum* Linn. — *Ptinus imperialis* Fabr. — *fur* Linn. — *Oiceoptoma thoracicum* Linn. — *Silpha obscura* Linn. — *atrata* Fabr. — *Choleva angustata* Fabr. — *Strongylus luteus* Fabr. — *fervidus* Oliv. — *Niti-*

\*) Um mit der Gattungs- und Arten-Synonymie auf's Reine zu kommen, giebt es nur Einen Weg, den, dem älteren Namen den Vorzug zu geben, falls die bei demselben gegebenen Diagnose der Gattung oder Art genügend bezeichend ist, der Name nicht etwa schon früher anderen Naturkörpern zugetheilt, und derselbe dabei etymologisch richtig gebildet ist. Von dieser Regel dürfte nur in sehr wenigen Fällen aus besonderen Gründen eine Ausnahme zu machen sein.

Der Gattungsnname *Dascillus*, von Latreille (in seinem Werke *Précis des caractères génériques des insectes*) der Gattung schon im Jahre 1797 gegeben, ist daher dem von Paykull erst 1798 (in der *Fauna svecica*) der Gattung gegebenen Namen *Atopa* vorzuziehen. Eben so sind die Latreilleschen Gattungsnamen *Elodes* (*Cyphon* Payk.), *Thanasimus* (*Clerus* Fabr.), *Opilo* (*Notoxus* Fabr.), *Choleva* (*Catops* Payk.), *Leiodes* (*Anisotoma* Illig). u. a., als die älteren, beizubehalten.

*dula depressa* Illig. — *colon* Linn. — *bipustulata* Linn.  
 — *obsoleta* Fabr. — *Meligethes aenea* Fabr. —  
*erythropa* Marsh. — *Catheretes sambuci* Maerkel. — *Byturus fumatus* Fabr. — *Antherophagus silaceus* Herbst. — *Cryptophagus lycoperdi* Herbst. — *Attagenus Schäfferi* Herbst — *nigripes* Fabr. — *Anthrenus scrophulariae* Linn. — *Hister fimetarius* Herbst. — *Istercorarius* Entom. Hefte — *carbonarius* Entom. Hefte — *bimaculatus* Fabr. — *merdarius* Entom. Hefte. — *Trixagus dermestoides* Linn. — *Byrrhus ornatus* Panz. — *pilula* Linn. — *oblongus* Sturm — *dorsalis* Fabr. — *varius* Fabr. — *semistriatus* Fabr. — *Elophorus aquaticus* Linn. — *Cercyon melanocephalum* Linn. — *unipunctatum* Linn. — *Onthophagus camelus* Fabr. — *fracticornis* Preyszl. — *Aphodius fimetarius* Linn. — *auctumnalis?* Naezén — *luridus* Fabr., variet. *nigripes* Fabr. — *rufipes* Linn. — *pusillus* Herbst — *inquinatus* Fabr. — *Trox scaber* Linn. — *Geotrupes silvaticus* Fabr. — *Anisoplia horticola* Linn. — *Melolontha vulgaris* Fabr. — *Serica brunnea* Fabr. — *Gnorimus nobilis* Linn. — *Trichius fasciatus* Linn. — *Cetonia aenea* Andersch — *aurata* Linn. — *Lucanus cervus* Linn. — *hircus* Herbst. — *Dorcus parallelepipedus* Linn. — *Platycerus caraboides* Linn. — *Sinodendron cylindricum* Linn. — *Crypticus quisquilius* Linn. — *Leiodes castanea* Kugel. — *axillaris* Gyll. — *Diaperis boleti* Linn. — *Dircaea discolor* Fabr. — *Tenebrio molitor* Linn — *Mycetochares barbata* Latr. — *Cistela ceramboides* Linn. — *murina* Linn. — *Lagria pubescens* Linn. — *Mordella aculeata* Linn. — *parvula* Gyll. — *Anaspis frontalis* Linn. — *lateralis* Fabr. — *longula nob.* — *thoracica* Fabr. — *flava* Linn. —

(Fortsetzung folgt.)

---

Der Verein hat für Briefe und Pakete innerhalb des Pr. Staates Portofreiheit, wenn die Briefe unter Kreuzband gesendet werden, und die Pakete mit offener Adresse nicht über 5 Pfd. wiegen. Die Adresse für Briefe und Pakete muss lauten: „An den entomologischen Verein zu Stettin“ und ausserdem noch den Beisatz führen: „Allg. Angelegenheiten des entomologischen Vereins zu Stettin.“ Es wird dringend gebeten, mit grösster Genauigkeit, diesen Vorschriften nachzukommen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical  
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1840

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Schmidt

Artikel/Article: [Verzeichniss böhmischer Käfer. 28-32](#)