

auf das vollständigste bestätigen. Das mir vorliegende weibliche Exemplar zeigt alle diese Eigenschaften. Namentlich sind die Vorderschienen im Verhältniss zu denen der Weibchen von *Psalidostomus* kräftiger gebaut und endigen fast schaufelförmig breit; ihr Innendorn und die beiden untersten Aussendornen sind sehr stark im Verhältniss zu den zierlichen des Männchens. An der Mittelschiene ist der Dorn an der Aussenkante mindestens doppelt so lang als bei dem Männchen und es befindet sich über demselben (in gleichem Abstände, wie ihn dieser vom Enddorne zeigt) noch ein kleiner, aber deutlich wahrnehmbarer. Ein ebenso kleiner Dorn, wie dieser letztere, steht auf der Aussenkante der Hinterschiene.

Kopf und Thorax dieses ♀ Exemplares haben die rothbraune hellere Färbung, welche, wie Burmeister ganz richtig angiebt, bei dem ♂ nur die Oberkiefer zeigen.

C. A. Dohrn.

Eine neue Art der Gattung *Pycnopus* Germ. *)

beschrieben von H. Jekel.

In seinen interessanten „Beiträgen zur Kenntniss der Curculioniden“ hat Dr. Gerstäcker in dieser Zeitung (1860, p. 395) eine zweite Art der merkwürdigen Gattung *Pycnopus* beschrieben. Mir sind noch mehrere unbeschriebene Arten bekannt, die ich in verschiedenen Sammlungen gesehen; von diesen ist die nachstehend beschriebene unzweifelhaft die grösste und merkwürdigste. Ihre Gestalt ist mehr gestreckt und parallel als die der anderen Arten, daher auch weniger gebogen. Ich nenne sie:

Pycnopus Gerstaeckeri.

Oblongus, parallelus, squamis griseis tectus; linea laterodorsali elytrorum, sutura postice late, abdominis basi pedibusque albescenti squamosis; pectore utrimque niveo; scutello lineisque duabus discoidalibus elytrorum nigricantibus, maculam album in medio punctumque posticum includentibus. — Long. 21, lat. 11 mill. — Patria: Cayenne. — Dom. Dupont. — Mus. Dom. Bowring.

*) Germar, descr. gener. Pycnopi, in Schh. Gen. et Spec. Curcul. IV, 1, 280.

Pyen. griseo Perty (= *Bufo* Boh. Schll.) multo major, magis elongatus et parallelus, minusque convexus, tuberculis thoracis elytrorum majoribus, denudatis; pictura elytrorum similis, sed thorax unicolor etc. — Caput valde convexum, inaequaliter laxaque rugosum, obscure griseo-squamosum; fronte leviter foveolata. — Oculi laterales, pyriformes, infra attenuati, parum convexi, picei. — Rostrum breve, capite parum longius, rectum, subangulatum, lateribus rude, supra obsolete punctato-rugosum, nigrum, subopaeum, basi tantum obscure griseo-squamosum. — Antennae breves, crassae, piceae, clava breviter ovato-acuta. — Thorax fere ut in *Pyen. griseo*, subsemicircularis, antice minus attenuatus, intra apicem productum evidenter constrictus, supra convexus, tuberculis rotundatis denudatis nigris obsitus, ad latera majoribus elevatioribus et magis distantibus, dorso antico multo minoribus confertiusque distributis; griseo squamosus, medio baseos tantum obsolete transversim infuseato; linea tenuissima longitudinali antice instructus. — Scutellum subquadratum, obscure brunneo holosericeum. — Elytra basi thoracis parum latiora, subtruncata, humeris obtusis, lateribus parallela, postice abrupte obtuseque conjunctim rotundata, lateribus valde inflexa, margine medio parum (in *P. griseo* multo magis) emarginato-sinuata; supra convexa, parum forniata; striato-punctata, interstitiis seriatim tuberculatis, his antice semiglobosis, postice minoribus planioribus, griseo squamosis, linea intra-marginali dorsoque postico ad suturam albescentibus, singulo lineis duabus discoidalibus mox ante basin et apicem terminatis et conjunctis, interna arcuata, externa recta, nigris, macula lata prope medium punctoque ante-apicali albis.

Corpus subtus nigrum, obsolete, segmentum ultimum abdominis sat crebre profundeque punctatum; pectoris lateribus dense late angulariter niveo-squamosis, abdominis basi laete griseo-squamosis. — Pedes inaequales, antiquiores, intermedii breviores, albescenti-squamosi; femoribus anticis versus apicem subangulatim ampliatis, sequentibus clavatis, omnibus muticis; tibiis incurvis, medio paululum ampliatis, tum emarginatis, prope apicem apiceque ipso dentatis.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Jekel H.

Artikel/Article: [Eine neue Art der Gattung Pycnopus Germ.*\), 156-157](#)