

Innen- und Vorderrand hin aber kleiner werden, oder ganz verschwinden.

Die Palpen sind oben und an der Spitze dunkel rothbraun, an den Seiten aber und unten gelb. Ebenso ist die Spitze des Fühlerkolbens bei allen Stücken deutlich rothgelb. Der Saum aller Flgl. gescheckt. — Da nun nach Ochsenheimer's Beschreibung der *Arg. Frigga* Bd. I., pag. 74 und HS Bd. I., pag. 32, die vorstehend beschriebene Art zu erkennen ist, da ferner Nolcken in der oben bezeichneten Fauna die mir leider nicht zugänglichen Abbildungen: Hb. 49, 50 u. Hbst. t. 273, 1, 2 nur in der Grundfarbe der Oberseite nicht zutreffend findet, und da endlich auch Möschler's Beschreibung in der „Wiener Monatschrift“, Bd. IV, pag. 337, die ich sorgfältig verglichen, sonst in allen wesentlichen Stücken, bis auf die Farbe der Palpen und Fühlerkolbenspitzen, zutrifft, während die Abbildungen von Thore Hb., die *Frigga* am nächsten steht, (cfr. Freyer Beitr. III, tab. 104, fig. 3 und N. B. IV, tab. 295, fig. 4) hinsichtlich der entscheidenden Merkmale ganz abweichen, so glaube ich nicht zu irren, wenn ich die mir vorliegenden Estländischen Falter für richtige *Frigga* Thnbg. halte.

Species novae Madagascarienses

auctore **L. Fairmaire.**

Nesogena Batesii. — Long. 21 mill. — Oblongo-elliptica, modice convexa, supra violaceo-cærulea aut viridimetallica, nitida, subtus æneo-metallica, plus minusve violaceo tincta; capite parvo, tenuiter punctato, prothorace lato, antice angustato, tenuissime punctulato, ad marginem posticum valde transversim sulcato, elytris magnis, striatis, striis fere crenatopunctatis, intervallis convexiusculis.

N. varians. — Long. 15—17 mill. — Oblongo-elliptica, subtus cum pedibus cyanea, supra capite prothoraceque obscure æneis, sericeis, parum nitidis, elytris amplis, æneocupreis, metallicis, aut tota cyanea, aut elytris obscure æneis, antennis rufis, basi cyaneis; capite prothoraceque tenuiter punctulatis, hoc antice angustato, basi transversim profunde sulcato, elytris punctato-striatis, intervallis convexiusculis, subtus subtilissime alutacea.

N. rufiventris. — Long. 14 mill. — Oblonga, sat convexa, æneo-metallica, nitida, prothoracis margine postico elytrorumque limbo externo anguste cyaneis, subtus viridi-ænea, abdomine rufo, æneo-micante, antennis pedibusque fuscis; prothorace antice angustato, tenuiter sat dense punctato, margine postico transversim impresso, utrinque puncto magno signato, elytris magnis, tenuiter punctato-striatis, intervallis fere planis, alutaceis.

N. episcopalis. — Long. 15 mill. — Ovato-elliptica, cupreo-violacea, metallica, subtus violacea, cupreo-tincta, antennis brunneis, basi nigris, pedibus nigro-violaceis; capite vix sensim punctulato, prothorace parvo, antice angustato, vix perspicue punctulato, ad marginem posticum transversim sulcato, elytris amplis, striato-punctatis, intervallis vix convexis.

N. intermedia. — Long. 14 mill. — Oblonga, convexa, æneo-metallica, nitida, antennis rufo-testaceis, articulo primo ænescente, subtus viridi-ænea, nitida, paulo violaceo tincta, elytrorum margine reflexo tarsisque rufescentibus; capite vix punctulato, prothorace transverso, lateribus antice valde rotundatis, tenuiter sat dense punctulato, margine postico sulco transverso anguste impresso, utrinque puncto majore signato, elytris amplis, valde punctato-striatis, intervallis convexis, pedibus æneo-fuscis.

N. parvicollis. — Long. 8 mill. — Oblonga, postice leviter dilatata, fusco-ænea, metallica, nitida, ore, antennis, tibiis tarsisque rufescentibus, subtus magis ænea; capite ad oculos et antice sulcato, antennarum articulo 3^o quarto paulo longiore, prothorace parvo, lævi, margine postico intus sulco regulari impresso, elytris punctato-substriatis, striis apice lævigatis et attenuatis.

Lagria senilis. — Long. 1½—5 mill. — Oblongo-ovata, parum convexa, fusco-subænea, nitida, pilis griseis longe hirsuta, capite prothoraceque punctatis, hoc disco fere lævi, antennis basi testaceis; prothorace brevi, elytris multo angustiore, elytris amplis, postice leviter dilatatis, dense punctatis, subrugosis, pedibus sat brevibus.

L. longipilis. — Long. 5 mill. — Ovata, supra planiuscula, fusco-ænea, sat nitida, capite interdum picescente, longe griseo-hirta, antennis nigro-fuscis basi rufescentibus, apicem versus crassioribus, prothorace capite haud latiore, elytris dimidio angustiore, lateribus fere rectis, elytris amplis, subovatis, punctato-rugulosis, postice obtuse rotundatis.

Omnes hae species a Dom. Fred. Bates amicissime communicatæ.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Fairmaire Léon Marc Herminie

Artikel/Article: [Species novae Madagascarienses 190-191](#)