 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Synonymisches über Tomiciden,

vom Kaiserl. Oberförster

W. Eichhoff in Saarburg. (Lothr.)

Bostrichus Marshami Rye The Ent. Mon. Mag. IV. 1867 p. 188 ist identisch mit Dryocoetes (Bostrichus) alni Georg Stett. ent. Zeit. J. 1856. p. 59.

Bostrichus septentrionis Mannh. in Nichts verschieden von Bost. semicastaneus Mannh., beide aber zusammenfallend mit Dryocoetes (Bostrichus) autographus Ratz.

Bostrichus alni Muls. et Rey Opusc. ent. VII. 1856. p. 111. fällt zusammen mit Xyleborus (Bostrichus) Pfeilii Ratzeb.

Xyleborus carinipennis Eichh. Berl. ent. Z. 1868 p. 281 ist nach einem typischen Exemplar des Phloeotrogus obliquecauda Motsch mit diesem identisch.

Bostrichus oblitus Perris Ann. Soc. Fr. 1862 p. 218 ist unzweifelhaft = Bostrichus longicollis Gyll.

Bostrichus tachygraphus Sahlb. ist nach einem typischen Exemplar = Xyleborus dispar Fabr. ♀.

Tomicus praemorsus Eichh. Berl. ent. Z. 1867 p. 401 = Bostrichus calligraphus Germ. Ins. Spec. nov. 1824 p. 461.

Xyloterus bivittatus Mannh. ist, wie schon Leconte festgestellt hat, das ♀ von Xyloterus cavifrons (♂) Mannh., beide aber, wie hier constatirt werden soll, nicht verschieden von Xyloterus (Trypodendron) lineatus Ratz. (ob auch gleich Bostrichus lineatus Oliv, ist mir fraglich).

Xyloterus quercus Eichh. ist wahrscheinlich = Apate signata Fabr. = Apate limbata Payk. = Bostrichus 5-lineatus Adams = Bostrichus lineatus Gyll. (excepta var. c.).

Bostrichus fagi Fabr. = Bost. fagi Ratz. = Bostr. fagi Nördl. = Ernoporus Thomsonii Ferr.

Dryocoetes capronatus Perr. Ann. Soc. France 1866 p. 193 ist = Bostrichus Bulmerincqi Kol. Mel. ent. III. p. 39 t. 14 f. 12 und letzterer eine gute, von Bost. bicolor Hbst. verschiedene Art.

Pterocyclon longulum Eichh. Berl. ent. Z. 1868 p. 278 = Tomicus mali Fitch Trans. New York. Agr. Soc. II. 1855. No. 5.

Bostrichus decolor Boield = ♂ von Bostrichus (Xyleborus) Saxesenii Ratz.

Hypoborus mori Aubé und genistae Aub. haben beide deutlich 4-gliedrige Fühlergeissel und fallen unter die Gattung Liparthron Woll.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Cryphalus piceae Ratz. ist mit Unrecht von Ferrari (Bork. p. 11) und Redtenbacher (Fn. Aust. ed. 3. II 367) als Varietät zu Cryphalus asperatus Gyll. Ratz. gezogen. Er ist unzweifelhaft gute Art und unterscheidet sich von C. asperatus durch gedrungenere Form, breiteren Höckerfleck auf dem Vordertheil des Brustschildes, und, wie schon Ratzeburg mit Recht hervorhebt, durch stets deutlich aufgerichtete, längere, reihenweise geordnete Haarbörstchen auf den Flügeldecken.

Xyleborus abnormis Eichh. Berl. ent. Z. 1868. p. 282 scheint zusammenzufallen mit Eccoptopterus 6-spinosus Motsch. Bull. Mosc. 1863. II. 515, letztere Gattungs-Bezeichnung ist aber wohl unhaltbar.

Intelligenz.

Die hiemit zum Verkauf angebotene Sammlung des Unterzeichneten besteht aus:

I. Käfer von der Westküste von Sumatra in 13 Glaskasten. Cicindelidae 10, Carabidae 20, Wasserkäfer 20, Staphyl. 3, Pectinicorn. 30, Lamellicorn. 80, Buprest. 15, Elat. 15, Telephor. 10, Tenebr. 30, Meloidae 5, Curcul. 100, Brenth. 2, Cerambyc. 100, Chrysomel. 160, Coccinell. 40, ausserdem noch 30, zusammen 670 Species in ca. 2640 Exemplaren.

II. Durch Tausch und Kauf erworbene Käfer aus Amerika und Australien: ungefähr 180 Exemplare in 90 Species.

III. 8 Kasten, enthaltend: Wasserscorpione, Taranteln, Tausendfüsse, Kugelasseln, Wanzen, Heuschrecken, Hummeln, Wespen, Bienen, Leguan, fliegende Eidechse.

IV. Schmetterlinge von der Westküste von Sumatra, 562 Stück in den prachtvollsten und seltensten untadelhaft erhaltenen Exemplaren.

Münden, 12. Mai 1876.

Lambrecht, Niederl. Capitain a. D.

Für Coleopterologen!

Die vom verst. Rechnungsrath Eigenbrodt zusammengebrachte Käfersammlung ist billig zu verkaufen. Näheres bei Frau Wwe. Eigenbrodt, Fruchtmarkt Nr. 3, Coblenz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitung Stettin

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: 37

Autor(en)/Author(s): Eichhoff Wilhelm Josef

Artikel/Article: Synonymisches über Tomiciden, 378-379