

Käferkatalog's verpflichtet — bei der zweiten Ausgabe wurde ihm von Herrn Lehrer Weise erfolgreich assistirt. Dr. Stein war jedenfalls eine Persönlichkeit, deren ausgeprägte Originalität seinen Bekannten unvergeßlich bleiben wird.

Dr. C. A. Dohrn.

Zur Synonymie einiger Chilenischer Dipteren.

Von

V. von Röder in Hoym.

Bei einer kleinen Sammlung Chilenischer Dipteren, welche ich vor Kurzem erhielt, fand ich, daß durch verschiedene Beschreibungen der Autoren sich eine ungewöhnliche Menge Synonyma angehäuft habe. Es scheint dieses durch die Unkenntniß der schon früher vorhandenen Beschreibungen gekommen zu sein, da die betreffenden Arten immer als neu beschrieben sind, ohne daß der betreffende Autor eine Ahnung gehabt hat, daß die Art schon früher beschrieben sei. Eine solche Art ist:

- Scinax sphenopterus* Löw, dritter Beitrag zur Kenntniß der Dipt. 1855, pag. 42.
 = *Cyllenia elegantula* Bigot, Diptères nouveaux provenant du Chili 1857, pag. 294 (Annales de la Société entomolog. de France).
 = *Bombylisoma decorata* Rondani, Diptera exotica (Modena 1863), pag. 68.
 = *Bombylius Paulseni* Philippi, Aufzählung der Chilenischen Dipteren, pag. 651 (Schriften der Zoolog. Bot. Gesellschaft in Wien 1865).
 = *Ostentator punctipennis* Jaennicke, Neue exotische Dipteren aus den Museen zu Frankfurt a. M. und Darmstadt 1867, pag. 41.
Lasia nigritarsis Blanchard.
 = *L. coerulea* Rondani.
Lasia rufipes Westwood.
 = *L. (Panops) aenea* Philippi.
 = *L. aenea* Westwood.
Pangonia lata Guérin.
 = *Tabanus latus* Guérin, Iconographie du Règne Animal,

Insectes pl. 77, fig. 1. Descriptions of the Insects by Captain P. P. King, pag. 336 = *Pangonia depressa* Macq., Dipt. exot. I, pag. 107. 21 = *Pangonia crocata* Jaenicke, Neue exot. Dipt., pag. 22, No. 22.

Pangonia latipalpis Macq.

= *Trichophthalma Landbecki* Philippi.

= *Trichophthalma amaena* Bigot. (*amoena*?), Extrait des Annales de la Société entomologique de France. (Diptères nouveaux ou peu connus 16. partie 1877), pag. 20.

Hier kann ich die Diagnose verbessern, da in meiner Sammlung vollständige Exemplare vorhanden sind.

„Fusca, cinereo-villosa. Antennis basi cinereis, apice fuscis, palpis fuscis; facie longe villosa, barba cinereo-albida; thorace castaneo-fusco tomentosus, retrorsum cinereo marginatus, vittis duabus angustis cinereis, apice dilatatis, lateribus, pleuris albido-cinereo longe villosis; abdomine obscure fuscato, basi albido-cinereo dense piloso, segmentis cinereo-marginatis, tertio in medio et sequentibus maculis fuscis ornatis, lateribus albo-hirsutis; halteribus testaceis; pedibus fulvis, femoribus basi fuscis; alis fere hyalinis, extrinsecus, margine late tridentato fusco. Long. 14 mm. Patria Chili.“

Da bei Bigot's Exemplar der Hinterleib fehlt, so ist die Länge nur 8 mm angegeben.

Trichophthalma (*Hirmoneura*) *nemestrinoides* Jaenicke, Neue exot. Dipt. 1867, pag. 27.

= *Trichophthalma vicarians* Schiner, Novara Dipt. 1868, pag. 111.

* * *

Bemerkungen zu *Eurina lurida* Macq.

Da Meigen in seinem VI. Bande der system. Beschreibung Europ. zweifl. Insecten auf pag. 5 das Vaterland von *Eurina lurida* nicht angiebt, und mir auch nicht bekannt ist, wo eine Vaterlandsangabe über diese Art gemacht wurde, sehe ich mich veranlaßt, über diese Art eine Vaterlandsangabe zu geben, da ich dieselbe nämlich am 19. Mai 1882 an *Carex* (Riedgras) in dem sogenannten See, einem Torfmoor bei Wilsleben in der Nähe von Aschersleben, gefangen habe. Ich halte *Eurina clypeata* Mg., obgleich aus Portugal, für eine bloße Varietät obiger Art. Mein Exemplar mißt 3 Lin., während Meigen nur 2 Lin. Länge angiebt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [43](#)

Autor(en)/Author(s): Röder Victor Eduard von

Artikel/Article: [Zur Synonymie einiger Chilenischer Dipteren 510-511](#)