

## Coléoptères de Tripoli

par

**Léon Fairmaire.**

*Coptognathus curtipennis.* — Long. 12 mill.

Forme générale, sculpture et coloration du *C. Lefrancii* Muls.; en diffère par le corps plus court, surtout les élytres dont le bord apical est bien moins arrondi avec l'angle sutural marqué, un peu pointu au lieu d'être légèrement arrondi avec l'angle sutural très obtus; en outre le corselet est plus court, plus arrondi sur les côtés avec les angles postérieurs plus arrondis et la ponctuation est plus forte en avant; l'écusson à les côtés plus arqués, sa surface est plus ponctuée et elle n'est pas fortement déprimée transversalement à la base; enfin la tête est plus nettement tronquée.

Il est difficile de préciser les différences entre cet insecte et le *C. crassipes* Burm., du Sennaar à cause du laconisme de la description; mais ce dernier paraît plus grand (15 mill.), la tête serait plus fortement ponctuée à la base, le corselet serait grossièrement ponctué tandisqu'il l'est assez finement chez nos deux exemplaires et les élytres auraient des côtes, faiblement indiquées, il est vrai, mais qui n'existent nullement chez nos 2 exemplaires.

*Pachydema obscurata.* — Long. 15½ mill.

Oblonga, brunneo-fusca, nitida, pectore, femoribus et prothoracis basi dense ac longe griseo-fulvescente-villosis; capite rugoso-punctato, antice picescente, margine antico reflexo, medio fere truncato; prothorace longitudine duplo latiore, antice angustato, lateribus fortiter rotundatis, angulis posticis cum basi rotundatis, dorso sat subtiliter punctato, spatio medio longitudinali laevi, basi foveolato; scutello late ogivali, lateribus punctulato; elytris parum dense asperulis punctatis, subtilissime alutaceis, utrinque obsolete trilineatis, stria suturali sat impressa; propygidio sat subtiliter punctato, pygidio subtiliter ac parce punctato; tarsi 4 anticis articulis 2—4 valde dilatatis.

Forme du *rufipennis*, mais plus grand, à élytres bien plus longues, plus fortement arrondies à la base du bord externe, à ponctuation râpeuse, sans trace de côtes; la tête paraît plus grosse et la coloration est différente.

*Micipsa ovoidea*. Long. 7 mill.

Ovata, convexa, dorso planiuscula, antice magis attenuata, rufo-castanea, valde nitida, antennis pedibusque vix dilutioribus; capite subtiliter punctulato, ad latera evidentius, margine antico subobtusos, fere truncato, antice impressione sat profunda, medio subinterrupta transversim signato, ad oculos tenuiter plicato; antennis capite prothoraceque longioribus, apice crassioribus, articulo ultimo pyriformi, praecedente fere duplo longiore; prothorace longitudine duplo latiore, antice vix sensim angustiore, lateribus fere rectis; elytris ovatis, medio ampliatis, apice breviter obtuse productis, laevigatis; prosterno lateribus strigoso-punctato, inter coxas sulcato; tibiis intermediis rectis. ♀.

Bien voisin du *M. angustipennis* Fairm., de Tozer; la différence de coloration n'a qu'une importance médiocre, mais la forme des élytres paraît très différente. Ici, elles sont courtes, élargies au milieu, pas plus larges à la base que le corselet, et leur extrémité, un peu prolongée, n'est pas arrondie; les côtés du prosternum sont striolés et les tibias intermédiaires sont droits. Par malheur je suis forcé de comparer une ♀ à un ♂.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Fairmaire Léon Marc Herminie

Artikel/Article: [Coléoptères de Tripoli 459-460](#)