

ist schwarz, an den Ringen braungelb. Der Falter variiert vom zartesten weiss und silbergrau bis ins Gelbliche. Die Weibchen sind stets grösser als die Männchen. Gleich nachdem sie getödtet waren, schwollen die Körper der letzteren zuweilen auffallend an, wodurch der Leib sehr entstellt wurde. Durchstiess ich denselben wiederholt mit feinen Nadeln, dass die eingeschlossene Luft Ausweg fand, so erhielten sie meist wieder ihre natürliche Grösse.

S. Nervosa fing ich einmal in den ersten Tagen des Mai. Dass die Raupe ausschliesslich auf Euphorbia Esula lebt, *) muss ich bezweifeln, da an der Stelle, wo ich den Schmetterling fand, diese bei uns sehr seltene Pflanze nicht aufgefunden wurde. Herr Superintendent Triepke erzog den Schmetterling öfter. Bei Berlin wird die Raupe in manchen Jahren ziemlich häufig gefunden. —

(Fortsetzung folgt.)

Genera et Species Curculionidum, cum synonymia hujus Familiae; a C. A. Schönherr, Tomus sextus pars secunda, supplementum continens. Parisiis apud Roret, Lipsiae apud Fleischer. 1842. 8 maj. 495 pag.

Durch die Güte des Herrn Verfassers ist dies Werk der Bibliothek des Entomol. Vereins unlängst als Geschenk zugegangen, und wir beeilen uns, den Freunden der Entomologie über den Inhalt Nachstehendes mitzutheilen.

Der Verfasser fährt in der vom fünften Theile (ersten Supplement-Bande) ab befolgten Methode fort, nemlich die in den früheren Theilen beschriebenen Gattungen und Arten kurz aufzuführen, hierzu Nachträge und Verbesserungen zu liefern, und dann neue Gattungen und Arten gehörigen Orts einzuschalten.

Der vorliegende Band beginnt mit der

Divis. V. Cleonides.

Gen. 211. Cleonus Schönh. — Mit dieser Gattung wird die früher (Tom. II. p. 226.) aufgestellte Gattung Bothynoderes wiederum (als Strips 2.) vereinigt. Es werden überhaupt 204 Arten aufgeführt, worunter 95 früher nicht vorgekommen. Neu ist u. a. der prächtige *C. imperialis* Karelín

*) S. Treitschke 10. Bd. 2. Abth. S. 86.

aus Turcomanien, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang. — *C. glaucus* Fabr. Der *C. glaucus* Panz., *alior*, welchen Schönh. jetzt als *C. turbatus* aufführt, ist davon verschieden. — *C. major* Herbst, von Schönh. früher (Tom. III. p. 100.) als *Larinus inquinatus* aufgenommen, ist, als ächter Cleonus, dieser Gattung eingeschaltet worden. — *C. ericeti* Dahl, von welchem das Vaterland nicht angegeben worden, kommt nach Dahls Catalog (Wien 1823.) auf dem Harze vor. — Bei *C. testatus*, *concinus*, *excoriatus*, *roridus*, *cinereus*, *palmatus* und *bicarinatus* sind die Citate (und Abbildungen) aus Heft 173 der von Herrich-Schäffer fortgesetzten Panzer'schen Insecten Deutschlands einzuschalten.

Gen. 212. *Pachycerus* Ghl. — 10 Arten, darunter 5 neue.

Gen. 213. *Chrysolopus* Germ. — 1 Art.

Gen. 214. *Pelorhinus* Schönh. — 5 Arten, 4 neue; alle aus Australien.

Gen. 215. *Aterpus* Schönh. — 5 Australische Arten, darunter 2 neue.

Gen. 216. *Lophotus* Schönh. — Identisch mit der späterhin (p. 256) unter No. 239. vorkommenden Gattung *Eublepharus* Gay & Solier; so wie auch mit der Gattung *Aegorhinus* Erichs. und *Lophodes* Dej. — Von den von Gay & Sol. beschriebenen 4 Arten gehört *E. Roueleti* (No. 2. p. 256.) zu *L. nodipennis* Hope, Schönh. (No. 6. p. 133), und *E. Germari* (No. 4. p. 257) zu *L. Eschscholtzi* Schönh. (No. 4. p. 132.) — Die Gattung *Lophotus* (dieser Name, als der ältere, muss ihr verbleiben) enthält daher 8 Arten, worunter 7 von Schönh. früher noch nicht eingeschaltet waren, und 2 jetzt von ihm zuerst beschrieben werden. (Vergl. Wiegmann. Arch. 1840. p. 257.)

Gen. 217. *Gronops* Schönh. — 6 Arten, worunter 5 neu. — Bei *G. lunatus* ist Heft 173 der Insecten Deutschlands noch zu allegiren.

Gen. 218. *Plastologus* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art aus dem Kaffernlande.

Gen. 219. *Hypsonotus* Germ. — 43 Arten, neu darunter 24. — Dem ohnehin grammatisch fehlerhaft gebildeten Namen *H. comprimatus* (No. 3. p. 143.) würde der von Perty früher gegebene »*catheloplateus*« vorzuziehen sein.

Gen. 220. *Lordops* Schönh. — 18 Arten, neu 10.

- Gen. 221. *Eurylobus* Schönh. — 5 Arten, darunter 2 neu.
- Gen. 222. *Listroderes* Schönh. — Unter 21 Arten 12 neu.
- Gen. 223. *Rhyparosomus* Schönh. Nov. Gen. — mit 3 neuen Arten aus Südafrika.
- Gen. 224. *Alophus* Schönh. — 10 Arten, 4 neu.
- Gen. 225. *Byrsopages* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art aus Kamschatka.
- Gen. 226. *Eupholus* Guér.-Ménev. Nov. Gen., mit 5 Arten aus Amboina und Neu-Guinea.
- Gen. 227. *Geonemus* Schönh. — 16 Arten, darunter 8 neu.
- Gen. 228. *Strangaliodes* Schönh. Nov. Gen., mit einer neuen Art aus Chili.
- Gen. 229. *Leptops* Schönh. — 14 Arten, darunter 9 neu. — Hierher *Hipporhinus quadridens* Fabr. Schönh. (Tom. I. p. 492.)
- Gen. 230. *Prypnus* Schönh. — 5 Arten, 2 neu.
- Gen. 231. *Lithinus* Klug. Nov. Gen. — 2 Arten aus Madagaskar, 1 neu.
- Gen. 232. *Liophloeus* Germ. — 10 Arten, worunter 5 neu. *)
- Gen. 233. *Catoptes* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art von Neu-Seeland.
- Gen. 234. *Catapionus* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art von Cachemir.
- Gen. 235. *Barynotus* Germ. — 10 Arten, 3 neu.
- Gen. 236. *Amphidees* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art aus Mexico.
- Gen. 237. *Odontorhinus* Schh. Nov. Gen. — 1 Art aus Persien.
- Gen. 238. *Lepidophorus* Kirby. Nov. Gen. — 1 Nord-amerikanische Art.
- Gen. 239. *Eublepharus* Gay & Solier. — S. oben Gen. 216.
- Gen. 240. *Tropiphorus* Schönh. Nov. Gen. — Aus früher zu *Barynotus* gezählten Arten (*B. mercurialis*

*) *L. Schmidtii* Schönh. entdeckte ich im Juni 1829 bei Carlsbad, wo er auf Fusswegen kroch. (S. Entom. Zeitung 1840. pag. 114.) Später erhielt ich ihn auch aus der Gegend von Cassel. Er scheint sonach in den Gebirgszügen des mittlern Deutschlands überhaupt vorzukommen.

- Fabr.*, *B. carinatus* Müll., *B. globatus* Hbst.) gebildet. — 6 Arten, darunter 3 neu.
- Gen. 241. *Perperus* Schönh. Nov. Gen. — 3 Arten aus Neu-Holland.
- Gen. 242. *Panscopus* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art. *P. erynaceus* Say, von Schönh. früher Tom. II. p. 311. zu *Barynotus* gezählt.
- Gen. 243. *Megalometis* Schönh. (*Colobus* Chevr.) Nov. Gen. — 2 Arten aus Chili.
- Gen. 244. *Epicaerus* Schönh. — 19 Arten, darunter 3 neu.
- Gen. 245. *Minyops* Schönh. — 7 Arten, 3 neu. Bei *M. carinatus* ist Heft 173. der Insekten Deutschlands zu citiren.
- Gen. 246. *Rhytidophloeus* Schönh. Nov. Gen. — Typus: *R. albipes* Oliv., der früher (Tom. I. p. 491.) als *Hipporhinus* id. beschrieben ward.
- Gen. 247. *Bastactes* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art aus Brasilien.

Divis. VI. Molytides.

- Gen. 248. *Lepyrus* Germ. — 5 Arten, 3 neu.
- Gen. 262. *Procas* Steph. Nov. Gen. (Nach p. 386. not. 1. hier einzuschalten.) — 2 bereits bekannte Arten, worunter *Curc. picipes* Marsh. — Der als dritte Art aufgeführte *P. pyrrhodactylus* Marsh. ist nach einem abgeriebenen Stücke von *Phytonomus rumicis* Linn. beschrieben, und fällt daher als eigene Art fort. (Vergl. Entom. Zeitung 1842. S. 100.)
- Gen. 249. *Tanysphyrus* Germ. — 1 Art.
- Gen. 250. *Hylobius* Schönh. — 20 Arten, 1 neu.
- Gen. 251. *Cepurus* Schönh. — 1 Art.
- Gen. 252. *Molytes* Schönh. — 7 Arten. — *M. coronatus* ist übrigens nicht von Latreille, sondern von Fourcroy zuerst unter diesem Namen beschrieben worden.
- Gen. 253. *Trysibius* Schh. Nov. Gen. — Aus Arten von *Molytes* gebildet (z. B. *tenebrioides* Pall., *Olivieri* Schönh.) — 4 Arten, 2 neu.
- Gen. 254. *Anisorhynchus* Schönh. Nov. Gen. — 7 Arten, worunter die früher zu *Molytes* gezogenen: *A. Bajulus* Oliv.; *Sturmii* Schönh.; *barbarus* Schh. und *Monachus* Germ. — Bei letzterem ist noch Heft 173 der Insekten Deutschlands zu citiren.

Gen. 255. *Leiosomus* Kirby. Nov. Gen. — Aus den kleineren bisher zu *Molytes* gerechneten Arten: *ovatus Clairv.* und *cribrum Meg.* u. s. w., gebildet. Zu No. 3. *L. impressus Schönh.* *) gehört das Tom. II. p. 356. zu *M. ovatulus* gezogene Citat: *Curculio deflexus Panz.* Ent. Germ. 310. 64., und der Panzersche Name, als der frühere, wird der Art verbleiben müssen.

Gen. 256. *Adexius* Schönh. — 1 Art.

Gen. 257. *Plinthus* Germ. — 20 Arten, darunter 9 neu. — Bei *P. Tischeri* und *P. caliginosus* sind noch die Citate aus dem Heft 173. der Insekten Deutschlands einzuschalten.

Gen. 258. *Scotasmus* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art aus Neu-Holland.

Gen. 259. *Cylindrorhinus* Guér. Nov. Gen. — Nach Guérin hier aufgenommen. 1 Art aus Neu-Holland.

Gen. 260. *Macrotarsus* Schönh. Nov. Gen. — 5 Arten aus Mittel-Asien.

Gen. 261. *Phytonomus* Schönh. — 98 Arten, worunter 48 neu. — *P. Philanthus Oliv.*, früher zu *P. punctatus* Fabr. gezogen, ist eigne Art. — Wir nehmen Veranlassung, hier die Bemerkungen u. Berichtigungen Germar's (Entom. Zeit. 1842. p. 200. u. f.), welcher namentlich die ihm nach Walton zugesendeten, nach Marsham, Kirby und Stephens genau bestimmten Stücke Englischer Arten untersuchen konnte, einzuschalten:

No. 51. *P. Pollux* Fabr. — Zu ihm gehört als Abart b. *P. palustris* Leach. Steph., welcher unter No. 91 vorkommt, und folglich als eigne Art wegfällt. — Ferner gehört zu ihm als Abart c. *P. alternans* Steph., unten No. 76, welcher als eigne Art ebenfalls zu löschen ist; — dann die *Hypera Kunzii* Steph. (verschieden von *P. Kunzii* Ahr. Schönh., unter No. 73.); endlich der unter 75 vorkommende *P. Julinii* Sahlb.

No. 76. *P. murinus* Fabr. — Zu ihm gehört *Hypera straminea* Steph., von Schönh. als var. ♂ zu *P. Meles* gezogen; — ferner gehört zu ihm *Hypera sublineata* Kirby Steph. (No. 92.), dann *Hypera*

*) Dies Käferchen kommt auch in der Gebirgsgegend um Dresden vor, wo er nach Herrn Märkels Mittheilung nebst *L. ovatulus* in Felsenthälern auf Laubmoosen (z. B. *Mnium*) lebt, jedoch selten ist.

picipes Steph. (No. 95), nicht minder *Hypera phaeopa* Steph. (No. 97.); endlich *Hypera haemorrhoidalis* Steph., — welche Arten als solche daher zu streichen sind.

No. 70. *P. polygoni* Fabr. — *Hypera canescens* und *viciae* Steph. (Schönh. No. 89.) gehören herher, und fallen als eigene Arten fort.

No. 79. *P. Meles* Fabr. — Dass *Hypera straminea* Steph. nicht hierher, sondern zu No. 69 gehöre, ist bereits oben bemerkt worden. — Der als var. γ . (Töm. II. p. 390.) hierher gezogene *Curc. trilineatus* Marsh. bildet dagegen eine selbstständige und einzuschaltende Art, nemlich:

P. trilineatus Marsh. Ent. Brit. I. 268. 90., wozu gehören: *Curc. dissimilis* var. *major* Herbst Col. VI. 290. 261.; ferner *Hypera borealis* Germ. Magaz. IV. 839. 7. und *Hypera trifolii* Steph. Illustr. IV. 99. 20.; Man. 238. 1863.

No. 83. *P. dissimilis* Herbst. — Hierher *Hypera fulvipes* Steph. (Schönh. No. 96.), welche sonach als eigne Art fortfällt.

Gen. 262. *Procas* Steph. — s. oben hinter Gen. 248.

Gen. 263. *Coniatus* Germ. 5 Arten, 1 neu.

Divis. VII. Byrsopsides.

Gen. 264. *Lithodus* Germ. (*Theeesternus* Say.) — 1 Art.

Gen. 265. *Byrsops* Schönh. — 25 Arten, worunter 13 neu.

Gen. 266. *Synthocus* Schönh. Nov. gen. — 5 neue Arten aus Süd-Africa.

Gen. 267. *Eupages* Schönh. — 5 Arten, darunter 4 neu; alle aus Süd-Africa.

Gen. 268. *Perieges* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art vom Kaukasus.

Gen. 269. *Brotheus* Steph. — 1 Art der *Curc. porcatus* Marsh.

Gen. 270. *Rhytirhinus* Schönh. — 20 Arten, 11 darunter neu.

Gen. 271. *Borborocoetes* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art aus Persien.

Gen. 272. *Spartecerus* Schönh. — 3 Arten, darunter 2 neu.

Gen. 273. *Hypocolobus* Schönh. Nov. gen. — 20 neue Arten, sämmtlich aus Süd-Afrika.

Gen. 274. *Epipedus* Schönh. Nov. gen. — 1 neue Art von Cayenne.

Wir wünschen dem bis soweit gediehenen Werke, das von seltenem Fleisse und ungewöhnlicher Assiduität des verehrungswerthen bereits hochbetagten Herrn Verfassers und seiner Mitarbeiter Zeugniß giebt, im Interesse der Wissenschaft von Herzen ferneren Fortgang; — wir besorgen jedoch, dass dieser Fortgang mindestens sehr verzögert werden dürfte, da abgesehen von dem stets zufließenden neuen Material, der Herr Verfasser selbst (in dem Vorworte) den Verlust zweier sehr thätiger Mitarbeiter, des verewigten Gyllenhal und des, an fernerer Theilnahme durch Dienstgeschäfte behinderten Herrn Staatsraths v. Fahræus, beklagt, und ein dritter ebenfalls sehr thätiger Mitarbeiter, Herr Capitain und Professor Bohemann, durch seine kürzlich erfolgte Anstellung als Intendant für das Königl. Entomologische Museum zu Stockholm ebenfalls an kräftiger fernerer Theilnahme behindert sein dürfte. Möchten sich doch tüchtige jüngere schwedische Entomologen bereit finden, den Herrn Verfasser zu unterstützen!

Regier.-Rath Schmidt.

Berichtigungen und Nachträge zu Herrn Director Dr. Suffrians Aufsatz über die **Gyrinen.**

(Vergl. No. 10. u. 11. d. Entomol. Zeitung 1842.)

Die Vergleichung mehrerer Original-Exemplare der in Heer's Fauna Col. Helvet. I. 166. beschriebenen Gyrinus-Arten, welche ich der gefälligen Mittheilung des Herrn Professor Heer in Zürich verdanke, setzt mich in den Stand, schon jetzt einige Zusätze zu meiner in No. 10. und 11. der vorjährigen Zeitung befindlichen Abhandlung über die deutschen Gyrinen mitzutheilen, und ich verbinde damit zugleich die Berichtigung einiger sinnentstellender Druckfehler, welche als leidige Folge meiner unleserlichen Handschrift in der genannten Abhandlung stehen geblieben sind.

S. 226. Z. 33. »Von *G. natator* habe ich vor Jahren einmal eine Masse von Larven auf im Wasser verfaulten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1843

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Genera et Species Curculionidum, cum synonymia hujus Familiae : a C. A. Schönherr, Tomus sextus pars secunda, supplementum continens. Parisiis apud Roret, Lipsiae apud Fleischer. 1842. 8 maj. 495 pag. 19-25](#)