

Cosmia.

C. fulvago Triepke.

C. Oo habe ich einmal gezogen. Den Schmetterling fand ich bisher nicht. Jedenfalls ist er sehr selten.

C. Acetosellae. Nur ein Exemplar, das ich im August im Julow bei Stettin fing, ist mir vorgekommen.

C. Trapezina im Juli und August in Eichenwaldungen gemein, wo man den Schmetterling von Eichen und Buchen klopft. Dass die Raupe bei der Stubenerziehung auch ihres Gleichen verzehrt, hat schon Treitschke berichtet.

C. Subtusa klopfte ich einmal bei Stettin von einer Buche.

C. Pyralina selten. Die Raupe fand ich nur auf Eichen.

Cerastis.


C. Vaccinii nicht selten.

C. Erythrocephala. Triepke.

C. Glabra. Tr.

C. Satellitia. Die Raupe in manchen Jahren im Juni nicht selten.

(Fortsetzung folgt.)



Genera et Species Curculionidum, cum synonymia hujus Familiae; a C. J. Schönherr. Tomus septimus, pars prima. Supplementum continens. Parisiis apud Roret, Lipsiae apud Fleischer. 1845. 8 maj. 479 pag.

Früher, als wir es bei der Anzeige des zweiten Theiles sechsten Bandes vermutheten, ist dieser erste Theil des siebenten Bandes erschienen; — was dem Entomologischen Publikum allerdings nur um so angenehmer sein kann.

Der Herr Verfasser zeigt im Vorworte zu diesem Theile an, dass er, zur Begrenzung seines ohnehin an sich sehr umfassenden Werkes, nöthig erachtet habe, viele neue Arten von nicht hervorstechender Form, so wie auch einige neue Gattungen, die seiner Sammlung fehlen, nicht aufzunehmen; ein Entschluss, der auf der andern Seite der möglichsten Vollständigkeit des Werks Abbruch thut.

In dem vorliegenden Theile folgt:

Divis. VIII. Phyllobides.

- Gen. 275. *Aptolemus* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art.
 Gen. 276. *Mylocerus* Schönh. — 19 Arten, worunter
 5 bisher unbeschriebene.
 Gen. 277. *Macrocorynus* Schönh. — 1 Art.
 Gen. 278. *Phyllobius* Schönh. — 59 Arten, worunter
 20 neu. — *Ph. psittacinus* Zenk. fanden wir auch in
 Böhmen (Ent. Zeit. 1840 p. 114); auch erhielten wir
 ihn aus Frankreich. — *Ph. pomonae* Oliv. Germ. ist
 von *Ph. uniformis* Marsh. wohl nicht verschieden, wie
 Schönh. jetzt selbst meint.
 Gen. 279. *Aphrastus* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art,
 der *Phyllob. taeniatus* Say. Schönh.
 Gen. 280. *Eustylus* Schönh. Nov. Gen. — 2 neue
 Arten.
 Gen. 281. *Hormotrophus* Schönh. Nov. Gen. —
 1 neue Art.
 Gen. 282. *Styliscus* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art,
 der *Curc. armatus* Thunb.
 Gen. 283. *Arhines* Schönh. — 2 Arten, worunter
 1 neu.
 Gen. 284. *Macrops* Kirby. — 2 Arten aus Nord-
 amerika.
 Gen. 285. *Cyphicerus* Schönh. — 2 Arten.
 Gen. 286. *Platytrachelus* Schönh. Nov. Gen. —
 1 neue Art aus Siam.
 Gen. 287. *Amblyrhinus* Schönh. — 1 Art.

Divis. IX. Cyclomides.

- Gen. 288. *Amycterus* Dalm. — 53 sämmtlich Austra-
 lische Arten, worunter 24 neu.
 Gen. 289. *Bothynorhynchus* Germ. Nov. Gen. —
 1 Art aus Neuholdland.
 Gen. 290. *Occylotrachelus* Schönh. Nov. Gen. —
 1 neue Art vom Cap.
 Gen. 291. *Episomus* Schönh. — 11 Arten, worunter
 3 neu.
 Gen. 292. *Cyclomus* Schönh. — 6 Arten, 1 neu.
 Gen. 293. *Scotoeborus* Schönh. Nov. Gen. — 1 bis-
 her unbeschriebene Art.

- Gen. 294. *Catalalus* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art aus Madagaskar.
- Gen. 295. *Bustomus* Schönh. Nov. Gen. — 2 neue Arten aus Kafferland.
- Gen. 296. *Hadorrhinus* Schönh. — 2 Arten, worunter 1 neu.
- Gen. 297. *Ptochus* Schönh. — 12 Arten, worunter 1 neu.
- Gen. 298. *Porpacus* Schönh. Nov. Gen. — 2 neue Arten aus Kafferland.
- Gen. 299. *Trachyphloeus* Germ. — 21 Arten, darunter neu 9.
- Gen. 300. *Cathormiocerus* Schönh. Nov. Gen. — 2 Arten, wovon 1 neu.
- Gen. 301. *Phyxelis* Schönh. Nov. Gen. — 3 Arten aus Nordamerika, darunter 2 neu.
- Gen. 302. *Lalagetes* Schönh. Nov. Gen. — 2 neue Arten vom Cap.
- Gen. 303. *Omius* Schönh. — 36 Arten, darunter 15 neu.
- Gen. 304. *Mylacus* Boheman. Nov. Gen. — 1 neue Art aus Sibirien.
- Gen. 305. *Stomodes* Schönh. — 3 Arten, wovon 2 neu.
- Gen. 306. *Peritelus* Germ. — 14 Arten, neu darunter 6.
- Gen. 307. *Cercopeus* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art aus Nordamerika.
- Gen. 308. *Lobetorus* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art vom Cap.
- Gen. 309. *Cladeyterus* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art aus Kafferland.
- Gen. 310. *Aomus* Schönh. — 1 Art.
- Gen. 311. *Phlyctinus* Schönh. — 14 Arten, davon 8 neu.
- Gen. 312. *Piezoderes* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art vom Cap.
- Gen. 313. *Cosmorhinus* Schönh. — 2 Arten, 1 neu.
- Gen. 314. *Sympiezorhynchus* Schönh. Nov. Gen. — 3 neue Capensische Arten.
- Gen. 315. *Ellimenistes* Schönh. Nov. Gen. — 11 neue Südafrikanische Arten.
- Gen. 316. *Cycliscus* Schönh. Nov. Gen. — 5 Südafrikanische neue Arten.
- Gen. 317. *Holcorhinus* Schönh. — 2 Arten.
- Gen. 318. *Phaylomerinthus* Schönh. Nov. Gen. — 1 Art aus Kafferland.

- Gen. 319. *Sciobius* Schönh. — 15 Arten, darunter 11 neu.
- Gen. 320. *Eremnus* Schönh. — 31 Arten, wovon 26 neu.
- Gen. 531. *Laparocerus* Schönh. — 4 Arten, darunter 1 neu.
- Gen. 322. *Pholicodes* Schönh. — 6 Arten, wovon 2 neu. — *Brachyderes inauratus* Mannerh. gehört zu dieser Gattung.
- Gen. 323. *Epiphaneus* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art aus Kleinasien.
- Gen. 324. *Chiloneus* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art aus Sicilien.
- Gen. 325. *Acanthotrachelus* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art aus Ostindien.
- Gen. 326. *Elytrurus* Boisd. Nov. Gen. — 2 Arten aus Oceanien.
- Gen. 326. *Pyrgops* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art, von den Philippinischen Inseln.
- Gen. 327. *Isomerinthus* Schönh. (*Sphaeropterus* Guér. Men.) Nov. Gen. — 8 Arten, wovon 5 neu.
- Gen. 328. *Celeuthetes* Schönh. (früher *Sphaeromus*, welcher Name schon vorher von Latr. vergeben war.) — 2 Arten, davon 1 neu.
- Gen. 329. *Pantopoeus* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art aus Neuholland.
- Gen. 330. *Merimnetes* Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art, ebendaher.
- Gen. 331. *Psomeles* Guér. Ménev. — 5 Australische Arten. (Schönh. unbekannt.)

Divis. X. Otiorhynchides.

- Gen. 332. *Otiorhynchus* Germ. — 260 Arten, worunter 105 bisher noch unbeschriebene. — *O. villosopunctatus* Ziegl. wird nun als Abart zu *O. niger* F. gezogen
- Gen. 333. *Tyloderes* Schönh. — Es werden 3 in Süddeutschland vorkommende Arten unterschieden. *T. chrysops* Herbst, *T. Megerlei* Fabr. und *T. Dejeanii* Schönh.; ausserdem eine vierte Art aus Neuholland; letztere beide neu.
- Gen. 334. *Embrithes* Schönh. Nov. Gen. — 3 neue Arten aus Kafferland.

- Gen. 335. Siteytes Schönh. Nov. Gen. — 4 Arten, wovon 2 neu.
 Gen. 336. Agraphus Schönh. Nov. Gen. — 1 Art.
 Gen. 337. Catergus Schönh. Nov. Gen. — 1 neue Art aus Kafferland.
 Gen. 338. Caterectus Schönh. Nov. Gen. — 2 neue Arten, vom Cap und von den Ostindischen Inseln.
 Gen. 339. Elytrodon Schönh. — 3 Arten, 1 neu.
 Gen. 340. Nastus Schönh. Nov. Gen. — 2 Arten, 1 neu.
 Gen. 341. Hyphantus Germ. — 3 Arten, darunter 2 neu.
 Gen. 342. Phytoscapus Schönh. — 7 Arten, wovon 5 neu.
 Gen. 343. Chloebius Schönh. — 3 Arten, davon 2 neu.

Legio II. Mecorhynchi.

Divis. I. Erirhinides.

- Gen. 344. Lixus Fabr. — 181 Arten; darunter 47 bisher noch unbeschriebene.
 Gen. 345. Pacholenus Schönh. — 2 Arten.
 Gen. 346. Brachypus Schönh. — 1 Art.

Reg.-Rath **Schmidt.**

Der entomologische Verein versammelt sich zur Sitzung für den December am 5ten, Abends 7 Uhr, im Vereinslocale.

Der Verein hat für Briefe und Packete innerhalb des Preuss. Staates Portofreiheit, wenn die Briefe unter Kreuzband gesendet werden, und die Packete mit offener Adresse nicht über 5 Pfd. wiegen. Die Adresse für Briefe und Packete muss lauten: „An den entomologischen Verein zu Stettin“ und ausserdem noch den Beisatz führen: „Allgem. Angelegenheiten des entomologischen Vereins zu Stettin.“ Es wird dringend gebeten, mit grösster Genauigkeit diesen Vorschriften nachzukommen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1843

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Schmidt

Artikel/Article: [Genera et Species Curculionidum, cum synonymia hujus Familiae ; a C. J. Schönherr. Tomus septimus , pars prima. Supplementum continens. Parisiis apud Roret, Lipsiae apud Fleischer. 1843. 8 maj. 479 pag. 348-352](#)