

Einige neue Käfer der Indo-Australischen Region in der Sammlung des Tring-Museums.

Dr. **K. Jordan**, Tring, England.

1. *Coryphocera blanda* sp. nov.

Nigra, supra parum brunnescens, viridescenti-rubro-signata, maculis pro luce versicoloribus. Caput rubrescenti-viride, simplex, clypeo quadrangulati angulis rotundatis, densissime punctatum. Antennae brunneae.

Prothorax antrorsum fortiter regulariterque angustatus, ad angulos posticos rotundatos fere triplo latior quam ad apicem, latitudine longitudine fere duplo majore, convexus, densissime crasse punctatus, punctis ante scutellum sparsioribus; viridescenti-ruber, duabus vittis nigris ante scutellum approximatis vel confluis, antrorsum angustatis, marginem apicalem fere attingentibus, vel attingentibus, extus convexis, intus parum concavis, notatus.

Scutellum viridescenti-rubrum, basi utrinque et apice extremo parum nigrum, regulariter acute triangulare, nitidum, lateribus paucis punctis crassis instructum.

Elytra retrorsum fortiter angustata, basi fere duplo latiora quam supra segmenti quarti abdominalis basin, suturali angulo late breviter dentato, densissime punctata, punctis ad humeros plus minusve longitrorsum confluis, laterum dimidio apicali et apice toto transverse strigosa ac umbilicatum punctata; macula transversa mediana suturam haud attingente, altera plus minusve rotundata apicali viridescenti-rubris signata.

Pygidium transverse aciculatum, apice ipso impressum, utrinque rubro-flavo-bimaculatum, maculis ad apicem confluis.

Corpus inferum nitens; lateribus prosterni longitrorsum aciculatis; metasterno medio sublaevi, lateribus umbilicato-punctato ac strigoso, episternis dense umbilicato-punctato; segmento ultimo transverse strigoso; epimeris mesosterni apice, processu mesosternali lato apice rotundato, macula utrinque in medio metasterni, margine laterali crassato et parte mediana coxarum posticarum, maculis lateralibus abdominis segmentorum 3ii, 4i, 5i ac mediana magna 5i, femoribus quatuor anticis infra, posticis macula basali alteraque apicali, tibiis

macula magna submediana, viridescenti-rubris. Pedes punctis strigisque fortiter adpersi, tibiis anticis versus apicem dilatatis, ante apicem dente parvo armatis, intermediis et posticis medio dentatis.

Long. (cap. excl.) 18 mm, cap. $3\frac{1}{3}$, elytr. 14, lat. (hum.) $9\frac{1}{2}$.

Hab. Kiukiang, China, July 1887 (Pratt leg.)

Infolge der starken Punktirung besitzt die Oberseite geringen Glanz. Die Größe der Makeln ist nicht constant. Die Haare der Unterseite sind blaß gelb.

Utra gen. nov. Colpoderinorum.

Palpi labiales maxillaribus breviores, articulis ac iis maxillarum palporum latitudine subaequalibus. Mandibulae (♂) fere longitudine capitis, regulariter arcuatae, apice ipso bidentato; (♀) dimidio latitudinis capitis fortiter arcuatae, interne uni- vel bidentatae. Caput antice transverse fortiter depressum, depressione postice linea concava quae medio cum linea longitudinali mediana capitis conflua determinata.

Antennae longitudine dimidii corporis (♂), vel parum breviores (♀); articulo 1^o crasso, 2^o brevissimo, 3^o quarto ad decimum dimidio vel fere dimidio, 11^o tertio longioribus.

Prothorax rectangularis transversus, (♂) versus basin levissime angustatus, lateribus parum reflexis crenulatus, disco medio subplanatus, utrinque convexo-elevatus.

Elytra parallela, pone humeros parum inflexa, in quarta parte apicali rotundato-angustata, apice (singuli elytri) extus valde rotundato, intus fere rectangulato haud dentato.

Wie in *Dorx* Newm., welcher Gattung die neue am nächsten steht, haben die Tarsen ein kleines aber deutliches fünftes Glied am Grunde des Klauengliedes. Die Form der Taster, Mandibeln, des Halsschildes und der Fühler hauptsächlich unterscheiden *Utra* von *Dorx* Newm.

2. *Utra nitida* sp. nov.

♂♀. Nigro-castanea, nitida, supra omnino glabra. Mandibulae sparsim punctatae, punctis versus marginem internum densioribus. Caput antice punctatum, fronte ad oculos bi-impressum, occipite utrinque sparsis punctis instructum, pone oculos pilosum.

Scapus antennarum latitudine paulo longior, paucis punctis notatum, caeteri articuli magis punctati, duo ultimi densis foveis olfactoriis instructi.

Prothorax laevis (♂) ad angulos anticos sat dense, posticos multo sparsius punctatus, (♀) paucis punctis in angulis sitis instructus; margine antico medio late emarginato, angulis anticis parum productis sed rotundatis; angulis posticis in (♂) magis quam in (♀) recurvatis; margine basali juxta angulos posticos bisinuato.

Scutellum transversum, impunctatum, late rotundatum. Elytra impunctata, (♂) regione transversa postbasali rugosa; basi ad humeros impressa; lateribus reflexo-marginatis.

Submentum rugatum. Prosternum subtiliter dense punctatum, processu intercoxali fere horizontali fortiter marginato. Meso- et metasternum lateribus breviter pubescentia ac punctata. Abdomen in (♀) postice paucis punctis notatum, in (♂) segmenti primi basi, secundi tertii quarti spatio parvo laterali sat bene circumscripto dense punctatis. Pedes paucis punctis instructi.

♂. Long. (mand. excl.) 58 mm, mand. 10, proth. (medio) 9, elytr. 37, lat. (proth.) 18½, lat. (hum.) 20.

♀. Long. (mand. excl.) 57 mm, mand. 6, proth. (medio) 8, elytr. 39, lat. (proth.) 15, lat. (hum.) 20.

Hab. Nord-Australien: Port Darwin (Typus, 1 ♂, 1 ♀), Cairns (1 ♀).

Dieses auffallende Thier erinnert durch seinen Glanz an die afrikanischen Vertreter der *Colpoderinen* und durch seine breite Gestalt an *Mallodon*.

3. *Merionoeda amabilis* sp. nov.

♀. A *M. nigriceps* White dicta capite aurantiaco-flavo, antennis totis nigris, prothorace latitudine longiore, tibiisque posticis apice fusco excepto flavis facile distinguendus.

Long. (cum cap.) 13 mm, elytr. 4½, lat. (hum.) 3.

Hab. Khasi Hills, Assam, 1 ♀.

Einfarbig orangen-gelb; Augen, Fühler, äußerste Spitze der Decken und ein Ring vor der Spitze der Hinterschenkel schwarz; Spitze der Hinterschienen bräunlich; Hintertarsen bräunlich-gelb. Kopf in der Mitte vor den Fühlerhöckern mit einem Quer-, zwischen den Höckern mit einem Längseindruck, beide Eindrücke zu einer in der Mitte ziemlich tiefen dreieckigen Grube zusammengelassen; fein, neben den Augen stärker punktiert. Erstes Fühlerglied glatt und glänzend. Halsschild glatt, länger als breit; die mittlere Erhöhung mit einem Grübchen vor der Basis. Flügeldecken das erste Viertel des ersten Abdominalsegments erreichend, von der Mitte ab klapplend, glänzend, der Länge nach eingedrückt, Schultern glatt

und vorstehend, mit unregelmäßig gereihten, haartragenden Punkten spärlich besetzt. Unterflügel im basalen Theile gelb, im apicalen Theile schwarz.

Unterseite glänzend, wie die Oberseite ziemlich sparsam und mäßig lang behaart; Abdomen zerstreut aber deutlich punktirt.

4. *Xylotrechus carinicollis* sp. nov.

Rufo-fuliginosus. Caput sordide flavo-pubescent, carina mediana longitrossum (parte antica excepta) canaliculata nigra notatum. Antennae crassae, articulis 1^o—5^o rufis, 6^o—11^o brunneis, 2^o latitudine multo longiore. Prothorax subglobosus, maxima latitudine mox ante medium, disco medio carinatus, granulatus, margine apicali angusto et fascia transversa antemediana ad coxas usque descendente brunneis, fascia antebasali utrinque maculatim dilatata subnigra, margine basali flavo-pubescente.

Scutellum flavo-pubescent, sub-semicirculare. Elytra retrorsum angustata, apice angulo exteriori dentato, interiore rotundo, margine basali (lat. 1 mm) et quarta parte apicali rufo-fuliginosa exceptis nigra: fascia antemediana recta (lat. $\frac{3}{4}$ mm) altera postmediana versus latera parum retrorsum flexa prima paulo angustiore flavis completis.

Corpus infra flavo-pubescent, macula basali prosterni, episternis mesosterni, lateribus et margine postico metasterni, segmentorum abdominis margine posteriore densius pubescentibus. Processus mesosternalis tuberculiformis, medio niger. Metasternum pro maxima parte et segmenta abdominalia basi nigra. Pedes rufi.

Long. (cum cap.) $15\frac{1}{2}$ mm, proth. 4, elytr. $10\frac{1}{2}$, lat. (proth.) 4, elytr. (hum.) $4\frac{1}{2}$.

Hab. Khasi Hills, Assam, Juli 94.

5. *Cyriocrates amoenus* sp. nov.

A speciebus *C. zonator* Thoms. et *medenbachii* Rits. dictis antennarum articulis septem ultimis totis nigris; prothoracis tuberculi dorsali postmediano latiore altioreque, impressione transversa antemediana latiore, elytris intra humeros et scutellum granulis majoribus sed sparsioribus, sine linea elevata, granulis regione humerali sparsis obsoletis, lateribus ab humeris ad apicem vix punctatis parum rugulosis, dorso punctis sparsis basin versus frequentioribus piliferis notatis, pilis longis, macula basali intra scutellum et humerum, collo humerali, quatuor fasciis transversis rectis, macula transversa antepicali (in utroque elytro), glabris diversus.

Long. (cum cap.) 40 mm, proth. 6, elytr. 30, lat. (hum.) 14.

Hab. Kina Balu, Nord-Borneo (A. Everett leg.), 1 ♀.

Die Pubescenz ist grau-grün, seidenschimmernd, mit einem Stich ins bläuliche; die nackten Stellen sind grünlich-schwarz. Der Höcker auf der Scheibe des Halsschildes ist nackt und zeigt auch unter starker Vergrößerung keine Punktirung; zwischen diesem nackten Mittelfelde und den Seitendornen findet sich jederseits noch ein schwarzer, dreieckiger Fleck; die Basis des Pronotums ist ganz tomentirt.

Von den vier vollständigen nackten Binden der Flügeldecken ist die zweite die breiteste und etwa so breit als die zweite beschuppte, schmaler als die dritte (mediane) beschuppte Binde; die vierte nackte Binde steht weiter von der Spitze entfernt als in *medenbachi* Rits. (Notes Leyd. Mus. p. 39, 1881) ihr Vorderrand endigt an den Seiten oberhalb der Mitte des vorletzten Abdominalsegments; die fünfte auf zwei Flecke reduzierte Binde fehlt den andern Arten.

Das erste und zweite Fühlerglied und die Basen der beiden folgenden sind grau-grün, die andern Glieder sind ungeringelt; das vierte und fünfte Glied ist an der Spitze nur schwach verdickt, viel weniger als in *C. medenbachi* Rits.

Die längern Haare der Decken haben etwa eine Länge von $1\frac{1}{2}$ mm. Der *Nemophas malachiticus* Nonfried (B. E. Z. XXXVI. p. 380 n. 25, 1892) ist ein *Cyriocrates* und ist wahrscheinlich mit *C. medenbachi* Rits. identisch.

6. *Glenea flava* sp. nov.

♀. Brunnea, dense flavo-tomentosa, nigro-maculata. Caput linea nigra mediana sub prothoracis marginem apicalem dilatata signatum. Antennae nigrae, unicolores. Prothorax longitudine triente latior, post apicem et ante basim lateribus leviter constrictus, dorso quatuor maculis in quadrangulo positis maculaque laterali nigris. Elytra pallide rufa, dense flavo-tomentosa basi paucis punctis sub tomentum obviis instructa, juxta carinam humeralem usque pone medium abeuntem seriatim crasse punctata, angulo suturali apicali subrecto, exteriore brevissime dentato; utroque elytro quatuor maculis nigris in serie una dispositis notato: 1^a in parte quarta basali elytri rotundo, 2^a paulo ante medium parum majore, 3^o omnium minima magis versus latus sita, 4^a omnium maxima apicali sed margines ni suturalem ni lateralem tangente.

Corpus inferum lateribus obscurius, metasterno lateribus maculis denudatis, atris, segmentis 4 basalibus abdominis lateraliter basi nigris. Pedes luteo-rufi, pallide flavo-pubescentes.

Long. (eum cap.) 15 mm, elytr. $10\frac{1}{2}$, lat. (hum.) 6.

Hab. Sikkim, 1 ♀.

Aehnelt in Struktur und Farbe sehr der *G. maculifera* Thoms. Das Halsschild ist etwas kürzer, an der Basis breiter, seine Flecke sind kleiner: die Decken sind anders gezeichnet und ihre Spitze ist innen nicht, außen schwach gezähnt. Der schwarze Stirnflek der *maculifera* fehlt, dagegen ist die ganze Mittellinie des Kopfes schwarz.

~~~~~

## Beiträge zur Kenntniss

der

## melitophilen Lamellicornier (Coleoptera).

Von **H. J. Kolbe.**

V.

### Kurzer Entwurf zu einer Eintheilung der Cetoniiden.

Eine Untersuchung und Vergleichung der Cetoniiden hinsichtlich der Bildung der hinteren Tarsen hat das folgende Ergebnis.

Erstens. Bei *Goliathus*, *Goliathinus* und Verwandten, bei *Hypselogenia*, *Rhyxiphloea*, *Rhinocoeta*, *Heteroclita* etc., *Somalibia*, *Stalagmosoma*, *Phoxomela*, *Psacadoptera*, *Pseudoprotactia*, *Anoplochilus* und Verwandten, bei *Dolichostethus*, *Tephraea*, *Aplasta*, *Polystalactica*, *Aethiessa*, *Trichostetha*, *Elaphinis* etc. — sind das erste oder die ersten Glieder der hinteren Tarsen mehr oder weniger compreß, am Ende verbreitert und hier im oberen Winkel in einen Dorn ausgezogen oder lang zugespitzt. Auch die untere Ecke am Ende der Glieder ist mehrfach so beschaffen. In manchen Gattungen ist außerdem das erste Glied größer als das zweite. In einigen Gattungen ist die geschilderte Bildung der Hintertarsen nur im weiblichen Geschlecht zum Ausdruck gelangt, im männlichen Geschlecht sind die Glieder der Hintertarsen einfach cylindrisch, z. B. bei *Ischnostoma* und *Odontorrhina*.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Jordan Karl

Artikel/Article: [Einige neue Käfer der Indo-Australischen Region in der Sammlung des Tring-Museums 266-271](#)