

Das ♂ hat rein weiße Makeln und Binden und auf der Unterseite ist die braune Grundfarbe schärfer abgesetzt; auch etwas größer als *vikasi*.

♂ Vorderflügelänge 26 mm, ♀ 32 mm.

#### ***Neptis tiga niasana* nov. subspec.**

Sechs mir vorliegende ♂♂♀♀ von *Neptis tiga* Moore aus Nias sind heller gefärbt als solche aus Java. Die schwarzen Binden aller Flügel sind schmaler und deshalb zierlicher und gewinnt dadurch die gelbe Grundfarbe besonders in der Vorderflügelzelle an Ausdehnung. Die Zeichnung der Unterseite ist etwas obsolet und erinnert an die ab. *dorelia* Butl., welche ich gleich de Nicéville auch nur für eine Zeitform von *tiga* halte.

♂ 22 mm. ♀ 24 mm Vorderflügelänge.

## Eine neue *Neptis* aus Celebes

von **H. Fruhstorfer.**

#### ***Neptis neriphus tawayana* nov. subspec.**

(*Neptis neriphus* Stdgr. Exot. Schmetterlinge p. 146, Taf. 50).

Celebische *N. neriphus* sind viel größer als typische Exemplare, welche mir von Sula-Mangoli und Sula-Besi in Anzahl vorliegen, und heller braunroth gefärbt.

Auf der Hinterflügel-Unterseite verlaufen die Medianbinden weniger gerade und sind etwas obsoleter. Die bleichröthliche Binde vor dem schwarzen Marginalsaum ist viel breiter.

♂ von *neriphus* aus Sula-Besi 25 mm.

♂ von *tawayana* 30 mm.

Patria: Toli-Toli, Nord-Celebes, Nov.-Dez. 1895, Patunung, S.-Celebes, Jan. 1896, H. Fruhstorfer leg. Tawayana, Centr.-Celebes, Aug. 1896, W. Doherty leg.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [60](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Eine neue Neptis aus Celebes 351](#)