

# Hemiptera Sumatrana

collecta a dom. Henrico Dohrn,  
enumerata et descripta a Gustavo Breddin.

Pars II.

## Fam. Pyrrhocoridae.

Lohita grandis Gray.

var. sumatrana Dist.

Sockaranda (Januar).

Ocurredit etiam in insulae Borneo meridionalis parte  
orientali (!).

\* **Physopelta limbata** Stål.

(Syn. *Iphita limbata* Stål, Enum. I. p. 99.)

Species variat alis vel rudimentariis vel plus minusve compleatis. In speciminibus alis rudimentariis praeditis, ut saepe in Heteropteris oocurredit, etiam pronotum transformatum est formamque angustiorem et planiorem exhibit. Dom. Stål specimina tantum alis destituta vidit.

Forma alata.

♂♀. Corpore elongato, pone humeros subaequilato. Prothorace distinctissime transversali, inter humeros quam longitudine sua paulo minus quam duplo latiore (5 : 3), trapezoidalis; marginibus lateralibus subdilatatis, circa medium leviter sinuatis; supra paulo ante medium leviter transversaliter impresso, lobo antico leviter convexo, ad marginem anticum depressiusculo, depressione tamen linea impressa haud separata. Membrana lata, apicem abdominis distinete superante.

Specimina inter formam typicam inalatam et nostram alata intermedia haud desunt.

Membrana variat nunc omnino nigro-fusca, nunc limbo costali et apicali albescenti. Rostro nunc inter coxas inter-

Stett. entomol. Zeit. 1901.

medias extenso, nunc basin ventris superante. Antennarum articulo quarto cum primo nunc aequilongo nunc eo breviore.

Sockaranda (Januar), formae typica et alata.

**Physopelta gutta** Burm.

Sockaranda (Januar).

\* **Physopelta albofasciata** Deg.

Sockaranda (Januar).

Specimina vidi reportata ex insulis Java, Banguey, Palawan.

\* **Physopelta villosa** n. spec.

Corpo elongato-ovato, undique flavescenti-villoso. Capite breviter triangulari, latitudine sua cum oculis distinctissime breviore. Pronoto late subtrapezoidali, inter humeros quam longitudine sua mediana paulo minus quam duplo latiore (5 : 3). Marginibus lateralibus circa medium sinuatis, ante medium rotundatis, totis carinatis nec reflexis; carina versus humeros evanescenti; margine postico late rotundatulo. Pronoto supra in medio transversaliter impresso, impressione obsolete carinulata (sere ut in quibusdam *Ectrichodiini*); lobo postico subplano (limbo humerali subelevato excepto), dense et sat rude punctato, antice carinula mediana obsoletiuscula instructo; lobo antico longitudinaliter convexiusculo, antrorsum ad marginem anticum subito declivo. Scutello aequilateralis, plano, cum clavo corioque, huius limbo costali excepto, remote punctulato; punctis clavi in series plus minusve regulares ordinatis. Membrana in utroque sexu apieem abdominis attingente. Rostro basin ventris attingente; articulo primo oculorum marginem posticum hand attingente; articulo tertio secundo longiore. Capite inferiore profunde sulcato; mesosterno medio distinete carinulato. Femoribus anterioribus subtus biseriatim dense et acute granulatis, ante apicem tuberculis paucis paulo maioribus non-nunquam munitis. Tarsis gracilibus, posticorum articulo primo apicalibus duobus simul sumptis duplo longiore. Antennis crassiusculis atque breviusculis; articulo primo capite vix longiore;

articulo secundo quam primo, et iterum articulo quarto quam secundo paulo longiore; articulo tertio quam secundo fere duplo breviore.

Nigro-fusea, coxis, trochanteribus, tarsorum articulationibus et ventris disco in ferrugineo-piceum dilutis; rostro sordide flavescenti. Prothoracis marginibus lateralibus (humeros versus paulo dilatatis), corii limbo costali basin versus introrsum diffuse subdilatato, dorso abdominis, connexivo supra subtusque segmentoque genitali maris aurantiaco-rubris. Antennis nigris; articulo quarto, basi et apice imis fuscouscentibus exceptis, ciburneo. Membrana nigra, angulo basali interiore et basi ima subaurantiaco-fuseis. Alis leviter fumigatis, venis fuscis.

Long. corp. 7—9 mm; lat. hum.  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$  mm.

Sockaranda (Januar), Liangagas.

Species *Ph. pilosae* Stål philippinensi forte a finis tamē certissime distinctissima. Differt ab omnibus, quas quidem cognoscam, congenericis praeter parvitatem corporis, brevitatem antennarum, pilositatem densam, praeceps incisura etiam segmenta tertium et quartum separante lateribus valde antrorsum curvata, segmento ventrali tertio medio quam in lateribus duplo longiore.

#### *Antilocetus bicolor* Leth.

Sockaranda (Januar).

Praeterea Banguey (?).

\* *Ectatops rubiaceus* Am. & S.,  
cum var. *ophthalmicus* Burm.

Sockaranda (Januar).

Ocurrit etiam in ins. Palawan (?).

\* *Ectatops obscurus* Vuillef.

Sockaranda (Januar).

\* *Ectatops speculum* n. spec.

Capite elongato-triangulari; antennarum insertione ab oculis quam ab apice capitis distinete magis distante; oculis stylatis

Stett. entomol. Zeit. 1901.

subsursum directis. Pronoto quam longitudine sua fere tertia parte sua latiore (3 : 2), paulo ante medium sat fortiter transversaliter impresso, extus distinete carinato-marginato. Scutello basin versus convexo ibique medio nonnumquam subtuberculariter elevato. Rostro medium segmenti quarti ventralis attingente. Antennis medioeribus, articulo primo quam capite nonnihil breviore.

*Nigro-fusens*, breviter flavo-griseo-puberulus. Antennarum articuli quarti annulo lato subbasali, scutelli apice femorumque posteriorum basi cum trochanteribus albo-luteis, tibiis apicem et tarsis basin versus saepe sordide ferrugineo-fuscescentibus. Hemelytris pulchre ochraceis; clavo toto, corii linea percurrente rimulam et venam principalem sequente eiusdemque limbo toto angusto picco-brunneis. Membrana dilute flava; limbo toto sat lato nigro-fuseo. Ventris maculis submarginalibus rotundatis typicis glanduligeris nigerrimis.

Long. corp. ♂: 8—8½, ♀: 10—10½ mm; lat. hum. ♂: 3, ♀: 3½ mm.

Sookaranda (Januar).<sup>\*)</sup>

### **Saldoides** n. gen.

Capite horizontali, elongato, latitudine sua cum oculis distinctissime longiore; oculis medioeribus sessilibus vel vix stylatis, semiglobosis; capite inter oculos transversaliter convexo, superne viso ab oculis usque ad apicem tubercularum antennalium dilatato

<sup>\*)</sup> Species, ut videtur, *E. adusto* Walk. affinissima, differt tamen, si recte describit auctor, antennarum articulo quarto albo-annulato, rostro longiore aliisque notis.

#### *E. nervosus* n. spec.

*E. speculo* omnino similis, at membrana nigro-fusca, venis omnibus fere usque ad marginem ipsum luteo-albis.

Borneo (Baram flumen, Kükenthal leg.), Banguey.

Hanc formam varietatem *E. speculi* simillimi existimare nequeo propter colores membrane omnino alter dispositos (Disco inter venas in *E. nervoso* nigro, in *E. speculo* luteo; iterum apicilus venarum in limbo peripherico in *E. nervoso* luteis, in *E. speculo* nigris). Est species propria quamvis affinissima, in Borneo insulisque proximis *E. speculi* vicaria.

et hic latissimo. Capite inferiore punctato; bucculis minusculis fere rectangularibus; marginibus lateralibus capitis inferioris inter bucculam et antennarum insertionem dente lato apertangulari etiam a supero bene distinguendo armatis. Pronoto trapezoideo, inter humeros quam capite cum oculis duplo latiore; marginibus lateralibus carinatis, antice distinete calloso-reflexis. Scutello distinete convexo. Hemelytris clavis abdomini fere aequilatis; angulo apicali corii extus oblique detrunato. Meso- et metasterno longitrorum carinatis; pleurorum areis scapularibus circum-punctatis. Ventre basin versus subsulcato. Rostro longo, ventris medium longe superante. Pedibus medioeribus; femoribus anticis spinulis nonnullis armatis, ceteris inermibus; tarsorum posticorum articulo primo quam apicalibus duobus simul sumptis multo longiore. Antennis tenuibus; articulo primo capiti vix aequilongo et quam articulo secundo haud vel vix longiore.

Genus *Ectatopi* affīge, structura capitis aliisque notis facile distinguitur.

\* **S. ornatulus** n. spec.

♂: Capite pronoto longiore; hoc paulo ante medium supra et in lateribus distinete constricto; marginibus lateralibus pone stricturam rectis, ante stricturam rotundatis ibique distin-  
tissime calloso-reflexis; parte cicatricali convexa, subbituberculata,  
postice rude, antice subtiliter circumpunctata, ceterum cum capite  
superiore et laterali corporeque inferiore impunctatis. Postpronoto,  
scutello, corio cum clavo prostethioque secundum marginem anti-  
cum sat fortiter atque rude punctatis. Membrana apicem ab-  
dominis haud superante. Rostro basin segmenti septimi ventralis  
attingente; articulis primo secundoque aequilongis, apicalibus  
deinceps brevioribus. Femoribus anticis subtus apicem versus  
spinulis duabus minutis armatis. Antennarum articulis secundo  
quar toque subaequilongis; tertio temni, quam ceteris multo breviore.

Corpore, cum dorso abdominis, nigro, glabro, supra opaco,  
infra nitidulo. Antepronoti marginibus lateralibus callosis, post-

pronoti angulo humerali glabro, corii macula parva triangulari costali prope angulum apicalem posita maeulisque in angulis apicalibus segmentorum connexivalium supra subtusque positis laete sanguineis. Antennarum artieuli quarti annulo latissimo subbasali basique angustissima artieuli tertii albo-luteis. Rostro (muis articulis basali et apicali paulo obscurioribus), tibiis apicem versus tarsisque plus minusve pieseenti-flavis vel ferrugineo-flavis. Membrana fusco-nigra.

Long. corp. 9 mm; lat. hum.  $3\frac{1}{2}$  mm.

Soekaranda (Januar).

\* *Euscopus parviceps* n. spec.

$\delta\varnothing$ : Corpore subovaliter elongatulo. Capite minuseulo, quam pronoti latitudine collari angustiore, cum oculis fere aequilateraliter triangulari; oculis sessilibus, sursum omnino non directis. Bucculis brevibus, modice elevatis, angulum fere rectum apice acuminatum efftientibus. Pronoto sat fortiter transverso, inter humeros quam longitudine sua mediana fere duplo latiore (5 : 3), extus sat late calloso-marginato, callo versus humeros dilatato-evanescenti; margine postico late rotundatulo; marginibus lateralis paulo ante medium levissime sinuatis. Pronoto supra paulo ante medium transversaliter impresso; area cicatricali modice convexa glabra, lineis distinete punctatis undique circumscripta. Hemelytris in utroque sexu apicem abdominis attingentibus. Mesos- et metasterno medio carinatis; lineis impressis areas scapulares pectoris includentibus omnibus punctatis. Rostro coxas posticas haud vel vix attingente; articulo primo quam capite paulo breviore et articulo secundo aequilongo; articulo tertio quam secundo et iterum quarto quam tertio paulo brevioribus. Femoribus anticus subtus pone medium spinulis duabus distantibus armatis; tarsorum posticorum articulo basali quam articulis apicalibus simul sumptis distinete longiore (3 : 2). Antennis breviuseulis; articulo primo omnium longissimo articulisque secundo et tertio simul sumptis fere aequilongo; articulis quarto et secundo aequa-

libus. Pronoti area cicatricali impunctata; lobo postico cum area angusta collari rude et densiuscula punctato, limbo laterali calloso, glabro. Scutello et hemelytris dense punctatis; punctis clavi in series subconfusas ordinatis.

Corpo cum rostro, pedibus antennisque nigro, opaco. Corii limbo angusto costali abdomineque supra subitusque dilute sanguineis; ventre flavescenti-sericeo, incisuris omnibus (medio angustissime, latera versus latius nigro-fuscis, extus decurtatis) maculisque utrinque tribus rotundatis nigris. Articuli antennarum quarti parte maiore basali (basi ipsa excepta), prothoracis margine calloso laterali retrorsum paulo dilatato, scutelli saepe apice, nec non macula glabra punctiformi corii mox ante suturae membranalis medium posita eburneis. Membrana sordide picecenti; alis hyalinis, apice leviter infuscatis.

Long. corp. 8—10 mm; lat. imm. 3—4 mm.

Soekaranda (Januar).

Praeter caput distinete angustius oculosque ne minimè quidem stiliatos cum genere *Euscopo* omnino congruit; habitu quodammodo *Scantii* admonet, a quo buccularum structura ceterisque differt.

#### \* *Aeschines bucculatus* Stål.

Soekaranda (Januar).

Ocurrebit etiam circa Perak Malaceae (?).

#### \* *Melamphaeus faber* Fab.

Varietas typica, sanguineo-maculata, varietas alia supra omnino nigra et varietas intermedia supra nigra macula corii magua obsoletissima in insula occurruunt.

Soekaranda (Januar).<sup>\*)</sup>

#### \* *Dindymus albicornis* Fab.

Soekaranda (Januar).

---

<sup>\*)</sup> *Melamphaeus circumdatus* Walk. (1873) = *Antilochus reflexus* Stål (1863).

\* **Dindymus Thunbergi** Stål.

Specimina pulehra aurantiaco-lutea. Pronoti sulcis transversis tenuissime, sentelli basi, articuli quarti antennalis imo apice, tarsorum articulis duobus apicalibus, macula basali ventris pectoreque tantum in hac varietate nigris vel piccis.

Species monticola sec. dom. Dohrn.

Sinabong.

**Dindymus rubiginosus** Fab.

Soekaranda (Januar, in copula!).

Specimina etiam vidi ex insulis Java et Celebes reportata.

**Dindymus Debyi** Leth.

Soekaranda (Januar).

Ocurrexit etiam in ins. Borneo (!), Banguey (!), Palawan (!).

**Dysdercus cingulatus** Fab.

Soekaranda (Januar, in copula!).

\* **Dysdercus poecilus** H.-S.

Soekaranda (Januar, in copula!).

---

## Neue Pepsis-Arten

aus dem königl. Museum für Naturkunde zu Berlin.

Von Dr. **Günther Enderlein**.

---

### **Pepsis Staudingeri** nov. spec.

Tief samtschwarz mit geringem blauen schwach violettem Schimmer. Dicht und äußerst fein pubescent. Parapsidenfurchen scharf eingeschnitten. Antennen schwarz, Unterseite grau angedaut, letztes Glied roth, auf der Unterseite die drei letzten Glieder roth. Vorder- und Hinterflügel stark rothgelb mit intensiv rothem Glanz. Die Vorderflügel außerhalb der geschlossenen Zellen dunkelbraun, 3. Cubitalzelle und 2. Discoidalzelle schwach angeraut. Die Flügelspitze mit weißlich hyalinem Randsaum.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [62](#)

Autor(en)/Author(s): Breddin Gustavo

Artikel/Article: [Hemiptera Sumatrana 138-145](#)