

Neue Cetoniden-Arten. (Col.)

Von J. Moser, Ellrich.

Hypselogenia nyassica n. sp.

H. corrosae Bates affinis, differt cornu clypeali maris post medium antrosum paulo angustato, lateribus ante medium profunde sinuatis, apice bidentato, clypei angulis anticis spinosis; elytris lateribus flavo-marginatis, disco maculis nonnullis ornatis; clypeo feminae lateribus postice parallelis, antice fortiter angustato, lateribus profunde sinuatis, apice bispinoso. — Long. ♂ 26 mm, ♀ 23 mm.

Africa or. (Nyassa).

Gymnetis Zikani n. sp.

Oblonga, postice paulo attenuata, opaca, supra flavo-cinerea, nigro-maculata, elytrorum lateribus apiceque maculis flavis ornatis, subtus cinerea, opaca (♂) vel nigra, nitida (♀). Capite macula media nigra instructa, clypeo subquadrato, margine antico subsinuato; antennis piceis; prothorace macula oblonga media in parte anteriore maculisque numerosis nigris ornato, maculis in prothoracis parte posteriore confluentibus, prothoracis lateribus ante angulos posticos sinuatis; elytris maculis transversis nigris instructis, maculis plus minusve conjunctis, elytrorum lateribus apiceque flavo-maculatis; pygidio nigro, transversim-striolato, breviter setoso. Subtus medio laevi, lateribus grosse punctatis; processu mesosternali producto, fortiter deflexo, apice rotundato; tibiis anticis tridentatis, coxis anticis tibiisque posticis nigro-fusco-ciliatis. — Long. 17 mm.

Amazonas (Rio Xingu: Alta Mira). Zikan leg.

Gymnetis variabilis n. sp.

Praecedenti similis. ♂. Flavo-picea, supra opaca, maculis indistinctis obscurioribus maculisque nonnullis parvis flavis, juxta elytrorum latera positus, ornata, subtus nitida. ♀. Supra flavo-grisea vel nigro-fusca, elytris maculis lateralibus maculaque apicali, interdum permagna, flavis, corpore infra medio nigrescente. Capite, vertice laevi excepto, sat dense punctato, clypeo subquadrato, apice subsinuato; antennis piceis; prothoracis lateribus ante angulos posticos sinuatis, dorso maculis obscuris oblongis, plus minusve distinctis, ornato, pygidio transversim strigillato, breviter setoso. Subtus medio laevi, lateribus fortiter punctatis, punctis breviter flavo-setosis; processu mesosternali producto, fortiter deflexo; tibiis anticis tridentatis, coxis anticis margine-

que interno tiliarum posticarum flavo-pilosis. — Long. 18—21 mm.

Peru (Huanuco).

Glycosia Bakeri n. sp.

♀. *G. palawanicae* Mos. similis. Nigra, supra opaca, subtus nitida, elytris macula laterali subtriangulari ornatis. Capite medio sat remote, ad latera versus paulo densius fortiter punctato, clypei apice bilobato; prothorace, scutello elytrisque dense punctatis, punctis indistinctis, elytrorum sutura postice elevata, apice haud spinosa; pygidio parce punctato. Subtus medio fere laevi, juxta latera punctata, punctis pallide setosis; processu mesosternali producto, parum deflexo, compresso, apice tuberculato; tibiis anticis tridentatis. — Long. 19 mm.

Mindano (Dapitan). C. F. Baker leg.

Die Art ist der *G. palawanica* Mos. ähnlich, doch ohne jede rote Färbung. Der Brustfortsatz ist, im Gegensatz zu *palawanica*, nur ganz schwach abwärts geneigt. Die Behaarung der Vorderhüften ist gelb, bei *palawanica* schwärzlich.

Pachnoda Sjöstedi n. sp.

♂. *P. flaviventris* G. P. similis. Supra nigro-viridis, opaca, flavo-signata, subtus flava, nitida. Capite, fronte nigro-viridi, opaca, antice flavo-bimaculata, clypeo nitido, fusco, lateribus albis; prothorace margine antico angusto vittaque laterali lata flavis; scutello immaculato; elytris macula parva basali intrahumerali, margine laterali apicalique flavis, vitta laterali post medium intus lobata, vitta apicali lata, maculam parvam nigram includente, maculis duabus parvis flavis utrinque juxta suturam post elytrorum medium positis; pygidio post marginem anticum albo-4-punctato, ante apicem flavo-bimaculato. Subtus medio laevi, pectoris lateribus transversim aciculatis et breviter flavido-setosis, abdominis lateribus parce punctatis et albo-transversim-maculatis, abdominis medio longitudinaliter canaliculato; processu mesosternali orbiculari; tibiis anticis tridentatis, dente primo parvo. — Long. 24 mm.

Congo (Mukimungu). Mus. Stockholm.

Die Art ist dem *P. flaviventris* G. P. ähnlich, die Querbinde hinter der Mitte der Flügeldecken ist durch zwei kleine gelbe Punkte ersetzt. Stirn und Pygidium tragen abweichend von *flaviventris* zwei gelbe Makel, der ♂ ist mit einer Ventralfurche versehen, die bei *flaviventris* fehlt. Während bei letzterer Art die Innenkanten der Forcepsparameren parallel laufen, sind sie bei dieser Art gegeneinander gekrümmt.

Pachnoda flavolimbata n. sp.

♂. Praecedenti similis. Nigro-viridis, supra opaca, flavo-signata, subtus nitida, pectoris abdominisque lateribus pedibusque rufis. Capite, fronte nigro-viridi, opaca, clypeo rufo, nitido; prothorace margine antico angusto, marginibus lateralibus latis maculaque parva disci flavis; scutello immaculato; elytris linea brevi interhumerali, margine laterali, postice dilatato et post medium intus lobato, margineque apicali flavis, vitta apicali utrinque juxta suturam nigro-maculato; pygidio rufo, punctis duobus albis postbasalibus ornato. Subtus pectoris medio laevi, pectoris lateribus aciculatis et breviter setosis, abdomine maris sulcato, processu mesosternali orbiculari; tibiis anticis tridentatis, dente primo minuto. — Long. 25 mm.

Congo.

Oberseite ähnlich gefärbt wie die vorhergehend beschriebene Art, das Halsschild jedoch mit einem kleinen gelben Fleck in der Mitte. während die kleinen Flecke inter der Mitte der Flügeldecke fehlen. Kopf und Unterseite sind anders gefärbt. Der Forceps ist sehr ähnlich gebildet. die Innenkanten der Parameren sind noch stärker gekrümmt.

Glaucocelis Sjöstedti n. sp.

Statura *G. bellulae* Boh. Nigra, nitida, albo-maculata, pygidio abdominisque segmento ultimo rufis. Capite dense sat grosse punctato, clypei apice bilobato; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis posticis rotundatis, basi ante scutellum truncata, dorso mediocriter crebre punctato, albo-quadrinaculato, maculis duabus anticis magnis, oblongis, lateralibus, maculis posticis parvis antebasalibus; scutello longo, acuto, laevi; elytris albo-maculatis, sutura et utrinque costis duabus elevatis, costis punctis minutis sparsim obtectis, interstitiis aciculato-punctatis, punctis griseo-setosis, angulis suturalibus rotundatis; pygidio convexo. medio parce, ad latera versus paulo densius strigillato. Subtus pectore medio sparsim, juxta latera densius aciculato-punctato, punctis griseo-pilosis; processu mesosternali brevi, laevi, apice late rotundato; abdomine medio laxo, juxta latera sat crebre pilifero-punctato; tibiis anticis bidentatis. — Long. 8—10 mm.

Matabele. Mus. Stockholm.

Es liegen 2 Exemplare vor, die untereinander stark in der Anzahl und Größe der weißen Flecke auf den Flügeldecken variieren.

Leucocelis uluguruensis n. sp.

♂. *L. transvaalensi* Mos. similis. Nigro-aenea, nitida, prothorace, vitta media longitudinali punctisque duobus antemediis

nigris exceptis, rufo, elytris cyaneis, albo-maculatis, pygidio rufo, abdomine, segmento ultimo rufo excepto, aeneo-cupreo. Capite crebre punctato, clypeo lateribus parallelis, margine antico elevato, sinuato; prothorace inter angulos posticos paulo latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus post medium leviter sinuatis, dorso postice sparsissime et subtilissime punctato, punctis ad marginem anticum versus paulo fortioribus et densius positis; scutello laevi; elytris sutura et utrinque costis duabus elevatis, seriato-punctatis, punctis semiannulatis, seriebus tribus primis postice geminato-striatis; pygidio leviter convexo, 6-albo-maculato, antice annulato-punctato, postice transversim aciculato. Corpore infra medio laxe punctato, pectoris lateribus, coxis posticis abdominisque lateribus aciculatis; processu mesosternali ante apicem transversim setoso, abdomine maris medio deplanato. — Long. 11 mm.

Africa or. (West Uluguru).

Die Art ist der *L. transvaalensis* Mos. sehr ähnlich. Die Clypeuseiten sind gerade, bei *transvaalensis* gebogen, die schwarze Mittelbinde des Halsschildes ist an ihren Seitenrändern verwaschen, die Punktierung des Halsschildes ist feiner. Das Pygidium ist im Gegensatz zu *transvaalensis* hinten quernadelrissig.

Callynomes pilifer n. sp.

♂. *C. anthracino* Hell. simillimus. Niger, nitidus. Capite postice parce punctato, antice laevi, clypeo truncato; prothorace latiore quam longiore, ante medium rotundato-dilatato, lateribus ciliatis, angulis posticis rotundatis, margine antico medio leviter producto, dorso sparsim sat fortiter punctato; scutello laxe punctato; elytris sat remote punctatis, juxta latera et ante apicem pilis longis fulvis erectis sparsis ornatis, elytris singulis trisulcatis, sulcis opacis; pygidio convexo, laxe punctato. Subtus parce punctatus, punctis longe pilosis; pedibus gracilibus, tibiis anticis inermibus. — Long. 15 mm.

Singapore.

Die Art ist dem *C. anthracinus* Hell. sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch die langen abstehenden braunen Haare auf den Flügeldecken, den Brustseiten und den Bauchsegmenten.

Dasyvalgus obscurus n. sp.

♂. Niger, nitidus. Capite dense punctato, punctis griseo-setosis, clypei margine antico subsinuato; antennis nigris; prothorace longiore quam latiore, lateribus fere parallelis, levissime sinuatis, antice incurvatis, dorso aciculato, nigro- et griseo-squamoso, bicristato, ante marginem posticum fasciulis 4 nigris ornato,

crístis postice nigro-fasciculatis; scutello nigro, aciculato; elytris nigris, striatis, nigro-griseo-squamosis, juxta scutellum et in parte media squamis nonnullis flavo-griseis instructis; propygidio pygidioque dense umbilicato-punctatis, illo nigro-squamoso, postice nigro-bifasciculato, pygidio squamis griseis vestito. Subtus sparsim cinereo-squamosus; tibiis anticis 5-dentatis, dente tertio apicali-que longioribus. — Long. 5 mm.

Java or. (Kendong Geb.).

Oreovalgus sandakanus n. sp.

♀. Niger, nigro- et ferrugineo-squamosus. Capite dense ferrugineo-squamoso, fronte bifasciculata; prothorace antrorsum angustato, in parte anteriore 4-carinato, medio bituberculato, ante marginem posticum tuberculis 4 ornato, squamis omnibus ferrugineis; scutello nigro-squamulato; elytris nigris, singulis vittis 6 ferrugineis instructis, vitta secunda post medium interrupta, humeris callisque apicalibus ferrugineo-fasciculatis; propygidio nigro-squamulato, squamis nonnullis ferrugineis intermixtis, margine postico ferrugineo-bifasciculato; pygidio nigro, vittis 4 irregularibus ferrugineis ornato, apice in femina longe spinosa. Subtus dense ferrugineo-squamosus; tibiis anticis quadridentatis, dente secundo apicali-que longioribus. — Long. 5 mm.

Borneo (Sandakan). Von Herrn Prof. C. F. Baker erhalten.

Ischnovalgus sulcicollis n. sp.

I. gracili Klb. similis. Niger, nitidus. Capite dense strigillato, fronte subplanata, clypei margine antico sinuato; antennis stipite fusco, flabello nigro; prothorace longitudine parum latiore, lateribus post medium leviter sinuatis, antice incurvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, basi late rotundata, dorso medio longitudinaliter leviter sulcato et punctato, juxta latera strigillato, parce griseo-squamoso-setoso; scutello aciculato; elytris dorso deplanatis, longitudinaliter strigosis, setis squamiformibus seriatim positis ornatis, juxta scutellum dense albido-squamoso-setosis; propygidio pygidioque aciculatis et pallide squamosis. Corpore infra albo-squamoso; tibiis anticis tridentatis, dente primo minuto, secundo tertioque validis. — Long. 5,5 mm.

Africa or. Von Staudinger und Bang-Haas erhalten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [82](#)

Autor(en)/Author(s): Moser Johannes

Artikel/Article: [Neue Cetoniden-Arten. 183-187](#)