

Drei neue Cetoniden-Arten von den Philippinen. (Col.)

Von J. Moser, Ellrich.

Glycyphana rubroplagiata n. sp.

Statura *Gl. luzonicae* Mos. Nigra, supra opaca, subtus nitida, elytris maculis duabus dorsalibus antemediis rubris, macula transversa postmedia laterali maculisque nonnullis minutis albis ornatis. Capite, fronte sat remote, clypeo sat dense et fortiter punctato, antennis nigris; prothorace postice parum latiore quam longiore, ante medium attenuato; elytris striatis, interstitiis parum convexis, alternis latoribus; pygidio mediocriter crebre transversim aciculato, albo-biplagiato. Subtus pectoris medio laevi, pectoris lateribus aciculatis et griseo-setosis, processu mesosternali plano, ad apicem versus dilatato, apice late rotundato; abdomine sparsim punctato, segmentis 2.—4. macula alba laterali instructis; tibiis anticis bidentatis, tibiis posticis intus flavido-ciliatis. — Long. 17 mm.

Mindanao (Momungan). G. Boettcher leg. VIII. 1915.

Glycyphana niveopunctata n. sp.

Gl. rubroscutellari Mohn. similis. Nigra, supra opaca, subtus nitida. Capite sat dense punctato, vertice maculis duabus albis signato; antennis nigris; prothorace postice latiore quam longiore, ante medium fortiter angustato, angulis posticis rotundatis, dorso albo-quadripunctato, margine postico fascia rufo-flava, medio interrupta, ornato; scutello, apice excepto, rufo-flavo; elytris seriato-punctatis, punctis brevissime setosis, interstitiis planis, elytris singulis punctis 9 albis ornatis; pygidio aciculato, medio longitudinaliter subcarinato, juxta latera albo-maculato. Subtus medio laevi, processu mesosternali plano, brevi, lato, apice late rotundato, pectoris lateribus transversim aciculatis et sparsim setosis, abdominis lateribus aciculato-punctatis, segmentis singulis albo-quadrimaculatis; tibiis anticis bidentatis, tibiis posticis intus flavido-ciliatis. — Long. 13 mm.

Ins. Sibuyan. Prof. C. F. Baker leg.

Astraea luzonica n. sp.

Oblonga, postice paulo attenuata, supra viridis, opaca, flavo-maculata, subtus viridi-cuprea, nitida. Capite, fronte dense, clypeo sparsius fortiter punctato, frontis punctis setosis; antennis piceis; prothorace paulo longiore quam latiore, postice paulo dilatato, lateribus post medium sinuatis, antice incurvatis, angulis anticis obtusis, angulis posticis breviter rotundatis, dorso medio-

criter crebre semiannulato-punctato, lateribus maculisque duabus basalibus, interdum etiam linea brevi media postica, flavis; scutello vitta media flava ornato; clytris striatis, singulis bicostatis, costa prima postice abbreviata, macula media juxta-suturali, maculis 4 lateralibus fasciaque apicali flavis; pygidio flavo, viridi-bivittato. Subtus pectoris medio parce punctato, nitido, pectoris lateribus abdomineque densius punctatis, flavis; processu mesosternali lato, brevi, apice late rotundato, ante apicem transversim setoso; tibiis flavo-ciliatis, anticis tridentatis. — Long. 14 mm.

Luzon (Imugan). G. Boettcher leg. VI. 1916.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [83](#)

Autor(en)/Author(s): Moser Johannes

Artikel/Article: [Drei neue Cetoniden-Arten von den Philippinen. \(Col.\) 113-114](#)