

Beitrag zur Kenntnis der Melolonthiden. (Col.)

Von J. Moser, Ellrich.

XIV.

Serica (Omaladera) nigrobrunnea n. sp.

Ovalis, nigro-brunnea, opaca. Capite, fronte opaca, clypeo medio leviter convexo, subrugoso-punctato, parce piloso, margine antico reflexo, truncato, medio interdum subelevato; antennis 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali, flabello feminae stipe breviore; prothorace duplo latiore quam longiore, lateribus leviter curvatis, angulis anticis productis, acutis, angulis posticis obtusis, dorso subtiliter punctato; elytris seriatis, interstitiis paulo convexis, parce punctatis; pygidio punctis minutis instructo, margine ciliato. Subtus pectore utrinque juxta medium erecte setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis minutissime setosis, setis nonnullis juxta coxarum latera validioribus; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis nitidis, haud dilatatis, post marginem anticum et ante marginem posticum setosis; tibiis anticis bidentatis, dente tertio obsoleto. — Long. 8—9 mm.

Szetschwan: Washan.

Autoserica subrugata n. sp.

♂. *A. opaciventri* Mos. similis, differt: antennis 9-articulatis, abdomine nitido. Fusca, nitida. Capite fortiter subrugoso-punctato, antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipite paulo longiore; prothorace longitudine latiore, lateribus ciliatis, post medium leviter sinuatis, ante medium incurvatis, dorso subrugoso, sat fortiter punctato, margine antico erecte setoso; scutello dense punctato; elytris leviter sulcatis, subrugoso-punctatis, sparsissime setosis; pygidio grosse et crebre punctato, ante apicem setoso. Subtus pectoris medio setis erectis vestito, pectoris lateribus coxisque posticis fortiter punctatis, punctis setosis, juxta coxarum latera setis validis instructis; abdomine irregulariter setifero-punctato; femoribus posticis paulo dilatatis, grosse punctatis, post marginem anticum et post medium setosis; tibiis posticis parum dilatatis. — Long. 7—7,5 mm.

China: Peking.

Die Art ist der *A. opaciventris* Mos. sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch die neungliedrigen Fühler und das glänzende Abdomen. Auch mit *A. detersa* Er. hat sie große Ähnlichkeit, doch ist die Punktierung dichter und größer.

Cephaloserica longiclava n. sp.

Oblongo-ovalis, brunnea, opaca. Capite parce punctato, setis nonnullis instructo, clypeo antrorum angustato, margine antico obtuse tridentato; antennis 9-articulatis, flabello 3-articulato, maris stipite multo longiore, curvato, feminae stipite breviore; prothorace latiore quam longiore, lateribus leviter curvatis, ciliatis, angulis anticis paulo productis, parum acutis, angulis posticis paulo obtusis, breviter rotundatis, dorso sat subtiliter punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis convexis, sparsim punctis instructis; pygidio remote punctato. Subtus pectoris medio parce setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis setis minutis instructis, abdominis segmentis transversim setosis; femoribus tibiisque posticis gracilibus, femoribus posticis setosis, margine postico ante apicem sinuato; tibiis anticis bidentatis. — Long. 6—8 mm.

Luzon: Baguio.

Cephaloserica Boettcheri n. sp.

♂. Praecedenti similis, antennarum flabello maris breviore. Brunnea, opaca, prothorace obscuriore. Capite parce punctato, punctis nonnullis setosis, clypeo antrorum parum angustato, margine antico obtuse tridentato; antennis 9-articulatis, flabello maris 3-articulato, stipite paulo longiore; prothorace lateribus leviter curvatis, angulis anticis parum productis, fere rectangulis, angulis posticis obtusis, marginibus lateralibus anticoque setosis, disco setis nonnullis instructo; elytris leviter sulcatis, lateribus ciliatis; pygidio parce punctato, ante apicem piloso. Subtus pectoris medio setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis setis parvis vestitis; abdomine transversim setoso; femoribus posticis sat angustis, iridescentibus, post marginem anticum et ante marginem posticum setosis; tibiis posticis nec dilatatis nec abbreviatis; tibiis anticis bidentatis. — Long. 8 mm.

Luzon: Mt Data. G. Boettcher leg.

Euphoresia Burgeoni n. sp.

♂. *E. baliolae* Brsk. similis, antennarum flabello maris longiore. Brunnea, opaca, nigro-fusco-maculata, parce albo-squamosa. Capite, fronte parce punctata, punctis squamis parvis vestitis, medio longitudinaliter carinato, juxta oculos densius squamosa, clypeo rufo, nitido, rugoso-punctato, sparsim erecte setoso, margine antico leviter sinuato, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace postice duplo latiore quam longiore, lateribus postice fere parallelis, antice incurvatis,

angulis anticis parum acutis, angulis posticis paulo obtusis, breviter rotundatis, dorso haud dense albo-squamoso, vittis 3 longitudinalibus viridescentibus plus minusve glabris; scutello juxta latera squamulato; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, maculis nigro-viridibus instructis, sat remote punctatis, punctis squamis parvis vestitis, squamis nonnullis validioribus; pygidio squamifero-punctato. Subtus sat sparsim punctata, punctis squamosis, abdominis segmentis juxta latera transversim setosis; femoribus tibiisque posticis paulo dilatatis, his etiam abbreviatis. — Long. 5,5 mm.

Congo belge (Haut-Uélé: Molo). L. Burgeon leg.

Statt *Autoserica Bourgeoni* Deut. Ent. Zeitschr. 1916, p. 241 und *Pachnoda Bourgeoni* Deut. Ent. Zeitschr. 1924, p. 171 muß es *Autoserica Burgeoni* und *Pachnoda Burgeoni* heißen.

Hyposericamidongensis n. sp.

♂. *H. delectae* Brsk. similis, differt femoribus posticis latioribus. Fusca vel nigro-fusca, opaca. Capite, fronte parce, clypeo sat dense subrugoso-punctato, medio leviter bulboso, margine antico reflexo, subsinuato; antennis 9-articulatis, stipite rufo-flavo; flabello flavo, stipite longiore; prothorace mediocriter dense punctato, lateribus leviter curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis rotundatis, margine antico medio paulo producto; elytris seriato-punctatis, interstitiis planis, parce punctatis, ad elytrorum margines laterales versus sparsim setosis, lateribus ciliatis; pygidio subtiliter punctato. Subtus pectoris medio laevi, longitudinaliter sulcato, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis setis minutis, juxta coxarum latera setis validioribus instructis, abdominis segmentis lateraliter transversim setosis; femoribus posticis modice dilatatis, antice et postice setosis, tibiis posticis nec dilatatis nec abbreviatis. — Long. 8 mm.

Madagascar mer. or.: Midongy.

Comasericaluridosparsa n. sp.

♂. *C. sparsae* Mos. similis. Nigro-fusca, opaca, elytris lurido-maculatis. Capite parce punctato, post suturam setis nonnullis vestito, clypeo subrugoso-punctato, sparsim setoso, antrorsum perparum angustato, margine antico reflexo, levissime sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, flabello maris stipite longiore; prothorace subtiliter punctato, lateribus curvatis, angulis anticis productis, paulo acutis, angulis posticis rotundatis, dorso sparsim setoso; elytris leviter sulcatis, subtiliter punctatis, sparsissime setosis, juxta latera squamis nonnullis instructis; pygidio setifero-punctato, setis longitudine inaequalibus. Subtus

ubique parce setosa, femoribus posticis ad apicem versus angustatis, margine postico in parte apicali sinuato. — Long. 6,5 mm.

Madagascar mer. or.: Midongy.

Die Art ist der *C. sparsa* Mos. sehr ähnlich, unterscheidet sich aber leicht dadurch, daß die Hinterschenkel in der Basalhälfte nicht so stark verbreitert sind.

Comaserica pilosicollis n. sp.

C. granulipenni Frm. similis, differt antennarum flabello maris breviore, femoribus posticis angustioribus. Nigra, opaca. Capite subrugoso-punctato, parce setoso, clypeo antrorum vix parum angustato, margine antico reflexo, subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, flabello maris stipiti longitudine subaequali, flabello feminae stipite breviore; prothorace lateribus curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso mediocriter crebre punctato, punctis magnitudine inaequalibus, punctis majoribus pilosis; elytris seriatis, interstitiis fere planis, sat remote irregulariter punctatis, punctis nonnullis majoribus setosis; pygidio sparsim subtiliter punctato. Subtus parce setosa, femoribus posticis haud dilatatis, ante apicem sat profunde sinuatis. — Long. 5—6 mm.

Madagascar mer. or.: Midongy.

Die Art ist der *C. granulipennis* Frm. sehr ähnlich. Der Fühlerfänger des ♂ ist jedoch kürzer und nicht gebogen, die Hinterschenkel sind schmäler. Bei den beiden vorliegenden Exemplaren ist die Unterseite glänzend, wahrscheinlich durch Klebstoff verschmiert.

Triodonta nigripennis n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, flavo-rufa, nitida, elytris nigris. Capite dense punctato, clypeo subquadrato, antrorum paulo angustato, margine antico reflexo, sinuato, angulis rotundatis, clypei medio leviter convexo; antennis 10-articulatis, flabello maris stipite breviore; prothorace paulo latiore quam longiore, lateribus leviter curvatis, ante angulos posticos sinuatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis fere rectangulis, dorso mediocriter crebre punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, remote punctis instructis, interstitiis alternis convexioribus; pygidio dense punctato, punctis griseo-pilosis. Subtus ubique crebre pilifero-punctata, femoribus tibiisque posticis haud dilatatis, tibiis anticis tridentatis, dente primo interdum obsoleto, tarsis anticis crassis, brevibus, unguibus difformibus. — Long. 5 mm.

Congo belge: Elisabethville. Miss. Agric. XI. 1911.

Von den übrigen bisher bekannten Arten durch unbehaarte Oberseite abweichend. Die Vordertarsen jedoch in gleicher Weise verdickt mit breiter lappenförmiger Innenkralle, das Kinn gleichfalls bürstenartig kurz behaart.

Triodontata Burgeoni n. sp.

♂. Statura *T. sansibaricae* Brsk. Nigra, dense squamis angustis cinereis vestita, supra plus minusve nigro-signata, pedibus fulvis. Capite dense punctato, frontis punctis squamosis, clypei marginibus rufis, margine antico leviter sinuato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello sat parvo; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, ante angulos posticos leviter sinuatis, angulis anticis et posticis acutis, dorso vittis 4 longitudinalibus nigris, interdum interruptis, ornato, lateribus plus minusve fulvescentibus; elytris cinereis vel nigro-bifasciatis; pygidio convexo, crebre squamoso; femoribus tibiisque posticis paulo dilatatis, tibiis anticis tridentatis, tarsis anticis crassis et brevibus, unguibus anticis abnormibus. — Long. 5 mm.

Haut Uelé: Aba. L. Burgeon leg.

Trochalus fulvicornis n. sp.

♂. *T. pilulae* Klug. similis, supra densius punctatus. Nitidus, supra niger, subtus nigro-fuscus, antennis fulvis. Capite mediocriter dense punctato, clypeo medio breviter longitudinaliter carinato, post marginem anticum coarctato, margine antico tridentato; antennarum flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace postice duplo latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis fere rectangulis, parum productis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso dense sat subtiliter punctato; elytris indistincte seriato-punctatis, intersticiis planis, crebre punctis instructis; pygidio mediocriter dense punctato. Corpore infra nitido, pectore juxta latera opaco, pectore abdomineque remote punctatis, femoribus posticis modice dilatatis, tibiis posticis sat latis et abbreviatis, tibiis anticis bidentatis. — Long. 6 mm.

Congo belge: Stanleyville à Kilo. L. Burgeon leg.

Astaena ruficollis n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, rufo-flava, subopaca, capite, prothorace scutelloque rufis. Capite sat remote punctato, clypeo antrorsum paulo angustato, marginibus elevatis, margine antico subsinuato, angulis anticis breviter rotundatis, clypei basi setis nonnullis vestita; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipite parum breviore; prothorace duplo latiore quam longiore, lateribus

curvatis, setosis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, rotundatis, margine antico medio leviter producto, dorso subtiliter punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis parum convexis, remote punctis instructis, elytrorum marginibus laterilibus setosis; pygidio mediocriter crebre punctato, ante apicem piloso. Subtus pectore utrinque juxta medium setis erectis instructo, abdominis segmentis transversim setosis, femoribus posticis ad apicem versus angustatis, antice et postice setis validis vestitis, tibiis posticis ad apicem versus dilatatis. — Long. 6,5 mm.

Argentina: Santiago del Estero.

Apogonia angusta n. sp.

Oblonga, angusta, nigro-viridis, nitida, pedibus brunneoscentibus. Capite mediocriter dense punctato, clypeo rufescente, margine antico sinuato, angulis anticis rotundatis; prothorace sat laxe punctato, lateribus curvatis, angulis anticis paulo productis, fere rectangulis, angulis posticis obtusis, subrotundatis; scutello laevi; elytris sat fortiter haud crebre punctatis, costis fere laevibus, planis, indistinctis; pygidio grosse punctato, punctis pilosis. Subtus medio parce, juxta latera densius punctata, punctis griseo-setosis; abdominis lateribus haud carinatis, tibiis anticis tridentatis. — Long. 7 mm.

Luzon: Baguio.

Crepischiza Schoutedeni n. sp.

C. usambarae Brsk. similis, differt minor, prothorace postice fortius angustato. Oblonga, fulva, nitida. Capite, fronte subrugoso-punctata, clypeo maris antrorsum parum angustato, margine antico reflexo, subsinuato, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello in utroque sexu stipite breviore; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso mediocriter dense punctato; scutello medio laevi; elytris haud costatis, subrugoso-punctatis, punctis minutissime setosis; pygidio parce annulato-punctato. Subtus medio remote, ad latera versus densius punctata, punctis squamoso-setosis; tibiis anticis bidentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo breviore, unguibus apice fissis, dente apicali multo longiore. — Long. 13 mm.

Congo belge: Haut Uelé (Moto). L. Burgeon leg.

Holotrichia luzonica n. sp.

♂. Ex affinitate *H. sumatrensis* Sharp. Rufo-nigra, opaca. Capite sat remote punctato, parce flavo-piloso, fronte opaca, clypeo margine antico sat profunde sinuato, angulis anticis rotundatis;

antennarum flabello maris stipite paulo breviore; prothorace duplo latiore quam longiore, lateribus ciliatis, subtiliter crenulatis, angulis anticis productis, rectangulis, angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso subtiliter punctato, parce piloso; elytris mediocriter crebre punctatis, remote pilis vestitis; pygidio umbilicato-punctato, punctis breviter setosis. Subtus pectore flavo-griseo-piloso, abdomine opaco, parce piloso-setoso; unguibus dente medio recto armatis. — Long. 23 mm.

Luzon: St. Thomas.

Die Art steht der *H. sumatrensis* Sharp. nahe, ist jedoch dunkler gefärbt und die Flügeldecken sind namentlich in der Nähe der Naht und am Seitenrande behaart.

Brahmina tuberculifrons n. sp.

Oblonga, postice paulo ampliata, rufo-fusca, nitida, pectore flavo-villoso, pedibus rufo-flavis. Capite fortiter subrugoso-punctato, fronte bituberculata tuberculis plus minusve laevibus, clypeo margine antico reflexo, truncato, angulis anticis rotundatis, lateribus parallelis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello in utroque sexu stipite breviore; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus leviter crenulatis, ciliatis, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso mediocriter crebre punctato, medio interdum subcarinato; scutello punctis nonnullis instructo; elytris fortiter subrugoso-punctatis, punctis breviter setosis, elytris singulis 4-costatis, costis laevioribus; pygidio alutaceo, subrugoso-punctato, ante apicem piloso. Subtus, pectore dense flavidovilloso, abdomine medio parce, ad latera versus densius setifero-punctato; tibiis anticis tridentatis, unguibus apice fissis. — Long. 12 mm.

Kulu, Kashmir. Rost leg.

Philochlaenia rufina n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, rufa, nitida, parce griseo-setosa. Capite subrugoso-punctato, punctis setosis, clypeo margine antico reflexo, truncato, angulis late rotundatis; antennis 10-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso sat remote, ad marginem anticum versus paulo densius punctato, punctis setosis; scutello laxe setifero-punctato; elytris singulis leviter 4-costatis, mediocriter crebre punctatis, sparsim setis adpressis instructis; pygidio annulato-punctato, punctis setis erectis vestitis. Subtus pectore flavo-villoso, ab domine haud dense umbilicato-punctato, punctis pilosis; tibiis

anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore.
— Long. 11 mm.

Venezuela.

Philoclaenia quinqueflabellata n. sp.

♂. *Ph. pentaphyllae* Mos. similis, differt paulo minor, antennis 10-articulatis, clypeo haud sinuato. Nigro-fusca, nitida, metallescens. Capite subrugoso-punctato, punctis griseo-setosis, clypeo antrorsum fortiter angustato, apice rotundato; antennis fuscis, flabello maris 5-articulato stipiti longitudine aequali; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso medio sat remote, ad latera versus densius punctato, punctis setis griseis vestitis; scutello parce setifero-punctato; elytris leviter rugosis, indistincte costatis, maculis setosis ornatis; pygidio crebre umbilicato-punctato, punctis setis adpressis instructis. Subtus ubique setifero-punctata, tibiis anticis bidentatis dente apicali elongato, articulis duabus primis tarsorum posticorum longitudine subaequalibus. — Long. 9 mm.

Columbia.

Macrodactylus obscuritarsis n. sp.

♂. *M. flavigorni* Burm. similis, praecipue differt tarsis nigris vel nigro-fuscis. Fulvus, supra dense flavo-griseus-, subtus griseo-squamatus, tibiis in parte apicali nigrescentibus. Clypeo antrorsum angustato, apice vix subsinuato; prothorace longiore quam latiore, ante medium angulatim dilatato, lateribus postice sinuatis; abdome maris utrinque juxta medium setis validis instructo, tarsis setis cinereis ornatis. — Long. 7,5—8 mm.

Paraguay: Asuncion.

Die Art, von der einige männliche Exemplare vorliegen, ist dem *M. flavigornis* Brm. sehr ähnlich, doch sind die Tarsen schwarz oder schwarzbraun, die Forcepsparameren sind vor ihrem Ende am Außenrande gewinkelt, bei *flavigornis* gerundet.

Macrodactylus meridanus n. sp.

♂. Statura *M. Brenskei* Mos. Niger, nitidus, supra sparsissime griseo-setosus. Capite subrugoso-punctato, clypei margine antico truncato; antennis stipite rufo, flabello nigro; prothorace postice parum angustiore quam longiore, lateribus medio fortiter rotundato-dilatatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso medio sparsissime, juxta latera paulo densius punctato, punctis setosis; scutello subtiliter setifero-punctato; elytris coriaceis, longitudinaliter seriatis, intersticiis paulo convexis, sparsim setosis; pygidio convexo, seti-

fero-punctato. Subtus alutaceus, sat remote punctatus, punctis pilosis, abdomine utrinque juxta medium punctis validioribus, erecte setosis, instructo. — Long. 7 mm.

♀. A mare differt: clypeo, elytris pedipusque fulvis, prothorace latiore et laeviore, abdomine convexo, haud erecte setoso.

Venezuela: Merida.

Rhinaspis nitidula Mos.,

beschrieben Stettiner ent. Zeit. 1921, p. 170, gehört ebenso wie *Philoclaenia corrientensis* Mos., Stettiner ent. Zeit. 1919, p. 19, in die Gattung *Plectris*.

Barybas aenescens n. sp.

♂. Oblongus, sat crassus, convexus, niger, aeneo-micans, irregulariter albido-squamosus. Capite dense punctato, punctis squamosis, clypeo antrosum angustato, margine antico truncato, subsinuato, angulis rotundatis; prothorace fere duplo latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, serratis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso dense subrugoso-punctato, punctis squamosis, squamis majoribus maculas irregulares formantibus; scutello squamifero-punctato; elytris irregulariter punctatis, punctis squamosis, squamis magnitudine inaequalibus; pygidio dense ocellato-punctato, punctis squamis vestitis. Corpore infra medio parce, juxta latera densius squamulato; tibiis anticis tridentatis sed dente primo minuto, tarsis anticis maris articulo primo intus haud spinoso. — Long. 6 mm.

Cayenne (Kourou).

Plectris argentina n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, fusca, nitida, griseo-setosa. Capite aciculato-punctato, punctis setosis, clypeo antrosum angustato, margine antico reflexo, subsinuato, angulis rotundatis; antennis 10-articulatis, flabello maris stipite parum breviore; prothorace latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat crebre aciculato-punctato, punctis setis adpressis vestitis; scutello setifero-punctato; elytris leviter costatis, subrugosis, sat remote setosis, setis adpressis; pygidio ocellato-punctato, punctis setis instructis, setis ad pygidii medium versus directis. Subtus pectore flavidopiloso, abdomine crebre punctis setosis obtecto; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo plus duplo longiore. — Long. 13 mm.

Argentina: San Ignacio.

Manopus simillimus n. sp.

♂. *M. biguttato* Cast. simillimus, differt antennis distincte 9-articulatis. Oblongus, luteo-fuscus, nitidus, nigro-maculatus, capite prothoraceque aenescens. Capite subrugoso-punctato, vertice griseo-squamoso-setoso, clypeo antrosum angustato, margine antico reflexo, sinuato; antennae rufo-flavas, 9-articulatis, stipitis articulis 3.—5. elongatis, flabello stipite breviore; prothorace lato quan longiore, medio angulatum dilatato, lateribus postice sinuatis, dorso inaequaliter subrugoso-punctato, punctis griseo-setosis; scutello setifero-punctato; elytris alutaceis, subrugosis, fusco-marmoratis, griseo-setosis, setis longitudine inaequalibus; pygidio sparsim punctato, punctis setis instructis, pygidii medio laevi. Subtus setifero-punctatus, pedibus gracilibus, tibiis anticis tridentatis. — Long. 11 mm.

Columbia: Tolima.

Die Art ist dem *M. biguttatus* Cast. täuschend ähnlich, doch sind die Fühler deutlich neungliedrig, während *biguttatus* nur achtgliedrige Fühler hat. Die Forcepsparameren sind am Grunde viel weniger verbreitert als bei *biguttatus*.

Myloxena vicina (Bruch i. l.) n. sp.

Magnitudine *M. vestitae* Berg. Nigro-fusca, nitida, griseo-pilosa, pedibus rufo-fuscis. Capite dense subrugoso-punctato, punctis, clypei, parte anteriore excepto, longe griseo-pilosus, clypeo parabolico, margine leviter reflexo; antennae rufo-fuscis, 9-articulatis, flabello 3-articulato, in mare stipite longiore, in femina stipiti longitudine aequali; prothorace pilis perlongis dense vestito, pilis scutellum tegentibus; elytris postice paulo ampliatis, minus crebre et longe pilosis; pygidii pilis adpressis, pilis nonnullis, praecipue juxta margines erectis. Subtus pectore, coxis posticis femoribusque longe villosis, abdome tarsisque sparsius pilosis; tibiis anticis bidentatis, unguibus tarsorum anticorum in dimidia parte basali dilatatis et dente submedio armatis, unguibus mediis et posticis gracilibus, apice fissis. — Long. 10—13 mm.

Argentina: Bañado, Tucuman V. 1921; Cerro Colorado, Weiser leg.

Die Art ist nach Mitteilung des Herrn Prof. Dr. Bruch der *M. vestita* Berg. ähnlich, unterscheidet sich aber schon durch die dunklere Färbung und durch die Behaarung der Rippen der Flügeldecken.

Pentacoryna n. gen.

Clypeus paulo longius quam latius, margine antico semi-circulari. Antennae maris 9-articulatae, flabellum 5-articulatum,

stipitis articulus quartus elongatus, basi setosus; prothorax transversus, lateribus angulatim rotundatis; scutellum cordiforme; elytra singula anguste tricostata; pedes sat graciles, tibiae anticae fortiter acute tridentatae; unguiculi apice fissi.

Die Gattung gehört zu den *Pachydeminen*, hat eine senkrechte gerundete und beborstete Oberlippe und schlanke Lippentaster. Der Clypeus ist etwas länger als breit, sein Vorderrand ist halbkreisförmig. Die Fühler des ♂ sind neungliedrig mit schlankem viergliedrigen Fächer. Das letzte Glied des Fühlerstieles ist verlängert, an der Basis beborstet. Die Krallen der Füße sind am Ende gespalten.

Pentacoryna Bruchi n. sp.

♂. Fusca, nitida, elytris ferrugineis, pygidio nigro. Capite, fronte rugoso-punctata, erecte, brunneo-pilosa, clypeo longiore quam latiore, lateribus fere parallelis, apice semicirculari-rotundato, postice crebre, antice laxius rugoso-punctato punctis pilis instructis; antennis flavis, 9-articulatis, flabello maris 5-articulato, leviter curvato, stipiti longitudine aequali, stipitis articulo quarto elongato, basi setosa; prothorace basi dimidia parte latiore quam longiore, paulo ante medium angulatim dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso mediocriter crebre punctato, punctis erecte pilosis, prothoracis basi longe ciliata; scutello sparsim punctato; elytris sutura et utrinque costis tribus angustis paulo elevatis, interstitiis leviter rugosis; pygidio sparsissime punctato. Subtus pectore dense flavo-villoso, abdome pilifero-punctato; tibiis anticis acute tridentatis, unguiculis apice fissis, dente apicali breviore. — Long. 10—12 mm.

Argentina: Chiquimil.

Eine neue *Myoderma*-Art. (Col. Cet.)

Von J. Moser, Ellrich.

Myoderma nigricollis n. sp.

M. rufipenni Gestro simillima, differt: clypeo antrorsum fortius dilatato, prothoracis lateribus post angulos anticos sinuatis, elytris multo laxius punctatis et pilosis, costis omnibus aequaliter elevatis; pygidio rufo, corpore infra minus dense et longe piloso. — Long. 16 mm.

Africa or: Nakuro.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [87](#)

Autor(en)/Author(s): Moser Johannes

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Melolonthiden. \(Col.\)](#)
[198-208](#)