# Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera Von O. Karl, Stolp i. Pom.

(Fortsetzung.)

Teuchophorus Lw.

monocanthus Lw., 6-7, Stolp: Ritzow, Kl.-Strellin.

pectinifer Kow., 7-8, Stolp: Horster Teiche, auf pfützenreichen Waldwegen, massenhaft.

spinigerellus Zett., 6-8, gemein auf schlammigem Sumpfboden.

Telmaturgus Mik.

tumidulus Radd., 6-8, Stolp: Stolpewiesen, stellenweise häufig.

Anepsiomyja Bezzi.

flaviventris Meig., 6-8, Stolp: Stolpewiesen, Kl.-Strellin.

Micromorphus Mik.

albipes Zett., 6-7, Stolp: Waldkatze, Kublitz (Schwarzmühle), Stolpmünde. (Die Art wurde von mir als Oligochaetus paludosus neu beschrieben.)

Chrysotimus Lw.

concinnus Zett., 7, Stolp Horster Teiche, Stolpmünde.

Lamprochromus Mik.

elegans Meig., 6-7, Stolpmünde; Stettin: Oderwiesen (Schmidt).

Xanthochlorus Lw.

ornatus Hal., 6-7, Stolp: Waldkatze, Arnshagen, Stolpmünde; Rügenwalde; Stettin: Sandsee, Carpin; Swinemünde.

tenellus Wied., 6-7, Stolp Kl.-Strellin, Stolpmunde; Stettin: Gartzer Schrey, Sandsee, Westendsee, Bachmühlen; Greifswald.

Sciopodinae.

Sciopus Zell.

albifrons Meig., 6-8, Stolp: Waldkatze, Kl.-Silkow; Neustettin; Stettin: Westendsee, Bachmühlen, Wolfsschlucht bei Kückenmühle.

contristans Wied., 6-7, Stolp; Rügenwalde; Stettin: Lindenhof; Zarnglaff; Gartz.

lobipes Meig., 7, Stolp: St. Georg; Stettin: Sandsee.

longulus Fll. (syn. lugens Meig.), 6-7, Stolp: Waldkatze, Ritzow, Ulrichsfelde, Kl.-Strellin; Stettin: Finkenwalde, Buchheide, Wolfsschlucht bei Kückenmühle, Bachmühlen; Gartz; Swinemünde; Greifswald.

maritimus Beck., 7, bei Stolpmünde im Dünengelände.

nervosus Lehm., 6, Stolp: Waldkatze; Stettin: Gartzer Schrey.

platypterus Fbr., 6-8, Stolp: Waldkatze, Arnshagen, Stolpmünde; Rügenwalde; Stettin: Gartzer Schrey, Lindenhof.

wiedemanni Fll., 6-8, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde; Rügenwalde; Stettin: Buchheide, Sandsee, Bachmühlen.

# Musidoridae (Lonchopteridae). [St. E. Z. 1911, 360.]

Die Fliegen lieben schattige, feuchte Orte, und man findet sie hier zwischen Gräsern und niedrigen Gewächsen. Die Larven leben unter faulendem Laube und Spülicht an den Ufern von Gewässern.

Musidora Meig. (Lonchoptera Meig.).

fallax Meig., 6, Kl.-Strellin, Kreis Stolp.

furcata Fll., 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet; Alt-Belz b. Köslin.

v. rivalis Meig., 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet.

v. lacustris Zett., 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet; Stettin.

v. cinerella Zett., 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet.

lutea Pz., 4-10, Stolp: 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet; Stettin.

v. flavicauda Meig., 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet; Stettin.

v. trilineata Zett., 4-10, Stolp: Waldkatze, Ritzow, Veddin; Stettin.

v. palustris Meig., 4-10, Stolp: Kl.-Strellin.

v. cinerea de Meij., 4-10, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin.

scutellata Meig., 11, Stolp: Menkenbruch.

tristis Meig., 5-9, Stolp: Kl.-Strellin, Arnshagen.

# Phoridae. [Stett. Ent. Ztg. 1922, 173-175.]

Die "Rennfliegen" findet man auf Blättern und Blüten, besonders auf Dolden. Oft sieht man sie auch an Fenstern, wo sie ebenso wie draußen schnell und ruckweise laufen. Die Larven leben von sich zersetzenden pflanzlichen und tierischen Stoffen. Man findet sie daher besonders an Aas, Dünger und Kot und in den Gehäusen toter Schnecken. Manche sind Schmarotzer von Insektenlarven. So erzeugen Hypocera-Arten in den Bienenstöcken die Faulbrut.

Aneurina Lioy (syn. Chaetoneurophora Mall.).

curvinervis Beck., 3-5, Stolp: Waldkatze, durch Erdfänge an toten Vögeln; Lauenburg (Dr. Speiser); Alt-Belz b. Köslin.

thoracia Meig., 5-9, Stolp: Waldkatze, Ulrichsfelde, Stolpmünde, Loitz.

unispinosa Zett. (syn. fennica Beck.), 3-5, Stolp: Waldkatze, durch Erdfänge an toten Vögeln.

urbana Meig., 5-6, Stolp: Waldkatze, Reitz, Veddin.

Chaetopleurophora Schmitz.

erythronota Strbl., 17.7.14, Stettin: Finkenwalde (Schroeder).

Paraspiniphora Mall.

maculata Meig., 5-9, Stolp: Waldkatze.

Triphleba Rond.

hyalinata Meig. (syn. perennis Meig.), 3-4, Stolp: Waldkatze; Stettin: Warsow, Westend (Hanau).

intermedia Mall., 4-5, Stolp: Waldkatze.

lugubris Meig., 3-9, Stolp: Waldkatze; Stettin: Dr. Enderlein, aus dem Nest von Vespa germanica.

opaca Meig., 2-4, Stolp: Waldkatze; Stettin: Westendsee (Schmidt).

trinervis Beck., 11, Stolp: Waldkatze.

Diploneura Lioy.

abdominalis Fll., Rügenwalde (Riedel).

concinna Meig., 6-9, Stolp: Waldkatze; Stettin: Pulvermühle, Podejuch, Gotzlow; Bandekow (Kreis Regenwalde).

crassicornis Meig., 6-10, Stolp: Arnshagen, Potäne. florea Fbr., 21.5.20, 1♀ bei Stolp; Rügenwalde.

unispinalis Schmitz, 6-8, Stolp: Waldkatze, Veddin, Freichow, Stolpmünde.

Phora Latr. (syn. Trineura Schin.).

artifrons Schmitz, 4, Stolp: Waldkatze.

aterrima Fbr., 5-7, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde; Stettin.

holosericea Schmitz, 5-8, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin; Plathe (Speiser); Wollin (Hanau).

schineri Beck., 4-5, Stolp: Waldkatze, Reitz, Veddin.

tincta Schmitz, 5-8, Stolp: Waldkatze; Stettin: Buchheide (Hanau); Freest, Kr. Lauenburg (Speiser).

Hypocera Lioy.

subsultans L. (syn. mordellaria Fll.), 6-7, Stolp: Waldkatze, Arnshagen, Stolpmünde.

Borophaga End.

femorata Meig. (syn. flavimana Meig.), 4-9, Stolp Waldkatze; Gr.-Wierschutzin, Kr. Lauenburg (Enderlein); Prütznow, Kr. Regenwalde (Speiser); Stettin: Warsow.

carinifrons Zett., 8, Stolp: Waldkatze, Waldkater, Kl.-Strellin,

Stolpmünde.

incrassata Meig., 8, Stolp: Waldkatze, Waldkater, Kl.-Strellin, Stolpmünde; Stettin: Warsow.

Conicera Meig.

atra Meig. (syn. dauci Meig.), 5-6, Štolp: Waldkatze; Stettin: Hökendorf, Sandsee, Langenberg, Wolfshorst.

pauxilla Schmitz, 4. 6. 12, Gr.-Raddow, Kr. Regenwalde (Speiser). similis Hal., 5, Labes (Speiser).

Gymnophora Mcq.

arcuata Meig., 6-8, Stolp: Waldkatze, Ulrichsfelde, Kl.-Strellin, Loitz; Stettin: Buchheide (Hanau).

nigripennis Schmitz, 15.7 13,  $1 \circ in der Loitz$ . quartomollis Schmitz, 16.7.24, 1 or bei Veddin.

## Megaselia Rond.

Untergattung Aphiochaeta Brues.

aequalis Wood., 4-5, Stettin (Hanau), Warnowsee (Enderlein), Gotzlow (Speiser).

campestris Wood., 1.7.24, Stolp: Stolpmunde; Stettin: Sandsee

(Schmidt).

ciliata Zett., 3-4, Stolp: Reitz; Stettin: Eckerberg (Hanau), Gotzlow (Speiser); Lessentiner Mühle, Kr. Regenwalde (Speiser).

coaequalis Schmitz, 20. 4. 13, Stettin: Lübsche Mühle, aus Weidenmulm (Hanau).

cuspidata Schmitz, 11.5.07, Stettin: Westendsee (Schmidt).

flavicoxa Zett., 26. 8. 24, Stolp: Waldkatze.

fumata Mall., 16.4.11, Stettin: Colower Spitze (Enderlein).

meconicera Speis. (syn. albipennis Wood.), 27.10.20, Stargard (Speiser).

obscuripennis Wood., 25. 9. 21, Stettin: Gotzlow (Speiser). pectoralis Wood., 22. 5. 10, Stettin: Langenberg, Wolfshorst (Enderlein).

pleuralis Wood., 8-9, Stolp Waldkatze; Stettin: Gotzlow

(Speiser).

producta Schmitz, 5, Stettin: Hökendorf, Sandsee (Schmidt).

projecta Beck., 10.6.10, Stettin: Lindenhof (Schmidt).

pumila Meig. (syn. atripes Brues), 4-8, Stolp: Waldkatze, Veddin; Stettin: Buchheide (Enderlein).

pusilla Meig. (syn. clavipes Wood.), 6-9, Stettin: Messenthin (Enderlein), Gotzlow (Speiser), Gr.-Ziegenort (Enderlein); Labes (Speiser).

rufa Wood., 9.7. 22, Labes (Speiser).

variana Schmitz (syn. variabilis Wood.), 5-10, Stettin: Gotzlow (Speiser); Lessenthiner Mühle und Mittelhagen, Kr. Regenwalde (Speiser).

woodi Lundbk., 10, Stolp: Waldkatze.

Untergattung Megaselia s. str.

albicaudata Wood., 2, Stettin (Hanau).

analis Lundbk., 11.5.22, Stolp Waldkatze.

angusta Wood., 4-7, Stolp: Waldkatze; Freest, Kr. Lauenburg (Speiser).

bovista Gimm. (syn. cinerella Lundbk.), 25. 9. 21, Stettin: Gotzlow (Speiser).

brevicostalis Wood., 5. 4. 25, Stolp: Waldkatze.

flava Fll., 20. 7. 20, Freest, Kr. Lauenburg (Speiser).

halterata Wood., 29.5.05, Stettin (Schmidt).

lutea Meig., 6-7, Stolp: Waldkatze, Freichow, Stolpmünde; Wierschutzin, Kr. Lauenburg (Enderlein); Freest (Kr. Lauenburg) (Speiser); Rügenwalde; Neustettin, aus alten Gallen von Saperda populnea (Riedel).

minor Zett., 22.5.10, Stettin: Langenberg, Wolfshorst (Ender-

lein).

picta Lehm., 6-7, Stolp: Stolpewiesen, Veddin.

plurispinosula Zett. (syn. giraudii Egg.), 5-9, Stolp: Waldkatze; Stettin: Hökendorf (Schmidt), Gotzlow (Speiser); Maduesee (Enderlein).

propingua Wood., 8.5.12, Labes (Speiser).

pulicaria Fall., 5-10, Stolp: Waldkatze, Stettin: Wussower Försterei (Enderlein), Gotzlow (Speiser); Mittelhagen, Kr. Regenwalde (Speiser).

rata Wood., 5-8, Stettin: Westendsee, Hökendorf (Schmidt),

Stettin (Enderlein); Lauenburg (Speiser).

rubricornis Schmitz, 22.7 94, Usedom (Lichtwardt).

ruficornis Meig., 7.6.07, Stettin: Westendsee (Schmidt).

rufipes Meig., 3-9, allenthalben gemein, besonders auch in Gebäuden an Fenstern.

Phalacrotophora End.

fasciata Fll., 7, Labes (Speiser); Stettin: Anlagen, aus Coccinellen-Larven (Noack).

> Clythiidae (Platypezidae). [St. E. Z. 1912, 185; 1922, 91.]

Die Fliegen lieben beschattete Blätter niedriger Sträucher. Die Männchen einiger Arten schweben auch mit herabhängenden Beinen in der Luft und belustigen sich in kleinen Schwärmen. Die Larven leben in Pilzen.

Opetia Meig.

nigra Meig., 5-9, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Stolpmünde.

Calomyia Meig.

amoena Meig., 6-8, Stolp: Waldkatze, Loitz, Kl.-Strellin, Stolpmünde; Stettin: Warsow.

speciosa Meig., 6-7, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde; Rügenwalde (Riedel); Wollin.

Agathomyia Verr.

antennata Zett., 5-6, Stolp.

zetterstedti (Whlbg.) Zett., 23. 9. 13, 1♀ in der Waldkatze bei Stolp.

Clythia Meig. (Platypeza Meig.).

atra Meig., 6-8, Stolp; Stolpmünde.

consobrina Zett., 9, Stolp: Reitz.

furcata Fll., 28. 9. 97, 1 o bei Rügenwalde von Riedel.

modesta Zett., 9, Stolp: Zaun an der Lachsschleuse, Wiesenrandgebüsch neben dem Walkmühlenfriedhof.

picta Meig., 9, Stolp: Wiesenrandgebüsch neben dem Walkmühlenfriedhof.

rufa Meig., 9, mit der vorigen zusammen.

## Dorylaidae (Pipunculidae).[St. E. Z. 1922, 99-100.]

Die Augenfliegen sind gewandte Schweber. Man findet sie auf den Blättern niedriger Pflanzen und Büsche. Die Larven leben parasitisch im Hinterleibe von Homopteren.

Dorylas Meig.

ater Meig., 5-7, Stolp: Waldkatze, Loitz, Kl.-Strellin, Arnshagen, Stolpmünde; Rügenwalde; Alt-Belz b. Köslin; Gartz.

campestris Latr., 6, Stolp: Stolpmünde.

coloratus Beck., 5-7, Stolp: Waldkatze, Veddin, Arnshagen.

flavipes Meig., 6-8, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Arnshagen. fuscipes Zett., 5-8, Stolp: Waldkatze, Reitz, Loitz, Kl.-Strellin, Arnshagen.

fusculus Zett., 6-9, Stolp: Waldkatze, Schwuchow; Rügenwalde. geniculatus Meig., 7-10, Stolp: Waldkatze, Ulrichsfelde, Veddin; Gartz.

haemorrhoidalis Zett., Stolp: Waldkatze, Reitz, Stolpmünde. holosericeus Beck., 6-7, Stolp: Ritzow, Loitz, Kl.-Strellin. maculatus Walk., 3. 8. 21, 1 \( \times\) bei Kl.-Strellin, Kr. Stolp. pratorum Fll., 6, Stolp: Waldkatze, Veddin.

pulchripes Thoms., 7.6.14, 19 in der Loitz, Stolper Stadtforst. rufipes Meig., 5-6, Stolp: Waldkatze, Veddin; Gartz.

semifumosus Kow., 6-10, Stolp: Waldkatze, Ulrichsfelde. semimaculatus Beck., 5-7, Stolp: Waldkatze, Reitz.

silvaticus Beck., 5-8, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Ritzow, Stolpmünde.

thomsoni Beck., 5-7, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin; Gartz. terminalis Thoms., 5-6, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Loitz. unicolor Zett., Greifswald (Dahlbom).

xanthocerus Kow., 3.7. 32, 1 Pärchen im Plassower Walde bei Stolp. zonatus Zett., 6-7, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Arnshagen,

Stolpmunde, Freichow; Greifswald.

## Chalarus Walk.

holosericeus Meig., 5-8, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde. spurius Fll., 5-8, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde, Loitz.

#### Stettiner Entomologische Zeitung. 96. 1935.

#### Verallia Mik.

aucta Fll., 6-7, Stolp: Waldkatze, Veddin, Stolpmünde.

pilosa Zett., 5-6, Stolp: Waldkater, Waldkatze, Reitz, Arnshagen,

Wusterwitzer Moor.

villosa v. Ros., 5, Stolp: Reitz.

## Syrphidae.

[St. E. Z. 1909, 355-367; 1910, 383-385; 1911, 344-348; 1912, 181-183; 1913, 158-159; 1922, 89.]

Die "Schwebfliegen" gehören zu den schönsten und auffälligsten Erscheinungen unserer Insektenwelt, und es gibt wohl kaum einen Fliegensammler, der sich nicht zunächst in erster Linie mit ihnen beschäftigt hätte. Sie sind Lichtinsekten. Oft findet man die Weibchen auf besonnten Blättern, während die Männchen an sonnigen Stellen in der Nachbarschaft schweben. Die meisten sind ausgesprochene Blumeninsekten, Nektarsauger und Pollenfresser. Einzelne Arten findet man am ausfließenden Saft von Bäumen, an zuckerartigen Ausscheidungen von Blattläusen oder an Ähren von Gräsern. Die Entwicklung der Larven ist sehr wechselnd und soll bei den Gattungen besonders erörtert werden.

#### Chilosiinae.

## Pipiza Fll.

Lebensweise wie bei den beiden folgenden Gattungen, die Fliegen auf Blüten und Blättern, die Larven unter Blattläusen. bimaculata Meig., 5-6, Stolp: Waldkatze, Gr.-Strellin, Veddin;

Greifswald.

fasciata Meig., von Triepke in Pommern gefangen.

festiva Meig., 6-7, Stettin: Julo, Buchheide; Heidebrink.

luctuosa Mcq., 31.5.08, 1  $\circ$  am Julo bei Stettin von Schroeder gefangen.

lugubris Fbr., 5-8, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Stolpmünde;

Stettin: Finkenwalde.

noctiluca L., 5-9, Stolp: Waldkatze, Loitz, Stolpmünde; Stettin: Julo, Buchheide.

quadrimaculata Pz., 5-8, Stolp: Waldkatze; Rügenwalde; Alt-Belz bei Köslin; Stettin: Finkenwalde.

signata Meig., 11.6.08, 1 \Q auf dem Gartzer Schrey bei Stettin von Schroeder gefangen.

## Heringia Rd. (Pipizella Rd.).

flavitarsis Meig., 6-7, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Reitz; Stettin.

heringi Zett., 5-8, Stettin: Julo (Schroeder); Rügen (Dr. Ketel). virens Fbr., 5-8, überall verbreitet und häufiger.

## Cnemodon Egg.

vitripennis Meig., 4-6, Stolp: Waldkatze, Loitz, Reitz, Veddin.

## Triglyphus Lw.

primus Lw., 5-8, Stolp: Waldkatze; Stettin: Gartzer Schrey. Auf Blüten.

## Psilota Meig.

anthracina Meig., 5-7, Stolp: Waldkatze, Veddin, Loitz, Kl.-Strellin, Steinwald, Freichow.

#### Orthoneura Mcq.

Die Arten dieser und der nächsten Gattung findet man vorzugsweise auf feuchten Wiesen auf Blättern und Blüten, besonders auf Ranunculaceen und Umbelliferen.

elegans Meig., 6-7, Stolp; Patzig, Kreis Neustettin; Gartz a. d. O. (Triepke); Stettin: Finkenwalde, Zabelsdorf.

frontalis Lw., 7, Stolp: Stolpewiesen, Kl.-Strellin.

geniculata Meig., 4-7, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Veddin; Stettin: Julo; Greifswald.

intermedia Lundb., 6-7, Stolp: Stolpewiesen, Kl.-Strellin. nobilis Fll., 6-8, Stolp: Waldkatze, Loitz, Kl.-Strellin, Veddin; Stettin: Julo, Nemitz.

## Liogaster Rd.

metallina Fbr., 5-7, Stolp: Reitz, Loitz, Kl.-Strellin; Alt-Belz bei Köslin; Stettin: Glambecksee, Julo; Eldena.

splendida Meig., 6-8, Stolp: Loitz; Stettin: Julo; Greifswald.

#### Chrysogaster Meig.

Die Fliegen findet man wie die Arten der beiden vorigen Gattung auf Blättern und Blüten. Die Larven wurden im Schlamm von Wassergräben gefunden.

brevicornis Lw., 19.5.10, 1 \( \rightarrow \) in der Buchheide bei Stettin

(Schröder).

chalybeata Meig., 5-8, Stolp: Waldkatze, Loitz; Lauenburg; Patzig, Kr. Neustettin; Stettin: Nemitz.

macquarti Lw., 5-7, Stolp: Stolpewiesen, Kl.-Strellin; Stettin: Julo.

solstitialis Fll., 6-8, auf Blüten von Doldengewächsen, allgemein verbreitet und häufig.

splendens Meig., 6, Stolp: Kl.-Strellin. viduata L., 5-7, Stolp: Stolpewiesen, Reitz, Kl.-Strellin; Alt-Belz bei Köslin; Stettin: Julo, Finkenwalde; Greifswald (Eldena).

### Chilosia Meig.

Die Fliegen finden sich auf sumpfigen Wiesen, auf besonnten Blättern. Sie besuchen gern die Blüten von Weiden, Hahnenfußgewächsen, Doldengewächsen und Korbblütlern. Die Larven entwickeln sich in Pflanzen.

albipila Meig., 4-5, Stolp: Waldkatze, Stolpewiesen, Veddin, auf

Weidenblüten, nicht selten; Rügenwalde; Stettin: Julo.

albitarsis Meig., 5-6, in Laubwaldgebieten, stellenweise häufig. antiqua Meig., 5-6, Stolp: Kl.-Strellin, Gr.-Strellin; Rügenwalde. bergenstammi Beck., 7, 1 3 am Knieperstrand bei Stralsund von

Dr. Ketel gefangen.

canicularis Pz., 9. 8. 22, 2 ♀ bei Stolp.

carbonaria Egg., Stettin: Bodenberg, nicht selten.

chloris Meig., 4-6, überall häufig auf Weidenblüten und Wiesenblumen.

cynocephala Lw., 2.8.15, 1 o in der Waldkatze bei Stolp.

fraterna Meig., 5-6, Stolp: Stolpewiesen, Kl.-Strellin; Alt-Belz bei Köslin; Stettin: Julo; Greifswald.

frontalis Lw., 5, Stolp: Waldkatze, Veddin; Stettin: Julo, Buchheide.

grossa Fll., 4-5, Stolp: St. Georg, Waldkatze, Stolpewiesen; Rügenwalde; Stettin: Julo.

illustrata Harr., von Triepke in Pommern gefangen.

impressa Lw., 6-9, Stolp: Waldkatze; Stettin: Julo.

intonsa Lw., 5-7, Stolpmünde; Stralsund (Ketel).

latifacies Lw., 5-8, Stolp; Stolpmünde.

mixta Beck., 5, Stettin: Julo. Die Art scheint mir auch nur eine Form von dem ♀ von fraterna Meig. zu sein.

mutabilis Fll., 6-8, Stolpmünde, im Dünengelände sehr verbreitet; Stettin: Julo, Buchheide; Heidebrink; Greifswald.

pagana Meig., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin; Stettin: Julo.

pubera Zett., 5-6, Stolp: Stolpewiesen, Kl.-Strellin; Stettin: Julo; Greifswald.

ruralis Meig., 4-5, Stolp, auf Weiden häufig; Rügenwalde; Stettin Finkenwalde.

scutellata Fll., 6-8, Stolp: Waldkatze, Loitz, Kl.-Strellin.

variabilis Pz., 6-8, Stolp: Waldkatze, Loitz, Kl.-Strellin, Stolpmünde; Alt-Belz, Kr. Köslin; Stettin: Julo; Gartz.

velutina Lw., 5-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin; Stettin: Julo; Stralsund (Dr. Ketel).

vernalis Fll., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet; Stettin: Julo.

vulpina Meig., 5, Stettin: Julo, Bodenberg.

#### Pelecocerinae.

## Pelecocera Meig.

tricincta Meig., 7, Stolp: Dünengebiet bei Stolpmünde und Freichow, im Binnenlande bei Kl.-Silkow; Heidebrink; Rügenwalde.

## Chamaesyrphus Mik.

scaevoides Fll., 7, Stolp: Stolpmünde, Freichow, nur im Dünengebiet.

## Sphegininae.

## Sphegina Meig.

Die Fliegen finden sich an feuchten, pflanzenreichen Stellen. clunipes Fll., 6-8, Stolp: Goldbrunnen, Neumühl, Kl.-Strellin, Arnshagen; Rügenwalde; Stettin: Finkenwalde.

germanica Beck., 6-8, Stolp: Waldkatze, Loitz, Reitz.

#### Neoascia Willist.

Die Fliegen findet man an feuchten Stellen zwischen niedrigen Pflanzen.

dispar Meig., 5-7, Stolp: Stolpewiesen, Reitz, Stolpmünde, Potänewiesen; Stettin: Oderwiesen, Bodenberg.

floralis Meig., 5-7, Stolp: Stolpewiesen, Veddin; Stettin: Julo,

Finkenwalde; Gartz.

geniculata Meig., 5-8, Stolp: Stolpewiesen, Kl.-Strellin, Veddin. interrupta Meig., 5-8, kommt nach Dr. Ketel auch in Pommern vor. podagrica Fbr., 5-10, überall gemein, auf Blüten.

# Brachyopinae.

## Rhingia Scop.

campestris Meig., 5-7, Stolp: Goldbrunnen, Reitz, Kl.-Strellin; Stettin: Julo; Greifswald.

rostrata L., 5-8, Stettin: Julo, Frauendorf; Gartz; Greifswald; Rügen.

Beide Arten findet man an den Blüten von Geum rivale, rostrata auch an Ballota nigra.

## Brachyopa Meig.

Die Fliegen finden sich am ausfließenden Safte kranker Bäume, aber auch an Blüten.

bicolor Fll., 5-6, Stolp: Loitz; Neustettin; Stettin: Buchheide.

conica Pz., 5, Stolp: Loitz.

dorsata Zett., 5, Stolp: Loitz; Stettin: Buchheide.

ferruginea Fll., 5-7, Stolp: Loitz, Veddin, Arnshagen.

# Syrphinae.

#### Paragus Latr.

Die Fliegen finden sich an trockenen Stellen.

albifrons Fll., 7, Stolp: Kl.-Strellin, Horster Teiche. Stettin: Carpin.

bicolor Fbr., 7, Stolp: Stolpmünde, Freichow; Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark (Altenwedel); Gartz (Triepke).

v. testaceus Meig., 16.7.15, 1 o bei Stolpmünde.

v. lacerus Lw., 6-7, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde; Patzig, Kreis Neustettin; Ihnagrenzgebiet (Altenwedel).

tibialis Fll., 5-7, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Veddin, Loitz, Freichow, durchaus nicht selten; Stettin: Westendsee.

v. meridionalis Beck., 7, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde.

## Pyrophaena Schin.

Die Fliegen finden sich an Wassergräben und auf feuchten Wiesen.

granditarsa Forst., 6-9, Stolp: Stolpewiesen, Potänewiesen am Muddelsee; Stettin: Oderwiesen, Finkenwalde; Gartz.

rosarum Fbr., 5-8, Stolp: Stolpewiesen, Loitz, Reitz, Veddin, Kl.-Strellin, Strandsumpfgebiete bei Stolpmünde; Gartz.

## Platychirus St.-Farg. & Serv.

Die Fliegen finden sich auf Wiesen und an feuchteren Waldstellen.

albimanus Fbr., 5-8, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin; Rügenwalde; Stettin: Julo; Putbus auf Rügen; Greifswald; Eldena.

clypeatus Meig., 5-8, Stolp: Stolpewiesen, Stolpmünde; Stettin:

Bodenberg; Heidebrink; Greifswald; Rügen.

discimanus Lw., 5-7, Stettin: Julo.

fulviventris Mcq., 6-8, Stolp: Stolpewiesen, Veddin; Greifswald. immarginatus Zett., 6-8, Greifswald (Dahlbom).

manicatus Meig., 5-9, Stolp: Stolpewiesen, Goldbrunnen, Loitz;

Alt-Belz bei Köslin; Stettin: Julo, Bodenberg; Gartz.

peltatus Meig., 5-10, Stolp: Waldkatze, Ritzow, Schmaatz, Veddin;

Gartz; Stettin: Julo, Bodenberg; Greifswald; Rügen. podagratus Zett., 5-7, Stettin: Julo; Greifswald.

scutatus Meig., 5-8, Stolp: Waldkatze; Stettin: Julo; Greifswald.

#### Melanostoma Schin.

Die Fliegen findet man den ganzen Sommer hindurch an Blüten. Die Larven leben von Blattläusen.

incomplectum Beck., 1 of am 10.5.21 bei Stolp.

mellinum L., 4-10, gemein in Wiesen und Wäldern, besonders aber in der Nähe von Gewässern.

scalaris Fbr., 5-8, mit der vorigen zusammen, aber seltener. dubium Zett., 31.5.42, Putbus (Dahlbom).

#### Xanthandrus Verr.

Die Fliegen kommen in Wäldern und Gebüschen vor. Die Larven leben wahrscheinlich von Blattläusen. Ich zog 1  $\circlearrowleft$  aus einer Puppe, die ich an dem Blatt von Elymus arenarius fand.

comtus Harr., 7-9, Stolp: Waldkatze, Reitz, Kl.-Strellin, Arns-

hagen, Stolpmünde, Freichow; Stettin: Sandsee.

## Melangyna Verr.

quadrimaculata Verr., 30. 3. 11, 1 ♀ bei Stolp.

Ischyrosyrphus Big.

glaucius L., 6-8, Stolp: Loitz, Arnshagen, Freichow; Rügenwalde. Auf Dolden.

Epistrophe Walk.

Die Fliegen sind Blütenbesucher und schweben gern rüttelnd in der Luft. Die Larven ernähren sich wie die der vorigen Gattung von Blattläusen.

auricollis Meig., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen, Stolpmünde; Stettin: Julo, Gartzer Schrey.

balteata Deg., 6-10, überall verbreitet und häufig.

barbifrons Fil., 4-5, Stolp: Waldkatze; Stettin: Finkenwalde. Auf Weidenkätzchen.

bifasciata Fbr., 5-6, Stolp: Kl.-Strellin; Stettin: Julo, Buchheide; Gartz.

cincta Fll., 5-7, Stolp: Arnshagen; Stettin: Buchheide.

cinctella Zett., 5-9, Stolp: Städtische Anlagen, Loitz; Stettin: Buchheide.

grossulariae Meig., 7-8, Stolp: Loitz, Budow, Freichow.

guttata Fll., 15.6.13, 1 o in der Loitz.

lasiophthalma Zett., 4-6, Stolp: Waldkatze, Veddin; Stettin: Julo.

lineola Zett., 5-7, Stolp: Waldkatze, Reitz; Stettin: Julo.

macularis Zett., 4-5, Štolp: Waldkatze. Auf Weidenkätzchen.

melanostoma Zett., 5-6, Štolp: Reitz, Loitz; Stralsund (Ketel). triangulifera Zett., 5, Stolp.

umbellatarum Fbr., 5-8, Stolp Waldkatze, Freichow; Stettin:

Julo, Buchheide.

#### Eriozona Schin.

syrphoides Fll., 17.7.14, 1 o' hinter den Dünen am Wege von Lindow (Erlenstelle), westlich von Stolpmünde.

#### Leucozona Schin.

lucorum L., 5-7, Stolp: Kl.-Strellin, Gr.-Strellin, Loitz, Arnshagen; Alt-Belz bei Köslin; Stettin: Julo, Buchheide; Elmenhorster Wald bei Stralsund (Dr. Ketel).

## Stettiner Entomologische Zeitung. 96. 1935.

#### Didea Mcq.

Die Fliegen besuchen Blüten, sitzen aber auch gern an der Unterseite von Blättern. Die Larven leben wie die der beiden folgenden Gattungen bei Blattläusen.

alneti Fll., 7, im Dünengebiet von Stolpmünde und am Strande;

Stettin: Julo, Buchheide.

fasciata Mcq., 5-7, Stolp: Waldkatze, Loitz; Stettin: Finkenwalde. intermedia Lw., 5-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Stolpmunde; Alt-Belz bei Köslin; Stettin.

#### Lasiopticus Rd.

Die Fliegen sind Blütenbesucher.

pyrastri L., 5-9, sehr verbreitet und häufig. seleniticus Meig., 5-9, Stettin, häufiger.

## Syrphus Fbr.

albostriatus Fll., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet; Stettin: Julo; Heidebrink.

annulipes Zett., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Veddin; Stettin: Buchheide.

arcuatus Fll., 26. 4. 12,  $1 \circ \text{bei Stolp.}$ 

corallae Fbr., 6-8, Stolp: Waldkatze; Stettin: Julo, Finkenwalde, Buchheide; Greifswald.

latifasciatus Mcq., 6-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin; Stettin: Bodenberg, Finkenwalde, Ziegenort.

luniger Meig., 5-8, Stolp: Stolpewiesen, Loitz, Kl.-Strellin, Stolpmünde; Stettin: Julo.

lunulatus Meig., 5-6, Stolp: Waldkatze, Loitz, Reitz.

nigritarsis Zett., 5-6, Stolp: Loitz.

nitens Zett., 4-8, Stolp, Stolpmünde.

nitidicollis Meig., 4-6, Stolp: Waldkatze, Loitz, Kl.-Strellin, Reitz. ribesii L., 4-9, sehr verbreitet und häufig.

torvus Ost.-Sack., 4-8, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin; Stettin: Bodenberg.

tricinctus FII., 5-8, Stolp: Waldkatze, Loitz; Stettin: Julo.

venustus Meig., 4-6, Stolp: Waldkatze, Reitz, Kl.-Strellin; Stettin: Julo, Bodenberg.

vitripennis Meig., Stolp; Stettin; Gartz; Greifswald; Zirkow auf Rügen.

Sphaerophoria St.-Farg. & Serv. (Melithreptus Lw.). menthastri L.

v. menthastri L., 5-7, Stolp: Waldkatze; Heidebrink.

v. *philanthus* Meig., 5-7, Stolp: Stolpewiesen, Reitz, Veddin, Stolpmünde; Heidebrink.

- v. picta Meig., 5-8, Stolp: Stolpewiesen, Ritzow, Kl.-Strellin, Alt-Belz b. Köslin; Heidebrink; Greifswald.
- v. taeniata Meig., 7-8, Stettin; Heidebrink; Greifswald; Eldena; Zirkow auf Rügen.

scripta L.

- v. scripta L., 5-8, Stolp: Waldkatze, Veddin, Stolpmünde; Stettin; Heidebrink.
- v. dispar Lw., 7, Heidebrink; Greifswald.
- v. nigricoxa Zett., 6-7, Greifswald (Dahlbom).
- v. strigata Staeg., Stolp: Waldkatze, Veddin, Stolpmünde; Heidebrink.

## Xanthogramma Schin.

Die Fliegen auf Blättern und Blüten, die Larven unter Baumrinde und in Erdhaufen.

citrofasciatum Deg., 5-6, Stolp: Veddin; Stettin: Julo.

#### Bacchinae.

## Doros Meig.

conopseus Fbr., 6-7, Stolp: Nipnow, Dargatzhof, Kl.-Gansen; Neucollatz b. Polzin. Auf Blättern und Blüten.

#### Baccha Fbr.

Fliegen an feuchten schattigen Stellen, unermüdliche Schweber. Larven bei Blattläusen und Cocciden.

elongata Fbr., 6-8, Stolp: Waldkatze, Goldbrunnen, Loitz, Reitz, Kl.-Strellin, Stolpmünde; Gollnow; Gartz.

obscuripennis Meig., 6-8, Stolp: Goldbrunnen, Stolpmünde, Freichow.

## Chrysotoxinae.

## Chrysotoxum Meig.

Die Fliegen auf Blüten, die Larven im Mulm hohler Bäume.

arcuatum L. Von Triepke in Pommern gefangen.

bicinitum L., 6-8, Stolp: Waldkatze, Neumühl, Patzig, Kreis Neustettin; Stettin: Julo, Buchheide. Überall verbreitet und nicht selten.

cautum Harr., 5-7, Stolp: Waldkatze, Lossin, Loitz; Stettin: Julo. festivum L., 5-7, überall verbreitet und ziemlich häufig.

octomaculatum Curt., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz; Stettin: Julo; Gollnow.

vernale Lw., 5-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Kl.-Strellin; Stettin: Julo.

#### Psarinae

Psarus Latr.

abdominalis Fbr., 15.6.01, 1 o von Riedel bei Rügenwalde gefangen.

Microdontinae.

Microdon Meig.

Die Fliegen auf feuchten Wiesen und Mooren, die Larven in Ameisennestern und unter loser Baumrinde.

devius L., 4.6.32 und 30.5.33 je 1 o bei Horster Teiche, Arnshagen, Kr. Stolp. 13. 6. 96, 2 Štück von Lüderwaldt beim Bahnhof Speck am Gubenbach gefangen.

mutabilis L., 5-6, Stolp: Stolpewiesen; Seelitz; Wusterwitzer Moor; Stettin: Finkenwalde.

#### Volucellinae.

Volucella Geoffr.

Die Fliegen auf Blättern und Blüten, die Larven in Hummelund Wespennestern.

bombylans L., 6-8, sehr verbreitet und häufig. pellucens L., 6-8, überall verbreitet und häufig.

zonaria Poda, 18.7.10, 1♀ auf der Hasenwiese in der Waldkatze bei Stolp gefangen.

Eristalinae.

Die Fliegen auf Blättern und Blüten, die Larven meistens in schlammigem Wasser, in Abwässern und Jauchgruben.

Eristalinus Rd.

sepulcralis L., 4-9, Stolp: Stolpewiesen, Veddin, Kl.-Strellin, Salesker Moor; Gartz; Stettin: überall häufig; Greifswald.

Lathyrophthalmus Mik.

aeneus Scop., 4-9, Stolp: Dünengebiet von Stolpmünde; Rügenwalde; Stettin: überall häufig; Gartz; Greifswald.

Eristalomuia Rd.

anthophorina Fll., 5-7, Stolp: Stolpewiesen, Stolpmünde; Alt-Belz bei Köslin; Gartz (Triepke).

oestracea L., 5, Stettin (Schroeder); Gartz (Triepke).

cryptarum Fbr., 7-8, Stolpmünde, im Sumpfgebiet des abgelassenen Schwarzen Sees bei Lindow; Gartz.

tenax L., 4-10, überall gemein.

Eristalis Latr.

alpina Pz., 5-7, Stolp: Kl.-Strellin, Veddin; Stettin: Julo, Buchheide.

arbustorum L., 4-10, überall häufig.

horticola Deg., 5-10, in Wäldern und Gebüschen auf Blüten häufig.

intricarius L., 5-10, überall häufig.

nemorum L., 5-7, überall verbreitet und häufig.

pertinax Scop., 5-9, überall ziemlich häufig.

pratorum Meig., 4-8, Stolp; Stettin; selten.

rupium Fbr., 5-7, Stolp: Goldbrunnen, Kl.-Strellin; Lauenburg.

Myiatropa Rd.

florea L., 5-9, überall häufig.

Liops Rd.

vittata Meig., 28.7.13, 1 $\circ$  auf den Potänewiesen, westlich von Stolpmünde.

Tubifera Meig.

hybrida Lw., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet; Stettin: Julo, Bodenberg; Heidebrink.

pendula L., 5-9, überall gemein.

trivittata Fbr., 6-8, überall verbreitet und ziemlich häufig.

Parhelophilus Girschn.

frutetorum Fbr., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz; Stettin: Bodenberg; Greifswald; stellenweise häufig.

lunulatus Meig., 5-7, Stolp: Stolpewiesen; Alt-Belz bei Köslin; Stettin: Bodenberg.

versicolor Fbr., 6-7, Stolp: Kl.-Strellin, Veddin; Stettin: Julo.

Eurinomyia Big.

lineata Fbr., 5-7, Stolp: Stolpewiesen, Keitz; Stettin: Bodenberg. Auf Sumpf- und Wasserpflanzen.

transfuga L., 6-7, Stolp: Stolpewiesen, Reitz, Loitz, Stolpmünde; Stettin: Bodenberg; Heidebrink. Auf Sumpf- und Wasserpflanzen.

Lampetia Meig. (Merodon Meig.).

Die Fliegen in Gärten oder an sonnigen Hängen, die Larven in Zwiebelgewächsen.

spinipes Fbr., 5-7, nach Sack in Pommern vorkommend.

equestris Fbr., 6, Stettin: Finkenwalde; Swinemünde (Schroeder); Gartz.

Mallota Meig.

Die Fliegen auf Blüten, die Larven im Mulme hohler Bäume. fuciformis Fbr., 5, Gartz (Triepke). cimbiciformis Fll., 6-7, Stettin: Buchheide.

## Cerioidinae.

Cerioides Rd. (Ceria Fbr.).

conopoides L., 6-7, Stolp: Walkmühlenweg am Rande der Waldkatze, Dargatzhof (Loitz); Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark; Gartz.

#### Cinxiinae.

Arctophila Schin.

mussitans Fbr., 7-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Veddin; Latzig, Kr. Schlawe; Gartz; Stettin: Julo, Buchheide; Gollnow; Rügenwalde.

Cinxia Meig. (Sericomyia Meig.).

Die Fliegen in Blüten, ihre Larven sind Rattenschwanzlarven und leben in faulenden Torfrasen.

borealis Fll., 6-8, überall auf Blüten ziemlich häufig.

lappona L., 5-7, Stolp: Goldbrunnen, Loitz, Kl.-Strellin; Wusterwitzer Moor; Stettin: Julo, Buchheide; Gartz. Seltener als vorige, auffallend häufig auf dem Wusterwitzer Moor.

#### Milesiinae.

Brachypalpus Mcq.

Die Fliegen auf Blüten, die Larven im Mulme unter Rinde. bimaculatus Mcq., 5-7, Stolp: Veddin, Loitz, Schwuchow; Stettin: Julo, Gartzer Schrey.

meigeni Schin., 4-6, Stolp: Loitz; Stettin: Finkenwalde. valgus Pz., 4-6, Stettin: Julo, Buchheide; Rügenwalde.

eunotus Lw., 25.5.23, Stolp: Loitz, 2 Q.

Pocota St.-Farg. & Serv.

apiformis Schrk., 17.5.10,  $1 \circ in$  der Buchheide bei Stettin von Schroeder gefangen.

Penthesilea Meig. (Criorrhina Meig.).

Die Fliegen auf blühenden Sträuchern, besonders Weißdorn, die Larven in Mulm und in Genist.

asilica Fll., 5-6, Stolp: Loitz, Kl.-Strellin, Arnshagen; Stettin: Julo.

berberina Fbr., 5-7, Stolp: Loitz, Goldbrunnen; Rügenwalde; Stettin: Buchheide.

oxyacanthae Meig., 5-6, Stolp: Goldbrunnen, Loitz, Kl.-Strellin, Arnshagen; Rügenwalde; Stettin: Julo, Buchheide.

pachymera Egg., 22. 6. 09, 1 \, von Schroeder in der Buchheide.

Cynorrhina Willist.

fallax L., 6-7, Stolp: Ğoldbrunnen, Loitz, Arnshagen; Rügenwalde; Stettin: Hökendorf.

Eumerus Meig.

Die Fliegen auf Blüten und zwischen Pflanzen, die Larven in Küchenzwiebeln und anderen Zwiebelgewächsen. annulatus Pz., Gartz (Triepke).

ovatus Lw., 31.5.09, 1 of am Gartzer Schrey (Schroeder).

ruficornis Meig., Gartz (Triepke).

sabulonum Fbr., 5-7, Stolp: Stolpetalgebiet, im Dünengebiet von Stolpmunde und Freichow; Stettin; Heidebrink.

tarsalis Lw., 27.6.99, 1♀ bei Rügenwalde (Riedel). strigatus Fll., 6-8, überall verbreitet und häufig.

## Tropidia Meig.

scita Harr., 5-8, Stolpewiesenrandgebiete, Loitz, Kl.-Strellin, Freichow; Stettin: Julo, Bodenberg; Greifswald (Reinberg).

## Syritta St. Farg. & Serv.

Die Fliegen oft schwärmend um Blüten und Blätter, die Larven im Dünger. pipiens L., 4-9, überall gemein.

## Zelima Meig. (Xylota Meig.).

Die Fliegen auf Blättern und Holzschlägen, die Larven in Moder und faulem Holz, auch unter Rinde.

femorata L., 5-6, Stolp: Waldkatze, Nipnow, Arnshagen.

florum Fbr., 5-7, in Laubwaldgebieten sehr verbreitet und ziemlich häufig.

ignava Pz., 5-8, Stolp: Loitz; Stettin: Julo, Buchheide.

lenta Meig., 5-6, Stolp: Reitz, Loitz; Stettin: Julo, Buchheide; Gartz.

nemorum Fbr., 5-8, Stolp: Waldkatze, Reitz, Hebrondamnitz, Kl.-Strellin, Veddin; Gartz.

pigra Fbr., 5-7, Stolp: Waldkatze, Loitz; Stettin: Gr.-Gelüh bei Karolinenhorst.

segnis L., 5-9, überall häufig.

sylvarum L., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Kl.-Strellin, Arnshagen; Stettin: Julo, Buchheide; Neustettin; Gartz.

tarda Meig., 6-8, Stettin: Julo; Heidebrink.

### Myiolepta Newm.

Die Fliegen auf Blüten, die Larven im Mulme. luteola Gmel., 6-7, Stolp: Loitz; Stettin: Buchheide. vara Pz., 6, Stolp: Loitz.

## $Ferdinandea \ {\bf Rd.} \ ({\it Chrysochlamis} \ {\bf Walk.}).$

Die Fliegen am ausfließenden Safte kranker Bäume und auf Blüten, die Larven im Mulme und in Baumgeschwüren. cuprea Scop., 6-8, Stolp: Waldkatze, Loitz, Freichow; Stettin:

Julo; Gollnow.

nigrifrons Egg., 6-7, kommt nach Dr. Ketel auch in Pommern vor. ruficornis Fbr., 5-8, Stolp: Waldkatze; Alt-Belz bei Köslin; Neustettin (Riedel); Gartz.

#### Calliprobola Rd.

speciosa Rossi, 5-7, Gartz (Triepke).

Spilomyia Meig.

Die Fliegen auf Blüten, die Larven im Mulme.

diophthalma L., 6-7, Stolp: Stolpewiesenrandgelände, Stolpmunde, Freichow; Stettin: Sandsee (Bollow); Neustettin (Riedel); Tarmen, Kr. Neustettin; Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark.

saltuum Fbr., 4.8.05, 1 ♀ von Schroeder auf Heracleum bei Finkenwalde. Außerdem ist die Art auch von Lehrer F. Hintze bei Tarmen, Kr. Neustettin, gefangen worden.

Temnostoma St. Farg. & Serv.

Fliegen an Blüten, die Larven im Baummoder.

apiforme Fbr., 5-6, Stettin: Julo, Bodenberg, Buchheide.

bombylans Fbr., 5-6, Stolp: Loitz, Freichow; Alt-Belz bei Köslin; Stettin: Julo, Bodenberg, Buchheide.

vespiforme L., 5-7, Stolp: Goldbrunnen, Loitz, Arnshagen, Freichow; Alt-Belz bei Köslin; Tarmen, Kreis Neustettin; Stettin; Gartz.

## Conopidae.

[St. E. Z. 1910, 385-386; 1911, 349; 1912, 183; 1913, 160; 1922, 89.]

Die Dickkopffliegen sind Honigsauger und Blütenbesucher und halten sich an sonnigen Stellen auf. Die frühesten Arten sind Weidenblütenbesucher, die späteren findet man an Knautia, Succisa, Umbelliferen und Compositen. Die Larven schmarotzen in Hymenopteren und Orthopteren. Diese Lebensweise erklärt die oft sehr beträchtlichen Größenunterschiede, die bei einzelnen Arten vorkommen.

## Conopinae.

Physocephala Schin.

chrysorrhoea Meig., 7-8, Rügenwalde (Riedel).

rufipes Fbr., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Kl.-Strellin, Gr.-Strellin, Veddin; Heidebrink; Rügenwalde; Gartz.

vittata Fbr., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz; Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark; Rügenwalde; Gartz; Stettin: Vogelsang b. Greifenhagen.

Conops L.

flavipes L., 6-9, überall verbreitet und nicht selten. quadrifasciatus Deg., 6-9, mit der vorigen zusammen.

vesicularis L., 5-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin, Kl.-Strellin,

Arnshagen; Rügenwalde; Gartz.

strigatus Wied., 8, Stolp: Stolpewiesen, Veddin.

## Myopinae.

#### Zodion Latr.

Fliegen an trockenen Gras- und Heidestellen.

cinereum Fbr., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Neumühl, Kl.-Strellin; Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark; Gartz (Triepke).

notatum Meig., 6, Stolp: Arnshagen, Veddin.

carceli R.-D., 8, Stolp: Plassower Heide, Heidestellen im Stolpetalgebiet (Kublitz).

Myopa Fbr.

buccata L., 4-6, die gemeinste Art; an Weiden, später auch an anderen Blüten.

dorsalis Fbr., 6, Stolp: Kl.-Gansen; Alt-Belz bei Köslin, Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark; Gartz (Triepke).

fasciata Meig., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Kl.-Sil-

kow; Gollnow (Lüderwaldt).

polystigma Rd., 5, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Brüskower Moor.

testacea L., 4-5, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Stolpmünde; Alt-Belz bei Köslin; Stettin: Julo.

variegata Meig., 6-7, Stolp: Waldkatze, Kl.-Silkow; Marsdorf bei Gollnow (Lüderwaldt); Gartz.

## Melanosoma R.D.

bicolor Meig., 1 & von Triepke in Pommern gesammelt. pallipes Meig., 5-6, Stolp: Kl.-Strellin, Veddin.

Occemyia R. D.

atra Fbr., 6-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Labuhn, Reitz, Kl.-Strellin, Veddin, Ulrichsfelde, Arnshagen; Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark; Gartz; Stettin (Dahlbom).

distincta Wied., 6-7, Stolp: Kl.-Strellin, Arnshagen; Alt-Belz bei

Köslin; Gartz.

pusilla Meig., 5-7, Stolp: Kl.-Strellin; Gartz.

sundewalli Zett., 7-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Veddin, Ulrichsfelde; Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark.

Sicus Scop.

ferrugineus L., 6-8, überall auf Blüten, nicht selten.

## Dalmanniinae.

#### Dalmannia R. D.

punctata Fbr., 5-6, Stolp: Kl.-Strellin, Horster Teiche.

(Fortsetzung folgt.)

# **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitung Stettin

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: 96

Autor(en)/Author(s): Karl O.

Artikel/Article: Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera

<u>242-261</u>