download unter www.zobodat.at

Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera.

Von **O. Karl, Stolp i. Pom.**

(Fortsetzung.)

Parectecephala Beck.

longicornis Zett., 7-8, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde.

Chloropisca Lw.

glabra Meig., 5-7, Stolp: Waldkatze, Neumühl, Stolpmünde.

Thaumatomyia Zenk.

notata Meig., 5-10, Stolp: Waldkatze, Reitz.
trifasciata Zett., 7, Stolpmünde.

Agromyzidae.

Die Agromyziden bilden eine artenreiche Familie und enthalten durchweg sehr kleine Tiere, die nur eine Länge von wenigen Millimetern erreichen. Ihre Larven entwickeln sich größtenteils in Minen von Blättern und Stengelrinden. Einige leben auch im Mark der Stengel, in Blüten oder Früchten. Die Fliegen kann man leicht durch Zucht erhalten.

Dizygomyza Hd.

A. *Dendromyza* Hd.

posticata Meig., 8. Aus Solidago gezogen.

B. *Cephalomyza* Hd.

karli Hd., 9.6.24, 1 ♀ in der Schlucht bei Gr.-Strellin, Kr. Stolp.

C. *Poëmyza* Hd.

atra Meig., 7-8, Stolp: Krampe, Loitz, Stolpmünde; auch aus Gräsern gezogen.
incisa Meig., 6-8, Stolp: Waldkatze, Gr.-Strellin, Stolpmünde; gezogen aus Phalaris arundinacea L.
lateralis Mcq., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet; gezogen aus Agropyrum repens L.
muscina Meig., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin.
pygmaea Meig., 6, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde.
scutellaris v. Ros., 1-4, aus Scirpus silvaticus L. gezogen.
semiposticata Hd., 6, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz; auch aus Carex gezogen.

D. *Icteromyza* Hd.

capitata Zett., 6-7, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde.
geniculata Fll., 6, Stolp: Stolpetalgebiet.

E. *Amauromyza* Hd.

lamii Kalt. Durch Mine nachgewiesen (Galeobdolon).
morionella Zett., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet.

download unter www.zobodat.at

F. *Calycomyza* Hd.

artemisiae Kalt., 6-8, Stolp: Gr.-Strellin, Stolpmünde.
humeralis v. Ros., 8, Stolp: Kl.-Strellin.
gyrans Fll., 6, Stolp: Waldkatze, Reitz.

G. *Trilobomyza* Hd.

flavifrons Meig., 5-7, Stolp: Waldkatze, Krampe; auch aus Stellaria und Melandryum gezogen.
labiatarum Hd., 7-8, Stolp: Krampe, Stolpmünde; auch aus Galeopsis gezogen.
verbasci Bouché, 7. Aus Scrophularia nodosa L. gezogen.

H. *Praspedomyza* Hd.

approximata Hd., 1-3. In großer Anzahl aus Daphne gezogen.
monfalconensis Strbl., 6, Stolp: Reitz, Gr.-Strellin.
morio Brischke, 6, Stolp: Stolpetalgebiet; auch aus Asperula gezogen.
hilarella Zett., 7-8, Stolp: Stolpmünde, Freichow; in Beständen von Pteris aquilina L.

I. *Dizygomyza* Hd. s. str.

bimaculata Meig., 6-7, Stolp: Waldkatze, Freichow; auch aus Luzula pilosa L. gezogen.
iraeos R.-D., 7-8, Stolp: Reitz; auch aus Iris pseudacorus L. gezogen.
luctuosa Meig., 1. Aus Juncus effusus L. gezogen.
morosa Meig., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen, Stolpmünde, Freichow.

Agromyza Fll.

alnibetulae Hd., 6-7, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde. Häufiger als die Fliegen sind die Minen in den Blättern der Birken und Erlen.
ambigua Fll., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin.
anthracina Meig., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Stolpmünde, Freichow.
bicaudata Hd., 5, Stolp: Stolpetalgebiet.
cinerascens Mcq., 4-5, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin.
ferruginosa v. d. Wulp., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet; auch aus Symphytum gezogen.
flaviceps Fll., 5-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Krampe.
flavipennis Hd., 5, Stolp: Waldkatze.
igniceps Hd., 5-6, Stolp: Waldkatze, Gr.-Strellin.
intermittens Beck., 5, Stolp: Stolpetalgebiet.
lucida Hd., 1-3, Stolp, aus Aira (Deschampsia) gezogen.
de meijerei Hd., Stolp, durch Minen in Cytisus nachgewiesen.
mobilis Meig., 6-7, Stolp: Waldkatze, Gr.-Strellin, Stolpmünde.

download unter www.zobodat.at

nana Meig., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin.
nigripes Meig., 7-8, Stolp: Stolpmünde.
niveipennis Zett., 5-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz.
orobi Hd., 4-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin, Hebron-Damnitz.
phragmitidis Hd., 6-7, Stolp: Stolpmünde, auch aus Phragmitis gezogen.
reptans Fll., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Stolpmünde.
rufipes Meig., 5-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen, auch aus Boraginaceen gezogen.
salicina Hd., 5-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Stolpmünde.
spiraeae Kalt., 5-7, Stolp: Stolpetalgebiet, auch aus Potentilla gezogen.

Melanagromyza Hd.

albocilia Hd., 5-6, Stolp: Kl.-Strellin.
cunctans Meig., 5-7, Stolp: Waldkatze, Stolpmünde.
hexachaeta Hd., 5-7, Stolp: Waldkatze, Dammen, Stolpmünde; Rügen (Hendel).
pubescens Hd., 6, Stolp: Reitz.
pulicaria Meig., 6-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin, Reitz, Stolpmünde.

Ophiomyia Braschn.

A. *Tylomyza* Hd.

madizina Hd., 5-8, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin.
pinguis Fll., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Arnshagen.

B. *Ophiomyia* Braschn. s. str.

maura Meig., 5-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Gr.-Strellin, Stolpmünde, auch aus Solidago gezogen.
proboscida Strbl., 6-7, Stolp: Waldkatze.

Liriomyza Mik.

A. *Phytoliriomyza* Hd.

perpusilla Meig., 5-7, Stolp: Dammen, Stolpmünde, Neumühl, Stolpetalgebiet.

B. *Haplomyza* Hd.

flavonotata Hal., 5-7, Stolp: Krampe, Quellsumpfstelle an den Außendünen bei Lindow (Stolpmünde).

C. *Liriomyza* Mik. s. str.

amoena Meig., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet; auch aus Sambucus gezogen.
congesta Beck., 7-8, Stolp: Gr.-Strellin, hauptsächlich aus Pisum und Vicia gezogen.
eupatorii Kalt., 7, aus Galeopsis gezogen.
fasciola Meig., 5-7, Stolp: Loitz, Stolpmünde.

download unter www.zobodat.at

flaveola Fll., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Krampe, Loitz, Arnshagen, Stolpmünde.
graminicola de Meij., 9, aus Arrhenatherum gezogen.
gudmanni Her., 7, Stolp: Stolpmünde.
impatientis Brischk., 7-8, Stolp: Kl.-Strellin, Freichow.
de meijerei Her., 8, aus Artemisia gezogen.
orbona Meig., 5-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin.
ornata Meig., 6-7, Stolp: Stolpeufer.
pectoralis Beck., 7, Stolp: Stolpmünde.
pedestris Hd., 7, Stolp: Stolpmünde, Freichow.
pumila Meig., 5, Stolp: Krampe.
pusio Meig., 7-8, Stolp, aus Scorzonera gezogen.
sonchi Hend., 6, Stolp: Waldkatze.
strigata Meig., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz; auch vielfach gezogen.
tanaceti de Meij., 8, aus Tanacetum gezogen.
taraxaci Her., 10, Stolp: Gr.-Strellin.
variegata Meig., 7, Stolp: Freichow; aus Astragalus gezogen.
virgo Zett., 7, Stolp: Stolpmünde.

Cerodonta Rond.

affinis Fll., 6, Stolp: Veddin, Gr.-Strellin.
biseta Hd., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Stolpmünde.
denticornis Pz., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Stolpmünde.
fulvipes Meig., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Gr.-Strellin, Stolpmünde.

Phytagromyza Hd.

anteposita Strbl., 5, Stolp: Waldkatze.
discrepans v. d. Wulp., 6, Stolp: Reitz.
flavocingulata Strbl., 5-6, Stolp: Reitz, Gr.-Strellin, Krampe, Stolpetalgebiet.
hendeliana Her., 2, aus Lonicera gezogen.
orphana Hd., 5-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin, Krampe.
trivittata Lw., 5-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin, Gr.-Strellin.

Phytomyza Fll.

A. *Napomyza* Hal.

elegans Meig., 6, Stolp: Waldkatze.
glechomae Kalt., 5-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Stolpmünde; auch aus Glechoma gezogen.
lateralis Fll., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin, Stolpmünde.
nigriceps v. d. Wulp., 5, Stolp: Stolpetalgebiet, Krampe, Stolpmünde.

download unter www.zobodat.at

xylostei Kalt., 6-8, Stolp: Waldkatze; auch aus Lonicera und Symphoricarpus gezogen.

B. *Phytomyza* Fll. s. str.

abdominalis Zett., 7, Stolp: Goldbrunnen.
aconiti Hd., 7-8, aus Aconitum gezogen.
affinis Fll., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Stolpmünde; auch aus Cirsium gezogen.
albiceps Meig., 6-8, Stolp: Waldkatze, Gr.-Strellin, Stolpmünde; auch aus Artemisia gezogen.
albipennis Fll., 5-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Ulrichsfelde, Arnshagen, Reitz.
analis Zett., 6-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Neumühl.
anemone Her., 5-6, Stolp: Waldkatze, Arnshagen.
angelicae Kalt., 7-8, aus Angelica und Archangelica gezogen.
anthrisci Hd., 5-8, Stolp: Waldkatze, Gr.-Strellin; auch aus Anthriscus gezogen.
atricornis Meig., 5-7, vielfach im Freien gefangen und auch aus den verschiedensten Pflanzen gezogen.
brischkei Hd., 6-8, Stolp: Stolpetalgebiet; auch aus Trifolium gezogen.
brunnipes Brischk., 8-9, aus Sanicula gezogen.
chaerophylli Kalt., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Dammen, Arnshagen, Stolpmünde; auch aus Chaerophyllum gezogen.
cicutae Hd., 5-8, Stolp: Stolpmünde; vorzugsweise aus Cicuta gezogen.
cineracea Hd., 5, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen.
cirsii Hd., 8, Stolp: Neumühl.
crassiseta Zett., 7-8, Stolp: Gr.-Strellin; auch aus Veronica gezogen.
cytisi Brischk., 2-3, aus Cytisus gezogen.
evanescens Hd., 6-8, Stolp: Waldkatze, Reitz, Arnshagen.
flavicornis Fll., 5, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Kl.-Strellin.
flavofemorata Strbl., 5-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Gr.-Strellin, Stolpmünde.
hendeli Her., 5, Stolp: Kl.-Strellin.
lampsanae Her., 2-3, aus Lampsana gezogen.
lappae Gour., 2-8, aus Lappa gezogen.
matricariae Hd., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin, Arnshagen, Stolpmünde.
milii Kalt., 4-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Kl.-Strellin; aus Milium und Agrostis gezogen.
nigra Meig., 4-7, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Stolpmünde; auch aus Agropyrum (Quecke) gezogen.

download unter www.zobodat.at

nigripennis Fll., 4-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Krampe, Reitz, Dammen, Veddin, Kl.-Strellin, Arnshagen, Stolpmünde.

nigritella Zett., 5-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen, Stolpmünde; auch aus Caltha gezogen.

ochracea Hd., 5, Stolp: Goldbrunnen, Krampe.

obscurella Fll., 6-7, Stolp: Stolpmünde; auch aus Pimpinella und Aegopodium gezogen.

opaca Hd., 6, Stolp: Reitz.

pauli-loewi Hd., 2-7, aus Pimpinella und Peucedanum gezogen.

periclymeni de Meij., 7-8, aus Lonicera gezogen.

plantaginis de Meij., 5-8, Stolp: Waldkatze, Krampe, Gr.-Strellin.

ranunculi Schrk. f. *praecox* Meig., 5-6, Stolp: Stolpetal, Reitz, Kl.-Strellin, Arnshagen.

ranunculi f. *albipes* Meig., 6-8, Stolp: Stolpetal, Neumühl, Veddin, Freichow, Stolpmünde.

ranunculi f. *flavoscutellata* Fll., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Gr.-Strellin, Stolpmünde; auch aus Ranunculus lanuginosus L. gezogen.

ranunculi f. *flava* Fll., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Freichow, Stolpmünde.

rufipes Meig., 6-9, Stolp: Aucker, Neumühl, Reitz.

selini Her., 7-8, Stolp: Stolpetalgebiet; hauptsächlich aus Selinum gezogen.

solidaginis Hd., 6, aus Solidago gezogen.

sphondilii R. D., 6-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz; auch vielfach aus Heraclea gezogen.

tanaceti Hd., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Kl.-Strellin, Stolpmünde; auch aus Tanacetum gezogen.

taraxaci Hd., 5, Stolp: Arnshagen; auch aus Taraxacum gezogen.

tenella Meig., 6-8, Stolp: Waldkatze, Loitz, Kl.-Strellin, Arnshagen, Stolpmünde.

tetrastichi Hd., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Krampe, Reitz; auch aus Mentha gezogen.

thysselini Hd., 3-8, aus Thysselinum gezogen.

torilii Hd., 2, aus Torilis gezogen.

vitalbae Kalt., 8, aus Clematis gezogen.

varipes Mcq., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet, Gr.-Strellin.

veronicicola Her., 8, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Stolpmünde.

virgaureae Her., 6, aus Solidago gezogen.

download unter www.zobodat.at

Odiniidae.

Sie bilden eine sehr kleine Gruppe ziemlich seltener Fliegen und wurden am ausfließenden Safte von Bäumen und auf Baumschwämmen gefunden, aus denen sie auch gezogen wurden.

Odinia R. D.

boletina Zett., 18. 6. 34, Stolp: Loitz, in größerer Anzahl von Baumschwämmen, über denen sie schwärmten, gefangen.

maculata Meig., 27. 5. 32, Stolp: Waldkater, 1 ♂ am Baumstamm.

Milichiidae.

Sie bilden ebenfalls eine kleine Familie mit nur wenigen Arten. Die Fliegen wurden an lebenden und toten Insekten beobachtet.

Milichia Meig.

ludens Wahlb., 6, Stolp: Kl.-Strellin.

Phyllomyza Fll.

securicornis Fll., 6, Stolp: Stolpetalgebiet.

Desmometopa Lw.

M. nigrum Zett., 6-10, Stolp: Stolpetalgebiet.

Meoneura Rd.

flavifacies Coll., 6, Stolp: Waldkatze, Arnshagen.

lamellata Coll., 6-7, Stolp: Stolpmünde.

lacteipennis Fll., 6-7, Stolp: Waldkatze, Gr.-Strellin, Veddin.

obscurella Fll., 5, Stolp: Waldkatze.

vagans Fll., 5-6, Stolp: Waldkatze.

Madiza Fll.

glabra Fll., 4-10, Stolp, an Fenstern gemein.

Braulidae.

Die „Bienenläuse" sind Bienenschmarotzer. Ihre Larven minieren Gänge in die Zellendeckel oder leben neben den Bienenlarven von deren Futter. Die Fliegen sind Außenschmarotzer der Bienen. Sie saugen sich meist einzeln auf dem Thoraxrücken der Biene fest.

Braula Nitzsch.

coeca L. Aus Bienenstöcken in Pommern bekannt (Sellin, Kreis Rummelsburg).

Hippoboscidae.

[St. E. Z. 1913, 367.]

Die „Lausfliegen" sind Außenschmarotzer auf Säugetieren und Vögeln und verirren sich gelegentlich auch auf Menschen. Die Weibchen sind pupipar.

Hippobosca L.

equina L., 7, Ihnagrenzgebiet bei Reetz; Gollnow.

download unter www.zobodat.at

Ornithomyia Latr.

aviculare L., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin, Stolpmünde; Gollnow.

Lipoptena Nitsch.

cervi L., 8-11, überall verbreitet und nicht selten.

Gastrophilidae.

[St. E. Z. 1911, 361.]

Die Larven der „Pferdemagenfliegen" leben in dem Magen und Zwölffingerdarm der Pferde, Maulesel und Esel. Nach erlangter Reife gelangen sie durch den Darm ins Freie und verpuppen sich in der Erde. Die Fliegen umschwärmen Berggipfel und Türme und sind sonst im Freien höchst selten anzutreffen.

Gastrophilus Leach.

intestinalis Deg. (syn. *equi* Clark), 7-9, Gollenturm bei Köslin; auch Triepke hat die Art in Pommern beobachtet.

Cordyluridae.

[St. E. Z. 1911, 361-364; 1912, 184-185; 1913, 160.]

Die „Dungfliegen" findet man auf Exkrementen, auf Buschwerk und niederen Pflanzen, wo sie auf kleine Insekten lauern.

Cordylurinae.

Cordylura Fll.

biseta Lw., 5-7, Stolp; Alt-Belz, Kr. Köslin; Neustettin (Riedel).

ciliata Meig., 6-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Freichow; Stettin: Bodenberg; Stralsund.

pubera L., 4-6, Stolp: Stolpewiesen; Stettin: Sumpfige Stellen; Greifswald; Stralsund.

rufimana Meig. (syn. *tibialis* Zett.), 5-6, Stolp: Wusterwitzer Moor; Alt-Belz b. Köslin; Stettin: Finkenwalde; Eldena.

pudica Meig., 5-7, Stolp: Stolpewiesen, Stolpmünde; Stettin: Nemitz, Wussow, Bodenberg.

umbrosa Lw., 5, Neustettin (Riedel).

Chylizosoma Hd.

Die Larven der Arten dieser Gattung sind Blattminierer.

medium Beck., 6, Stolp: Goldbrunnen; auch aus Polygonatum und Majanthemum gezogen.

vittatum Meig., 7, Stolp: Freichow; Alt-Belz b. Köslin; ebenfalls aus Polygonatum und Majanthemum gezogen.

paridis Her., 2-8, Stolp; aus Paris gezogen.

Parallelomma Beck.

albipes Fll., 5-6, Stolp: Waldkatze, Reitz; Alt-Belz b. Köslin; Stettin: Julo, Lindenhof; Greifswald; Putbus; Stralsund.

download unter www.zobodat.at

Phrosia R. D.

albilabris Fbr., 5-8, Stolp: Waldkatze, Kl.-Strellin, Brüskower Moor; Alt-Belz b. Köslin; Stettin: Julo, Buchheide, Sandsee; Greifswald; Eldena; Stralsund.

Scoliaphleps Beck.

ustulata Zett., 6. 5. 18, Stolp: Veddin.

Cnemopogon Rd.

apicalis Wied., 5-7, Stolp: Stolpeufer, Menkenbruch, Reitz, Stolpmünde, Potänewiesen; Stettin: Oderwiesen, Finkenwalde; Stralsund.

Orthocheta Beck.

pilosa Zett., 5-7, Stolp: Stolpeuferrandgebiet beim Walkmühlenfriedhof; Putbus (Dahlbom); Stralsund.

Leptopa Zett.

filiformis Zett., 6, Stolp: Reitz, Veddin; Rügenwalde.

Amaurosoma Beck.

armillatum Zett., 6, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Veddin; Rügenwalde (Riedel).

cinerellum Zett., 5, Rügenwalde (Riedel); Stettin (Schroeder).

fasciatum Meig., 5-6, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin; Alt-Belz b. Köslin; Stralsund.

flavipes Fll., 4-5, Stolp: Stolpetalgebiet, Veddin.

inerme Beck., 4-5, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen.

nigrifrontatum Beck., 5, Stolp.

nutans Beck., 5, Stolp: Stolpetal, Reitz, Kl.-Strellin, Arnshagen.

tibiellum Zett., 5, Stettin: Wussow, Finkenwalde.

Scopeumatinae.

Scopeuma Meig.

inquinitum Meig., 4-5, Stolp: Stolpetalgebiet; Rügenwalde; Stettin: Julo, Wussower Försterei; Stralsund. Häufig an Weidenblüten.

islandicum Beck., 5, Stolp: Stolpmünde, auf den Molendämmen und in Dünengelände am Auslauf.

litoreum Fll., Greifswald (Dahlbom); Stralsund.

lutarium Fbr., 6-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Neumühl, Kl.-Strellin, Stolpmünde; Stettin: Finkenwalde; Heidebrink; Stralsund.

merdarium Fbr., 4-10, an Dünger, Exkrementen und Blüten gemein.

stercorarium L., 4-10, mit der vorigen zusammen und ebenso gemein.

squalidum Meig., 4-7, Stolp: Stolpetalgebiet, Ritzow, Reitz; Greifswald; Stralsund.

download unter www.zobodat.at

suillum Fbr., 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Veddin, Stolpmünde, Potänewiesen; Stettin; Stralsund.
scybalarium L., 7-8, Stolp: Auckerwiesen, Stolpmünde; Rügenwalde; Stralsund.

Coniosternum Beck.

obscurum Fll., 5-8, Stolp: Stolpewiesen, Ritzow, Lossiner Mühle, Stolpmünde; Stettin: Finkenwalde; Stralsund.
tinctinerve Beck., 3-10, Stolp: Menkenbruch, Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin.

Norelliinae.

Norellia R. D.

spinimana Fll., 5-8, Stolp: Stolpetalgebiet; Stettin: Hökendorf, Julo; Greifswald; Stralsund.
liturata Meig., 23. 5. 13, Stolp: Kl.-Strellin.

Achantolena Rd.

spinipes Meig., 7, Stralsund (Heckel).

Hydromyzinae.

Hydromyza Fll.

livens Fbr., 5-9, Stolp: Auf den Blättern von Nuphar überall verbreitet; Rügenwalde, ebenso (Riedel); Stralsund.

Ernoneura Beck.

argus Zett., 8. 99, Neustettin, an den Ufern des Lubow-Sees in großer Zahl (Riedel).

Pogonota Zett.

hircus Zett., 6-8, Stolp: Sumpfgebiete des Stolpetals, Schwuchow, Stolpmünde, in den Jahren 1911-14 stellenweise häufig; Tarmen, Kr. Neustettin.
barbata Zett., 6-7, Stolp: Menkenbruch und Sumpfgebiet des früheren Schwarzen Sees bei Lindow (Stolpmünde), Sumpf am Bahnhof Schwuchow, je 1 ♂, doch sicher nur eine Abart von der vorigen.

Acanthocnema Beck.

nigrimana Zett., 20. 6. 19, Kl.-Strellin.

Tricopalpus Rd.

punctipes Meig., 5-8, Stolp: Stolpewiesen, Stolpmünde, Salesker Moor, Potänewiesen; Stettin: Julo, Nemitz, Garzer Schrey; Greifswald; Stralsund.
fraternus Meig., Neustettin (Riedel); Greifswald (Dahlbom).

Spathiophora Rd.

fascipes Beck., 5-8, Stolp: Stolpeufer, zwischen Wasserschwaden, Stolpmünde, am Auslauf und an quelligen Stellen zwischen Dünengräsern, Freichow-Mündung; Rügenwalde.

download unter www.zobodat.at

hydromyzina Fll., 6-10, mit der vorigen zusammen, aber im Binnenlande häufiger.

Clidogastrinae.

Gimnomera Rd.

tarsea Fll., 6-7, Stolp: Stolpewiesen; Rügenwalde.

Clidogastra Mcq.

nigrita Fll., 6-7, Stolp: Kl.-Strellin; Alt-Belz b. Köslin.

Oestridae.

[St. E. Z. 1911, 361; 13, 160.]

Die Fliegen sind selten und nur durch Zucht in größerer Menge zu erhalten. Manche schwärmen in der Sonne auf kahlen Berggipfeln, andere sitzen auf dem Boden im Grase, in Felsenritzen und Mauerlöchern. Man trifft sie besonders da, wo die Wohntiere leben, namentlich auch bei Wildfutterstellen. Die Larven sind Schmarotzer bei unsern Wiederkäuern, Rindern, Schafen und Geweihtieren. Sie leben in den Nasen-, Rachen- und Stirnhöhlen oder verursachen unter der Haut Dasselbeulen, und danach unterscheidet man „Nasenbremsen" und „Dasselfliegen".

Ostrinae.

Ostrus L.

ovis L., 7-9, Tarmen b. Pöhlen, Kr. Neustettin (Hintze); auch Triepke hat die Art in Pommern beobachtet.

Cephenomyiinae.

Pharingomyia Schin.

picta Meig., 12.7.12, 1 ♀ auf dem Turm des Jagdschlosses in der Granitz (Schröder).

Cephenomyia Latr.

stimulator Clark., 7-9, Gollenturm bei Köslin; Ückermünde (Hagedorn); Jagdschloß in der Granitz (Schröder).

Hypodermidae.

Hypoderma Latr.

diana Br., 5-6, Stolp: Loitz, Veddin, Arnshagen, Wusterwitzer Moor.

bovis L. Die Dasselbeulen der Rinder beweisen ihr Vorkommen in Pommern, von dem auch Triepke berichtet.

Muscidae (Anthomyidae).

[St. E. Z. 1917, 98-109, 292-302; 1922, 95-96; 1932, 304; 1936, 137-140. Arch. f. Nat. A. 8; 4-55. 1913. Arch. f. Nat. A. 10; 1-224. 1915. Dahl, Tierwelt Deutschlands, Teil 13. Zool. Anzeig. 1929, 273-279; 1930, 161-174; 1932, 299-306; 1934, 90-93.]

download unter www.zobodat.at

Die Fliegen zeigen in Vorkommen, Lebensweise und Entwicklung eine solche Mannigfaltigkeit, daß es notwendig wird, darüber bei den Unterfamilien oder Gattungen im besonderen zu berichten.

Muscinae.

Die Fliegen finden sich vorzugsweise auch auf Blüten, saugen und belecken aber auch alle möglichen Stoffe und spielen daher als Krankheitserreger eine bedenkliche Rolle. Im besonderen gilt dies von der Stubenfliege und ihren nächsten Verwandten, die sich außerdem noch als Schweißsauger lästig machen.

Die Larven entwickeln sich in faulenden Stoffen der verschiedensten Art und sind im letzten Stadium omnivor oder carnivor. Bei Nahrungsmangel fressen sie sich gegenseitig auf.

Musca L.

corvina Fbr., 4-10, überall auf Blüten und Blättern, aber auch an Mauern und Planken, im Freien als Schweißsauger lästig.

domestica L., die Stubenfliege, im Spätsommer in unseren Wohnungen ± gemein, in den übrigen Jahreszeiten nur vereinzelt, auch im Freien nirgends häufig.

tempestiva Fll., 5-7, Stolp: Waldkatze, Arnshagen, Brüskower Moor; Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark; Rügenwalde (Riedel); Rügen (Stein).

Orthellia R. D.

caesarion Meig., 3-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Loitz, Wusterwitzer Moor; Treptow a. R.; Stettin; Stralsund.

cornicina Fbr., 9, Greifswald (Dahlbom).

Pyrellia R. D.

cadaverina Meig., Stralsund.

cyanicolor Zett. (syn. *serena* Stein), 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Arnshagen, Wusterwitzer Moor; Schlawer Stadtwald; Treptow a. R.

serena Meig. (syn. *aenea* Stein), Treptow a. R. (Stein).

Graphomyia R. D.

maculata Scop., 5-9, überall verbreitet und nirgends selten, besonders auf Blüten.

Hypodermodes Tows.

mystacea L., 5-9, Stolp: Waldkatze, Krampe, Freichow, Stolpmünde.

Mesembrina Meig.

meridiana L., 5-9, Stolp: Stolpetalgebiet, Reitz, Arnshagen; Alt-Belz b. Köslin; Treptow a. R.

download unter www.zobodat.at

Muscina R. D.

assimilis Fll., 4-10, Stolp: Stolpetalgebiet, Kl.-Strellin, Arnshagen; Stettin; Stralsund; überall verbreitet, wenn auch nicht gemein.

pabulorum Fll., 5-9, mit der vorigen zusammen, doch seltener, besonders an Baumstämmen.

pascuorum Meig., 3-8, Stolp, an Baumstämmen und auf Blüten.

stabulans Fll., 4-10, überall gemein, auch oft in Stuben an Fenstern lästig.

Morellia R. D.

aenescens R. D., 5-8, Stolp: Veddin, Sumpfwiesengebiet am Lebasee; Treptow a. R.; Stralsund; Zirkow auf Rügen.

hortorum Fall., 5-8, überall verbreitet und gemein.

Stomoxydinae.

Die „Wadenstecher" sind in beiden Geschlechtern Blutsauger bei Menschen und Vieh und können dabei Krankheitserreger der verschiedensten Art übertragen. Die Larven entwickeln sich in Dünger.

Stomoxys Geoffr.

calcitrans L., 6-10, überall gemein, besonders lästig in Wohnungen.

Haematobia R. D.

stimulans Meig., 5-9, überall verbreitet, doch seltener als vorige.

Lyperosia Rd.

irritans L., 6-8, Stolpmünde; Treptow a. R.; Rügen; besonders auf weidenden Rindern.

Phaoniinae.

Phaoniini.

Die Fliegen sind ausgesprochene Pollenfresser und Honigsauger. Doch gibt es unter ihnen auch solche, die auf Exkrementen, auf Blättern und an Baumstämmen zu finden sind.

Die Larven entwickeln sich meist in feuchter Humuserde und führen eine räuberische Lebensweise.

Polietes Rd.

lardaria Fbr., 5-10, überall verbreitet, besonders an Baumstämmen und auf Exkrementen.

Pseudomorellia Rgd.

albolineata Fll., 5-8, Stolp: Waldkatze, Horster Teiche, Scharfenstein, Stolpmünde; Veddin; Treptow a. R.; Stralsund.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitung Stettin

Jahr/Year: 1936

Band/Volume: 97

Autor(en)/Author(s): Karl O.

Artikel/Article: Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera. 318-330