

3. Beitrag zur Heterocera-Fauna von Brasilien

Eusceptis koehleri TODD, 1966 erstmals in Brasilien nachgewiesen

(Lepidoptera, Noctuidae, Acontiinae)

Hubert Thöny

Rua Sebastiao Pena 118 A, Cep. 39827 Potè, Minas Gerais, Brasilien

Abstract

Eusceptis koehleri TODD, 1966 are recorded the first time for Brazil. The Exemplars and there Genitals are figured.

Zusammenfassung

Eusceptis koehleri TODD, 1966 wird erstmals für Brasilien gemeldet. Die Falter und deren Genitalien werden abgebildet.

Im Zuge meiner Sammeltätigkeit seit Ende 1995 in Potè, MG, konnte ich am 15.11.1995, sowie fast genau ein Jahr später, am 15.10.1996 mein Sammler Roney Alves dos Santos je ein Exemplar aus der Gattung *Eusceptis* HÜBNER, 1823 in Potè fangen. Ein weiteres Exemplar konnte ich am 16.11.1996 im Bundesstaat Espirito Santo, St. Leopoldina, Umg. Dorf Tirol in 650 m Höhe fangen. Es war mir zunächst nicht möglich die Tiere zu bestimmen, erst das Studium der Arbeit von TODD, 1966 über die Gattung *Eusceptis* HÜBNER, 1823 führte zu einem Ergebnis. Die gefangenen Falter aus Potè sind ein Männchen und ein Weibchen, das Exemplar aus Espirito Santo ist ein Männchen von *Eusceptis koehleri* TODD, 1966. Todd lagen bei seiner Beschreibung ein Männchen (Holotyp) und drei Weibchen (Paratypen) vor, die in Argentinien gefangen wurden. Die Verbreitung beschränkte sich bisher nur auf den Typenfundort.

Meines Wissens wurden seit der Beschreibung von Todd keine weiteren Funde gemeldet, bzw. publiziert. Die gefangenen Exemplare sind somit das fünfte und sechste sowie das siebte bisher bekannt gewordene Stück und gleichzeitig die Erstfunde für Brasilien. Die Funde hier im Bundesstaat Minas Gerais sowie in Espirito Santo erweitern das Verbreitungsgebiet dieser Art erheblich. (Abb.5). *Eusceptis koehleri* TODD, 1966 kommt in Pote synpatrisch mit *Eusceptis extensa* STRAND, 1913 vor. Von letzterer konnten bisher drei Exemplare gefangen werden.

Abb. 3





Abb 4

Abb. 1: *Eusceptis koehleri*-♂

Abb. 2: *Eusceptis koehleri*-♀

siehe Farbtafel 1, Seite 21

Abb. 3: ♂-Genital von *E. koehleri*

Abb 4: ♀-Genital von *E. koehleri*

Abb. 5: Karte

A: Typenfundort

B: Potè, Minas Gerais

C: Dorf Tirol, Espirito Santo




Abb. 5

Literatur

POOLE R.W., 1988

Lepidopterorum Catalogus (New Series), Fasc.118, Noctuidae, part.1 und 2, Brill. Flora & Fauna Publications, Leiden, NewYork, Kopenhagen, Köln.

THÖNY S. & H. 1994

Beitrag zur Heterocera-Fauna von Brasilien/Minas Gerais/Poté, facetta, Ber. Ent. Ges. Ingolstadt e.V. Heft Nr. 9, pp.7-18

TODD E.L., 1966

Noctuid moths of the Genus *Eusceptis* HÜBNER

Proc. U.S. Nat. Mus. Smiths. Inst. Wash. D. C. Vol. 119, Nr. 3546, pp.1-22

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Thöny Hubert

Artikel/Article: [§. Beitrag zur Heterocera-Fauna von Brasilien. Eusceptis koehleri Todd, 1966 erstmals in Brasilien nachgewiesen \(Lepidoptera, Noctuidae, Acontiinae\) 2-3](#)