

Ein interessanter Fund von *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)

(*Lepidoptera, Diurna, Pieridae*)

FRANZ FLOCK

Abstract:

An abnormal form of scales by *Pieris rapae* (L.) is described.

Zusammenfassung:

Es wird eine abnormale Flügelbeschuppung eines Freilandfundes von *Pieris rapae* (L.) beschrieben.

Am 04. April 2001 sah ich einen Weißling in meinem Garten fliegen, der mir sofort auffiel. Er hatte nicht die übliche weiße Färbung, sondern schien matt hellgrau zu sein.

Als dieser auf einer Blüte saß, konnte ich dann den Falter leicht fangen und aus der Nähe betrachten.

Es handelte sich um ein Männchen von *Pieris rapae* (L.). Die Oberseiten der Vorder- und Hinterflügel waren fast ohne weiße Beschuppung und daher sehr durchsichtig. Nur an den Adern, an den Flügelrändern und an der Wurzelbasis war eine leichte weiße Beschuppung sichtbar.

Die schwarzen Flecke auf beiden Vorder- und Hinterflügeln waren kaum zu erkennen. Ebenso die dunkle Apexbeschuppung.

Die oben beschriebene Flügelbeschuppung wurde fotografisch festgehalten.

In meinen vielen Jahren entomologischer Tätigkeit hatte ich schon mit sehr vielen Weißlingarten zu tun. Jedoch so ein Exemplar ist mir noch nie begegnet, nicht bei Zuchten und auch nicht im Freiland. Literaturstellen zu derartigen Farbabweichungen waren nicht zu finden.

Franz Flock, Waldeysenstraße 15, D-85057 Ingolstadt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Flock Franz

Artikel/Article: [Ein interessanter Fund von Pieris rapae \(Linnaeus, 1758\) \(Lepidoptera, Diurna, Pieridae\) 3](#)