

**Die Tagfalter-Fauna (Rhopalocera und Hesperiiidae)
von Baar-Ebenhausen, Kreis Pfaffenhofen/Ilm, Bayern.
Ebner Kurt**

Einleitung:

Das Beobachtungsgebiet liegt ca. 10 km südlich von Ingolstadt in der Gemarkung der Gemeinde Baar-Ebenhausen. Es wird im Süden und im Westen durch die Bahnlinie München/Treuchtlingen, im Osten durch den Geisenfelder Forst und im Norden durch Ebenhausen-Werk begrenzt. Das Gebiet wird geprägt durch Kulturland im Wechsel mit einzelnen Brachflächen und Gehölzen. In den zurückliegenden Jahrzehnten bus heute wurde die Landschaft durch Kiesabbau sehr verändert.

Die aufgelisteten Tagfalter wurden von mir während des Zeitraumes von 1981 bis heute im Beobachtungsgebiet festgesellt. Die Nomenklatur erfolgt nach Higgins/Riley. Die verwendeten Abkürzungen bedeuten: (vs)=verschollen, (s)=selten, (l)=lokal, (v)=vereinzelt, (h)=häufig.

Artenliste:

01	<i>Papilio machaon</i> L.	(v)
02	<i>Pieris brassicae</i> L.	(v)
03	<i>Artogeia rapae</i> L.	(h)
04	<i>Artogeia napi</i> L.	(h)
05	<i>Anthocharis cardamines</i> L.	(v)
06	<i>Gonepteryx rhamni</i> L.	(v)
07	<i>Colias hyale</i> L.	(v)
08	<i>Leptidea sinapis</i> L.	(ls)
09	<i>Erebia medusa</i> Schiff.	(lv)
10	<i>Melanargia galathea</i> L.	(lv)
11	<i>Pararge aegeria</i> L.	(lv)
12	<i>Aphanantopus hyperanthus</i> L.	(h)
13	<i>Maniola jurtina</i> L.	(h)

14	<i>Coenonympha arcania</i> L.	(vs)	
15	<i>Coenonympha pamphilus</i> L.	(v)	
16	<i>Apatura lilia</i> Schiff.		(s)
17	<i>Vanessa atalanta</i> L.	(v)	
18	<i>Cynthia cardui</i> L.	(v)	
19	<i>Inachis io</i> L.	(h)	
20	<i>Agrias urticae</i> L.	(h)	
21	<i>Polygonia c-album</i> L.	(v)	
22	<i>Aeaschnia levana</i> L.	(v)	
23	<i>Brenthis ino</i> ROTT.	(l)	
24	<i>Issoria lathonia</i> L.	(v)	
25	<i>Argynnis paphia</i> L.	(v)	
26	<i>Callophrys rubi</i> L.	(s)	
27	<i>Thecla betulae</i> L.	(s)	
28	<i>Lycaena phlaeas</i> L.	(v)	
29	<i>Cupido minimus</i> FUESSL.	(ls)	
30	<i>Polyommatus icarus</i> ROTT.	(v)	
31	<i>Maculinea nausithous</i> BRGSTR.	(l)	
32	<i>Celestrina argiolus</i> L.	(v)	
33	<i>Pyrgus malvae</i> L.	(s)	
34	<i>Carterocephalus palaemon</i> PALL.	(v)	
35	<i>Ochlodes venatus</i> BREMER U. GRAY	(v)	
36	<i>Thymelicus lineola</i> O.	(v)	

Diskussion:

Stark gefährdet im Beobachtungsgebiet sind die Nr 23,31 und 14.
 *Die Nr 23, *Brenthus ino* ROTT. lebt lokal in einer feuchten Wiese an einem Badeweiher. Sein Lebensraum verbuscht langsam. Der Bläuling *Maculinea nausitouhus* BERGSTR. Nr 31 lebt in Straßengraben auf Blüten des Großen Wiesenknopfes. In den letzten Jahren ist ein stetiger Rückgang der Art eingetreten. Situationsverschärfend wirken hier meines Erachtens alljährlich durchgeführte Mähaktionen des Straßenrandes und der Grabenböschung.

Die Nr 14, *Coenonympha arcania* L. wurde Mitte Juni 1981 am Bahndamm der Linie München/Treuchtlingen das letzte Mal beobachtet, seitdem ist die Art verschwunden !

Bestürzend ist außerdem die relativ geringe Anzahl von vorkommenden Arten. Hier wird der Preis, den der andauernde Landverbrauch fordert , deutlich.

Die Schriften :

Tagfalter Europas und Nordwestafrikas , L. G. Higgins / N. D. Riley , Verlag Paul Parey , Hamburg und Berlin 1971

Autor :

Kurt Ebner , 8076 Baar-Ebenhausen , Paarstraße 45

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [4_1992_1](#)

Autor(en)/Author(s): Ebner Kurt

Artikel/Article: [Die Tagfalter-Fauna \(Rhopalocera und HesperIIDae\) von Baar-Ebenhausen, Kreis Pfaffenhofen/Ilm, Bayern 17-19](#)