

Zur Kenntnis der Noctuidae-Fauna Borneo's
K. Martini / H. Thöny
(Lep. Noctuidae)

Erster Teil:

Abstract:

A list of Noctuidae - collected 1987 to 1993 in Borneo - will be published in several issues.

New or less known species are illustrated by colour photos.

This first part shows four species, which are proved as new for Borneo:

Trisuloides sericea BUTLER 1881

Ramadasa plumbeola (WARREN 1916),

Didigma viridifascia (SWINHOE 1902)

Plusia rubriflabelata (A.E. PRAUT 1921)

Mudaria sp. shown by Holloway (Moths of Borneo / Part 12 pl. 6 number 7) is determined as *M. luteileprosa* Holloway 1990, and pictures are shown the first time of the following species:

Ortopla iarbasalis WALKER, 1859

Ramadasa plumbeola (WARREN 1916)

Zusammenfassung:

Es werden vier Arten erstmals für die Fauna Borneo gemeldet:

Trisuloides sericea BUTLER 1881

Ramadasa plumbeola (WARREN 1916),

Didigma viridifascia (SWINHOE 1902)

Plusia rubriflabelata (A.E. PRAUT 1921)

Bei der *Mudaria* sp. welche in Moths of Borneo von Holloway, Part 12 Tafel 6 Nr. 7 abgebildet wurde handelt es sich um das W. von *M. luteileprosa* Holloway 1990.

Desweiteren werden erstmals Abbildungen von folgenden Arten veröffentlicht.

Ortopla iarbasalis WALKER, 1859

Ramadasa plumbeola (WARREN 1916)

Von folgenden Arten finden sich in der Literatur leider nur sehr ungenaue Abbildungen, deshalb werden sie erneut abgebildet.

Risoba jucunda (WALKER)

Risoba viridata (BETHUNE-BAKER 1906)

Risoba chlora (HAMPSON, 1912)

Risoba diversipennis (WALKER)

Risoba glauca HAMPSON

Macrobarasa xantholopha (HAMPSON, 1896)

Einleitung:

Nordborneo, Sabah / Malaysia ist geprägt vom montanen Regenwald mit äquatorialem Regenlima und maximalen Niederschlägen im April und November.

Vom Kinabalu - Massiv, ganz im Norden (Mt. Kinabalu 4125m) ausgehend zieht sich entlang der Westküste die Crocker Range mit Höhen von 600 - 2300m. Trotz des intensiven Holzeinschlages, dem die meisten der etwa 300 als "Timber" vermarkteten großen Baumarten zum Opfer gefallen sind, verblieb eine weitgehend geschlossene Walddecke mit Resten ursprünglichen Regenwaldes in Schluchten, an Steilhängen und in den letzten Jahren ausgewiesenen Waldreservaten.

Bei mehreren kurzen Reisen in dieses Gebiet konnten in den letzten Jahren bei relativ geringer Gesamtstückzahl unter anderem viele Noctuidae-Arten gesammelt werden, darunter eine Reihe von Erstnachweisen, und wohl auch neue Arten.

Die Veröffentlichung der Artenliste wird in mehreren Abfolgen geschehen und jeweils durch Farbfotos insbesondere der Arten belegt, von denen bisher keine Abbildungen veröffentlicht sind. Der erste Teil beginnt mit "überschaubaren" Gattungen und enthält 137 Species, davon werden 49 Arten auf 2 Farbtafeln abgebildet.

Artenliste:

Agaristinae:

Mineusemia vittata BUTLER, 1875,

Ann. Mag. nat. Hist. (4) 15: 143,

Verbr.: Vietnam, Malaysia, Java, Sumatra, Borneo, Sunda-Ins.

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w

Mineusemia postica (WALKER, 1862),

Jl. Linn. Soc. (Zool.) 6: 86, (Aegocera),

Syn.: tara SWINHOE, 1892,

Verbr.: Indochina, Vietnam, Malaysia, Borneo, Sumatra,

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 20.4.1990 1w 2m.

Mineusemia perakana ROTHSCILD, 1896,

Novit. zool. 3: 50,

Syn.: paracana auct. nec ROTHSCILD;

Verbr.: W-Malaysia, Singapore, Borneo, Sumatra, Java, Philippinen

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 17.4.1993 2m.

N-Borneo/Crocker-Range/Golden Hill 1400m 14.4.1993 1m

Sarbanissa transiens (WALKER, 1856)

Taf. 1 Abb. 3

List. Spec. lep. Ins. B.M. 7.: 1588, (Eusemia),

Syn.: aegoceroide (FELDER, 1861), (Agarista),

Verbr.: China, NO-Himalaya, Sikkim, Nepal, Indien, Assam, Thailand,

Borneo, Burma, Malaysia, Bali, Sumatra, Java, Philippinen,

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 17.4.1993 7m 3w

Sarbanissa catacoloides (WALKER, 1862),

J. Linn. Soc. Zool. 6: 87, (Phaegorista),

Verbr.: Nepal, NO-Himalaya bis Sunda-Ins., Borneo, Lombok,

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 17.4.1993 3m 2w.

Sarbanissa albifascia (WALKER, 1865), Taf. 1 Abb. 2
List. Spec. lep. Ins. B.M. 33: 771, 933,
Verbr.: China, Indien, Burma, Sumatra, Andamanen,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 22.4.1990 1m

Scrobiger a hesperioides (WALKER, 1862),
J. Linn. Soc. (Zool.) 6: 86, (Eusemia),
Verbr.: Borneo,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 25.4.1990 1m

Pantheinae:

Anepholcia pygaria (WARREN, 1912)
Novit. Zool. 19: 2, (Trisuloides)
(Holot.: W-Sumatra, Benkoelen, BMNH, Lond.)
Verbr.: Malaysia, Sumatra, Borneo,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 17.4.1993 11m 1w.
N-Borneo/Crocker-Range/Golden Hill 1400m 15.5.1985 1m

Trisuloides sericea BUTLER, 1881 Taf. 1 Abb. 1
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 7: 36,
(Synt.: Indien, Meghalaya, W-Bengalen, BMNH, Lond.)
Syn.: catocalina MOORE, 1883,
Proc. Zool. Soc. Lons. 1883: 17,
(T.: Indien, W-Bengalen, Darjiling, BMNH, Lond.)
Verbr.: Pakistan, Himalaya, China, Japan, Indien, Assam, Nepal,
Sikkim, Kaschmir, Vietnam, Taiwan, SO-Asien,
Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1m
Soweit bisher bekannt NEU für Borneo. ERSTNACHWEIS!

Trichosea mjobergi (PROUT, 1926)
Sarawak Mus. J. 3: 231, (Dipthera)
(Holot.: Borneo, Sarawak, Mt. Murud, BMNH, Lond.)
Verbr.: Borneo,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 25.4.1990 1m 1w

Baorisa hieroglyphica MOORE, 1882, Taf. 2 Abb. 1
Lepid. Atkinson: 133, Taf. 4: 14,
(T.: Indien, W-Bengalen, Darjiling, MNHU, Berlin)
Verbr.: Nepal, Indien, Assam, Indochina, Philippinen, Sumatra, Java,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
N-Borneo/Keningau 800m 5.4.1987 1w

Acronictinae:

Triaena rubiginosa (WALKER, 1862)
Jl. Linn. Soc. (Zool.) 6: 178, (Acronycta)
(T.: Borneo, Sarawak, UM, Oxford)
Verbr.: Sumatra, Borneo, Sunda-Ins.,
Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1993
1m 4w

Corythurus nocturnus HAMPSON, 1893, Taf. 2 Abb. 3
Ill. typ. Spec. Lep. Het. B.M. 9: 27, 113, Taf. 65: 4, 10,
(Synt.: Sri-Lanka, Colombo, Udagama, BMNH, Lond.)
Verbr.: Sri Lanka, Borneo,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/Apin-Apin 950m 17.4.1993 6w2m

Plataplecta pruinosa (GUENEE, 1852)
 Hist. Nat. Ins. (Lép.) 5: 53, (Acronycta)
 (Synt.: Indonesien, Bangladesh, BMNH, Lond.)
 Syn.: *soluta* (WALKER, 1865)
 List. Spec. lep. Ins. B. M. 33: 358, (Acronycta)
 (Holot.: Indien, N-Hindustan, BMNH, Lond.)
consanguis (BUTLER, 1878)
 Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 4: 358, (Acronycta)
 (T.: Japan, Yokohama, BMNH, Lond.)
asiatica (POUJADE, 1888)
 Bull. Soc. ent. Fr. 1888: 20, (Acronycta)
 (Holotype: Tibet, Mou-pin, MNHN, Paris)
albiorbis (HAMPSON, 1909)
 Cat. Lep. Phal. B. M. 8: 74, (Acronycta)
 (Synt.: Sri Lanka, Pundaloya, BMNH, Lond.)
 Bemerk.: ev. b. spec.
crenulata (BETHUNE-BAKER, 1906)
 Novit. Zool. 13: 198, (Acronycta)
 (T.: Neu Guinea, Kebea Range, BMNH, Lond.)
 Verbr.: SO-USSR, Amur, Ussuri, China, Tibet, Japan, Taiwan, Himalaya,
 Nepal, Indien, Sikkim, Assam, Kaschmir,
 Burma, Taiwan, Malaysia, Java, Borneo, Neu Guinea,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1993
 2m 1w

Craniophora malesiae HOLLOWAY, 1989,
 Moths of Borneo, 12: 105, Taf. 2,
 (Holot.: Borneo, Brunei, BMNH, Lond.)
 Verbr.: NO-Himalaya, Borneo, Java, Sunda-
 Ins., Sulawesi, Bismarck-Ins.,
 Neu-Guinea, Philippinen, NeuKaledonien, Australien,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m

Hadenidae:

Aletia albomarginata (WILEMAN & WEST, 1920)
 Entomologist, 53(685): 122, (Cirphis)
 (Holot.: Philippinen, Luzon, Benguet, BMNH, Lond.)
 Syn.: *albomarginalis* (WILEMAN & WEST, 1928)
 Ent. Rec. J. L. Var. 40(10): 139, (Cirphis)
 (Holot.: Philippinen, Luzon, Benguet, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Philippinen, Borneo, Java, Taiwan,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1m

Aletia reversa MOORE, 1884,
 Lepid. Ceylon, 3: 6, Taf. 144: 5,
 (T.: Sri Lanka, BMNH, London)
 Syn.: *fortior* (WARREN)
 Verbr.: China, Himalaya, Indien, Assam, Sri Lanka, Java,
 Philippinen, Borneo, Neu Guinea, Buru, Solomon-Ins.,
 Australien,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1m

Aletia calorai HOLLOWAY, 1989,
 Moths of Borneo, 12: 85, Taf. 2,
 (Holot.: Brunei, Ulu Temburong, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo, Brunei,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1m 1w

Aletia radiata (BREMER, 1861)

Bull. Acad. imp. Si. St. Petersburg, 3: 48, (Leucania)

(T.: SO-Sibirien, Ussuri, 21, St. Petersburg.)

Verbr.: O-Sibirien, Ussuri, China, Korea, Kurilen, Japan, Indien,
Pakistan, Taiwan, Sri Lanka, Sunda-Ins., Philippinen, Sulawesi,
Malaysia, Borneo, Neu Guinea bis Australien,
Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1m

Acantholeucania yu (GUENZÉ, 1852)

Hist. Nat. Ins. (Lép.) 5: 79, (Leucania)

(Holot.: Philippinen, Manila)

Syn.: *exempta* (WALKER, 1857)

List. Spec. lep. Ins. B. M. 11: 710, (Leucania)

(Holot.: Sri Lanka, BMNH, Lond.)

costalis (MOORE, 1877) nec WALKER, 1856,

Proc. Zool. Soc. Lond. 1877: 603, Taf. 59: 11, (Cirphis)

(T.: Andamanen-Inseln, BMNH, Lond.)

Verbr.: S-China, S-Japan, (Ryuku), Indien, Sikkim, Nepal, Burma,
Sri Lanka, Taiwan, Singapore, Borneo, Philippinen, Neu Guinea,
Fiji-Ins., Tonga, Neue-Hebriden, Andamanen, Loochoo-Ins.,
Solomon-Ins.,

Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 5.1.1992 1m

Xipholeucania nabalua (HOLLOWAY, 1976)

Moths of Borneo: 8, Taf. 3: 32, (Leucania)

(Holot.: Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu, BMNH, London)

Verbr.: Borneo, Philippinen,

Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1993 1m

Euteliniinae:

Anuga rotunda HOLLOWAY, 1976,

Taf. 1. Abb. 15

Moths of Borneo: 17, Taf. 6: 70,

(Holot.: Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu, BMNH, Lond)

Verbr.: Borneo,

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m

Anuga kobesi HOLLOWAY, 1985,

Taf. 1 Abb. 13

Malay. Nat. J. 38: 208, Taf. 2, (Anuga)

(Holot.: Borneo, Sabah, BMNH, Lond)

Verbr.: Borneo, Sunda-Ins., (fehlt auf Bali)

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m

Anuga fida SWINHOE, 1902,

Taf. 1 Abb. 14

Ann. Mag. nat. Hist., (7) 9: 170,

(T.: Malaysia, Perak, Copping, BMNH, Lond)

Verbr.: Malaysia, Sumatra, Borneo,

Fundort: N-Borneo/Keningau 800m 15.4.1987 1w

Kobestelia obliquata (WALKER, 1864)

Taf. 1 Abb. 7

Jl. linn. Soc. Lond. (Zool.) 7: 66, (Eutelia)

Syn.: *bryochlora* (ROEPKE, 1941)

Zool. Med. Leiden, 23: 15, (Phlegetonia)

Verbr.: Borneo, Sumatra, Malaysia,

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w

- Targalla delatrix* (GUENZEE, 1852) Hist. nat. Ins. (Löp.) 6:304, (Penicillaria)
 Syn.: impleta (WALKER, 1865). List. Spec. lep. Ins. B.M. 33:822, (Eutelia)
 praetexta (FELDER & ROGENHOFER, 1874)
 Reise +st. Freg. Novara, 2(2):Taf. 111:24, (Eurhipia)
 Verbr.: Indien, Taiwan, SO-Asien, Ostindische-Ins., Sri Lanka,
 Fiji-Ins., Neu Guinea, Samoa, Neue Hebriden,
 Micronesien, Marquesas, Society-Ins., Australien, Hawaii,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w
- Targallodes vittalba* (SEMPER, 1900) Taf. 1 Abb. 6
 Die Schmett. d. Philipp. Ins. 2:534, (Penicillaria)
 Syn.: furcicauda (HAMPSON, 1905) Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 16:378, (Eutelia)
 Verbr.: Indien, Punjab, Philippinen, Borneo, Sumatra, Sulawesi,
 Neu Guinea,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 16.4.1990 1m
- Targalla suffundens* (WALKER, 1864) Taf. 1 Abb. 9
 Jl. linn. Soc. Lond. (Zool.) 7:172, (Anophia)
 Syn.: catephiformis (HAMPSON, 1902) Jl. Bombay nat. Hist. Soc. 14:212, (Eutelia)
 ekeikei BETHUNE-BAKER, 1906,
 Novit. Zool. 13:227,
 bartholeuca (TURNER, 1944) Trans. roy. Soc. S. Aust. 68:11, (Phlegetonia)
 Verbr.: Assam, Singapore, Borneo, Neu Guinea, Micronesien, Sumatra
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1993 1m
- Targalla subocellata* (WALKER, 1864) Taf. 1 Abb. 12
 Jl. linn. Soc. Lond. (Zool.) 7:67, (Eutelia)
 Verbr.: NO-Himalaya, Taiwan?, Sunda-Ins. bis
 Philippinen, Sulawesi, Molukken, Neu Guinea, Australien,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- Atacira josephinae* (HOLLOWAY, 1976) Taf. 1 Abb. 8
 Moths of Borneo: 16, Taf. 6:72, (Eutelia)
 (Holot.: Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu, BMNH, Lond)
 Verbr.: Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1993 1m
- Penicillaria meeki* (BETHUNE-BAKER, 1906) Taf. 1 Abb. 11
 Novit. zool. 13:231,
 Verbr.: Malaysia, Borneo, Sumatra, Neu Guinea, Fiji, Bismarck Ins.,
 Solomon-Ins., Samoa,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w
- Penicillaria dorsipuncta* (HAMPSON, 1912) Taf. 1 Abb. 10
 Cat. Lep. Phal. B.M. 11:13, (Bombotelia)
 Verbr.: Pakistan, orient.-und papuan. Region,
 Borneo, Philippinen, Sunda-Ins.,
 Neu Guinea, Australien, Queensland,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w

- Penicillaria simplex* (WALKER, 1865)
 List. Spec. Lep. Ins. B.M. 13:824, (Eutelia)
 Verbr.: China, Indien, Sikkim, Nepal, Taiwan, Malaysia, Sumatra,
 Borneo, Sulawesi, Ceram, Neu Guinea,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w
- Paectes poliotis* (HAMPSON, 1905)
 Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 16:371, (Ingura)
 Verbr.: Malaysia, Borneo, Sumatra,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden Hill 1400m 14.4.1993 2m
- Sarrothripinae:**
- Risoba prominens* MOORE, 1881, Taf. 1 Abb. 20
 Proc. zool. Soc. Lond. 1881:329,
 Verbr.: China, Japan, Himalaya, Indien, Nepal, Malaysia, Bali,
 Philippinen?, Borneo.
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1w
- Risoba calaina* ZERNY, 1916 Taf. 1 Abb. 17
 syn. *Risoba obliqua* A.E. Prout 1912
 Verbr.: Malaysia, Sumatra, Java, Bali, Borneo, Sulawesi,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- Risoba chlora* (HAMPSON, 1912) Taf. 1 Abb. 23
 Cat. Lep. Phal. B.M. 1912a:431
 Verbr.: Singapore, Sumatra, Borneo.
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- Risoba literata* Moore 1881 Taf. 1 Abb. 25
 Proc. zool. Soc. Lond. 1881:329,
 syn. *Heliothis albistriata* Pagenstecher 1888
 Verbr.: Indien, Nilgiris, Sumatra, Borneo.
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- Risoba jucunda* (WALKER) Taf. 1 Abb. 22
 Verbr.: Sumatra, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Kota Kinabalu/1600m 5.1.1992 2m
- Risoba viridata* (BETHUNE-BAKER 1906) Taf. 1 Abb. 18
 Novit. zool. 13:231,
 Verbr.: Neu Guinea, Dinawa, Borneo.
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- Risoba glauca* HAMPSON, Taf. 1 Abb. 19
 Verbr.: Malaysia, Sumatra, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- Risoba diversipennis* (WALKER) Taf. 1 Abb. 24
 Verbr.: China, Himalaya, Indien, Burma, Indochina, Malaysia,
 Sumatra, Java, Borneo, Sulawesi,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w

Ophiderinae:

- Schistorhynch lobata* PROUT, 1925,
Ann. Mag. nat. Hist. (9) 16: 403,
Verbr.: Malaysia, Borneo, Sumatra.
Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1m
- Premusia intrahens* WALKER, 1858, Taf. 2 Abb. 8
List. Spec. lep. Ins. B.M. 15: 1780,
Syn.: *zibellina* (FELDER & ROGENHOFER, 1874)
Reise Öst. Freg. Novara, (Zool.) 2: Taf. 112: 8, (Dysedia)
Verbr.: Borneo, Sumatra.
Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1w
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 2100m 6.6.1990 1m
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- Eucatephia muscosa* HAMPSON, 1926,
Descr. new Gen. Spec. Noct. B.M.: 63,
Verbr.: Malaysia, Borneo, Sumatra.
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 18.4.1990 1m
- Hyperlopha flavipennis* HOLLOWAY, 1976, Taf. 2 Abb. 20
Moths of Borneo: 37, Taf. 15: 179,
Verbr.: Malaysia, Borneo,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2w
- Hypocala subsatura* GUENÉE, 1852,
Hist. nat. Ins. (Lép.) 7: 75,
Syn.: *aspersa* BUTLER, 1883,
Proc. zool. Soc. Lond. 1883: 164,
limbata BUTLER, 1889,
Ill. typ. Spec. lep. Het. B.M. 7: 76, Taf. 131: 13,
tungusa (GRAESER, 1890)
Berl. ent. Z. 35: 78, (Pseudophia)
Verbr.: Pakistan, Nepal, China, Ussuri, Japan, orient. Region,
Himalaya, Indien, Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, Borneo, Java,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 4m
- Hypocala rostrata* (FABRICIUS, 1794)
Ent. Syst. 3(2): 127, (Noctua)
Syn.: *plumicornis* (GUENÉE, 1852)
Hist. nat. Ins. (Lép.) 7: 75, (Hyblaea)
plumicornis BERIO, 1955,
Boll. Soc. ent. ital. 1955: 85, fig. 2a-2c,
Verbr.: Himalaya, Afghanistan, Pakistan, Nepal bis China und
Japan, Indien, Ladakh, orient. Region, Borneo, Kenya,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w 3m
- Hypocala violacea* BUTLER, 1879,
Trans. ent. Soc. Lond. 1879: 6,
Syn.: *clarissima* BUTLER, 1892,
Ann. Mag. nat. Hist. (6) 10: 21,
Verbr.: Japan bis Indien, Nepal, Philippinen, orient. und papuan.
Region.
Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 2m 2w
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 6m
Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden Hill 1400m 14.4.1993 2m

Hypocala deflorata (FABRICIUS, 1794)

Ent.Syst.3(2):127, (Noctua)

Syn.: angulipalpis GUENÉE, 1852,

Hist.nat.Ins.(Lép.)7:75,

efflorescens GUENÉE, 1852,

Hist.nat.Ins.(Lép.)7:77,

moorei BUTLER, 1892,

Ann.Mag.nat.Hist.(6)10:21,

Verbr.: China, Ussuri, Japan, SOAsien, Nepal, Indien bis

Neu Guinea, Cap-Prov., Natal, Botswana, Transvaal, Zimbawe, Zambia,

Malawi, Zaire, Tanzania, Kenya, Uganda, Madagascar,

Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1m 1w

Belciana biformis (WALKER, 1858)

Taf.2 Abb.18

List.Spec.lep.Ins.B.M.15:1671, (Dandaca)

[Typus.v.Belciana]

(Holot.: Borneo, Sarawak, BMNH, Lond.)

Syn.: hemodi (FELDER & ROGENHOFER, 1874)

Reise Öst.Freg.Novara, 2(2):Taf.111:25, (Pandesma)

(Holot.: Indien, Himalaya, BMNH, Lond.)

Verbr.: Indien, Himalaya, Thailand, Malaysia, Sumatra, Java, Borneo

Philippinen,

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2w 3m

Belciana striatovirens (MOORE, 1883)

Taf.2 Abb.12

Verbr.: Indien, Sumatra, Malaysia, Borneo,

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1990 1m

Cyclodes omma (HOEVEN, 1840)

Tijdschr.Naturl.Gesch.Physiol.7:281, Taf.7:7, (Erebus)

Syn.: replemens (WALKER, 1858)

List.Spec.lep.Ins.B.M.14:1315, (Beregra)

Verbr.: Taiwan, Indien, Bangladesh, Burma, Sri Lanka, Malaysia, Java,

Sumatra, Philippinen,

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 20.4.1990 2m

Felinia albicola WALKER, 1858,

List.Spec.lep.Ins.B.M.14:1515,

(T.: Indien, Hindustan, OM, Oxford)

Syn.: discalis (MOORE, 1867)

Proc.zool.Soc.Lond.1867:57, Taf.7:2, (Agriopis)

(Synt.: Indien oder Bangladesh, Bengalen, BMNH, Lond.)

diplostigma (HAMPSON, 1893)

Ill.typ.Spec.lep.Het.B.M.9:24, 109, Taf.168:7, (Banra)

(T.: Sri Lanka, Pundaloya, BMNH, Lond.)

Verbr.: Taiwan, Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Borneo,

Sumatra,

Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w

Felinia spissa GUENÉE, 1852,

Hist.nat.Ins.(Lép.)7:322,

Verbr.: Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Borneo,

Neu Guinea,

Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1w

- Mecodina sumatrana* KOBES, 1984,
 Het. Sumatr. 2:30, fig. 1E/F5,
 (Holot.: Sumatra, Aek Tarum, Gunung Malayu,
 BMNH, London)
 Verbr.: Sumatra, Borneo,
 Möglicherweise Synonym mit *M. poafile*
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 1w
- Singrana diversalis* WALKER, 1965,
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 33:1113,
 Verbr.: China, Sikkim, Indien, Assam, Bangladesh, Borneo, Neu Guinea,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden Hill 1400m 14.4.1993 1m
- Bocula divergens* PROUT, 1926,
 Sarawak Mus. J1.3:235,
 (Synt.: Borneo, Sarawak, Mt. Poi, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 4.1.1992 1m
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w
- Bocula tuhanensis* HOLLOWAY, 1976,
 Moths of Borneo: 35, fig. 222, Taf. 14:173,
 (Holot. m.: Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w 1m
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 4.1.1992 1m
- Ortopla iarbasalis* WALKER, 1859, Taf. 2 Abb. 13 w
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 16:157, Taf. 2 Abb. 14 m
 Verbr.: Borneo, Sumatra.
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 8m
 Fundort: Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 6m
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden Hill 1400m 14.4.1993 7w
- Lineopalpa horsfieldi* GUENÉE, 1852, Taf. 1 Abb. 21/26
 Hist. nat. Ins. (Lép.) 6:291, Taf. 14:2,
 Syn.: strigocrenulata (BETHUNE-BAKER, 1906)
 Novit. zool. 13:239, (Paragonitis)
 Verbr.: Bhutan, Nepal, Assam, Indien, Sumatra, Java, Luzon,
 Philippinen, Sulawesi, Borneo, Neu Guinea, Ceram,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden Hill 1400m 14.4.1993 3m
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 18.4.1990 1m
- Avitta quadrilinea* (WALKER, 1864)
 J. Proc. Linn. Soc. (Zool.) 7:171,
 (T.: Borneo, Sarawak, UM, Oxford)
 Syn.: completa (ROTHSCHILD, 1915)
 Lep. Brit. Ornith. Union, Exped. New Guinea: 61, (Imelonga, -sic)
 (Holot.: New Guinea, Snow-Mts, Base-Camp, BMNH, Lond.)
 quadrilinealis: (HRE, 1867)
 Proc. zool. Soc. Lond. 1867:88, (Bocana)
 (T.: Indien, W-Bengalen, Darjiling, MNHU, Berlin)
 Verbr.: Sikkim, Indien, Assam, Malaysia, Sri Lanka, Java, Amboina,
 Neu Guinea, Borneo, Sumatra, Philippinen bis Solomon-Ins.,
 orient.-papuan Region,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 18.4.1993 2w 1m

Donda kala (PROUT,1924) Taf.2 Abb.17
 Bull.Hill.Mus.Witley,1:442,(Belciana)
 (Synt.:Sumatra, BMNH,Lond.)
 Verbr.:Nepal,Thailand,Malaysia,Sumatra,Borneo,
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 18.4.1993 3w 1m
 Fundort:Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1m

Donda sailendra (KOBES,1983) Taf.2 Abb.16
 Het.sumatr.2(1):5,fig.1E/F2,5,(Donda)
 (Holot.:N-Sumatra,Prapat, BMNH,London)
 Verbr.:Sumatra,Malaysia,Borneo,
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 18.4.1993 1w

Noctuinae:

Diarsia flavostigma HOLLOWAY,1976,
 Moths of Borneo,:7,Taf.3:28,
 (Holot.:Borneo,Sabah,Mt.Kinabalu, BMNH,Lond.)
 Verbr.:Borneo.
 Fundort:N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1993 1m

Amphipyridae:

Ancara replicans WALKER,1858,
 List.Spec.lep.Ins.B.M.15:1715,
 (Holot.:Borneo, BMNH,Lond.)
 Verbr.:Malaysia,Borneo,Sumatra,
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 15.4.1990 1w

Ancara obliterans WALKER,1858,
 List.Spec.lep.Ins.B.M.15:1715,
 (Holot.:Borneo,Sarawak, BMNH,Lond.)
 Syn.:punctiplaga WALKER,1862,
 J.Linn.Soc.(Zool.)6:191,
 (T.:Borneo,Sarawak, UM,Oxford)
 Verbr.:MO-Himalaya,Malaysia,Borneo,Sumatra,
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m

Dipterygina major HOLLOWAY,1989,
 Moths of Borneo,12:151,Taf.4,
 (Holot.:Sarawak,Gunong Nat.Park, BMNH,Lond.)
 Verbr.:Borneo,
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2m 1w
 Fundort:N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1w

Callyna semivitta MOORE,1882,
 Lepid.Atkinson:161,
 (Synt.:Indien.W-Bengalen,Darjiling,BMNH,London,
 MNHU,Berlin)
 Verbr.:China,Indien,Taiwan,Borneo.
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2m 1w

Phlogophora emphanes (PROUT,1926)
 Sarawak Mus.Jl.3:241,(Trachea)
 (Holot.:Borneo,Sarawak,Mt.Murud, BMNH,Lond.)
 Verbr.:Borneo,Sarawak,
 Fundort:N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1m

- Phlogophora nigroplumbea* (WARREN, 1912)
 Novit. zool. 19:17, (Euplexia)
 (Holot.: Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu, BMNH, Lond.)
 Syn.: *melasema* (PROUT, 1926)
 Sarawak Mus. J1.3:216, (Euplexia)
 (Synt.: Borneo, Sarawak, Mt. Murud, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo, Java, Philippinen, Luzon,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 18.4.1990 1m
- Phlogophora isoscelata* (PROUT, 1926)
 Sarawak Mus. J1.3:241, (Trachea)
 (Holot.: Borneo, Sarawak, Mt. Poi, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo, Sarawak,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 2.1.1992 1m
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1993 1m
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 5.1.1992 1m
- Phlogophora triangula* (HOLLOWAY, 1976)
 Moths of Borneo: 10, taf. 4:47, (Euplexia)
 (Holot.: Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu, Power-Station, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1993 2w
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 4.1.1992 3w
- (C.) *Callopietria pulchrilinea* (WALKER, 1862)
 J. Linn. Soc. (Zool.) 6:190, (Obana)
 (T.: Borneo, Sarawak, UM, Oxford)
 Syn.: *rivularis*; HAMPSON, nec WALKER, 1858,
reticulata (PAGENSTECHE, 1884)
 Jahrb. Nass. Ver. 37:226, Taf. 6:7, (Eriopus)
 (Synt.: Indonesien, Amboina, SM, Wiesbaden)
 Verbr.: China, Taiwan, Japan, Himalaya, Nepal, Trop. Indo-Australien
 und pazif. Inseln, Indien, Assam, Burma, Sri Lanka, Java,
 Solomon-Ins., Neue Hebriden, Fijii-Ins., Borneo, Malaysia, Hainan,
 Nias, Amboina, Buru, Kei-Ins., Lusiaden, Teniber-Ins.,
 Philippinen, Thailand,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2m
- (C.) *Callopietria maillardi* (GUENÉE, 1862)
 in Maillard; Notes Ile Réunion, 2:639, Taf. 22:8, (Eriopus)
 (T.: Réunion)
 Syn.: *recurvata* MOORE, 1882,
 Lepid. Atkinson: 144,
 (Synt.: Indien, Sri Lanka, BMNH, London, MNHU, Berlin)
 Verbr.: China, Japan, Himalaya, Nepal, Taiwan, tropisches Asien,
 Cap-Verd.-Ins., ganz Afrika südl. d. Sahara, Insel Sokotra,
 Madagaskar, Comoren, Réunion, Mauritius, Indien, Sri Lanka,
 pazifische Inseln bis Samoa und Australien,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- (C.) *Callopietria repleta* ssp. *postpallida* (PROUT, 1928)
 Bull. Hill. Mus. Witley, 2:72, (Eriopus)
 (Synt.: Indonesien, Sumatra, Mt. Corintji, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Sumatra, Borneo, Sunda-Ins.,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 2.1.1992 1m

- (C.) *Callopietria variegata* (SWINHOE, 1895)
 Trans. ent. Soc. Lond. 1895: 44, (Methorasa)
 (Synt.: Indien, Khasis, BMNH, Lond.)
 Verbr.: NO-Himalaya, Bhutan, Indien, Assam, Singapore, Java, Bali,
 Borneo, Sunda-Ins.,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 1w
- Eulepa gilvithorax* (PROUT, 1928)
 Bull. Hill Mus. Witley, 2: 70, (Perigea)
 (Holot.: Indonesien, Sumatra, Barisan Range,
 BMNH, Lond.)
 Verbr.: Sumatra, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- Eulepa fusimacula* HOLLOWAY, 1989,
 Moths of Borneo, 12: 175, Taf. 5,
 (Holot.: Brunei, Ulu Temburong, MBNH, Lond.)
 Verbr.: Brunei, Borneo, Sarawak, Philippinen?,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1w 2m
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 20.4.1990 1m
- Eulepa chlorocroa* (HAMPSON, 1908)
 Cat. Lep. Phal. B.M. 7: 583, (Eriopus)
 (Holot.: Indonesien, Sumatra, Kaban, BMNH, Lond.)
 Verbr.: NO-Himalaya, Borneo, Malaysia, Sumatra,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 3m
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1993 1m
- Ypecalphis dilectissima* (WALKER, 1858)
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 15: 1751, (Ariola)
 (T.: Borneo, Sarawak, BMNH, Lond.)
 Syn.: limacodina (FELDER & ROGENHOFER, 1874)
 Reise öst. Freg. Novara, (Zool.) 2(2): Taf. 83: 12, (Pachylepis)
 (T.: Borneo, Sarawak, BMNH, Lond.)
 Verbr.: China, Indien, Madras, Assam, Burma, Penang, Sri Lanka,
 Singapore, Borneo, Sumatra, Sula-Ins.,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 12.4.1990 1m
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 16.4.1990 1m
- Yula muscosa* (HAMPSON, 1891)
 Ill. typ. Spec. lep. Het. B.M. 7: 72, Taf. 144: 15, (Bryophila)
 (T.: Indien, Tamil-Nadu, Nilgiris, BMNH, Lond.)
 Syn.: ocellata (PROUT, 1924)
 Bull. Hill Mus. Witley, 415, (Risoba)
 (Synt.: Indonesien, SW-Sumatra, Baraisan Range,
 BMNH, Lond.)
 impray (HAMPSON, 1906)
 Jl. Bombay nat. Hist. Soc. 17: 472, (Diphthera)
 (Holot.: Indien, Kerala, Travancore, Pirmad,
 BMNH, Lond.)
 Verbr.: Indien, Assam, Madras, Sumatra, Java, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 3m

- Borbotana nivifascia* WALKER, 1858,
 List.Spec.lep.Ins.B.M.15:1651,
 (Holot.:Borneo,Sarawak, BMNH,Lond.)
 Syn.:*eburneifera* (WALKER,1864)
 Proc.linn.Soc.(Zool.)7:57,(Choluata)
 (T.:Borneo,Sarawak, UM,Oxford)
leucographa (SNELLEN,1877)
 Tijdschr.Ent.20:70,(Heterochroma)
 (Synt.:Indonesien,Sumatra, RNH,Leiden)
 Verbr.:China,Burma,Malaysia,Borneo,Sumatra,
 Sunda-Ins.,Molukken bis Solomon-Ins.,
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2m
- Lignispalta incertissima* (BETHUNE-BAKER,1906)
 Novit.zool.13:209,(Bagada)
 Syn.:*multicolor* (WARREN,1912)
 Novit.zool.19:23,(Euplexia)
ochrea (WARREN,1913)
 in Seitz;11:145,(Euplexia)
acrosphena (TURNER,1943)
 Mem.Queensland Mus.12:113,(Spodoptera)
 Verbr.:China,Malaysia,Borneo,Sulawesi,Neu Guinea,Australien,
 Queensland
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
 Fundort:N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 2m
 Fundort:N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 5.1.1992 1m
- Bagada labi* HOLLOWAY,1990,
 Moths of Borneo,12:196,Taf.6,
 (Holot.:Brunei,Ulu Temburong, BMNH,Lond.)
 Verbr.:Borneo,Brunei,Java,
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m 2w
 Fundort:N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 1m 1w
- Bagada lignigera* (WALKER,1864)
 Jl.Proc.linn.Soc.(Zool.)7:78,(Rusicada)
 (T.:Borneo,Sarawak, UM,Oxford)
 Verbr.:Borneo,Sarawak,Malaysia,
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m 4w
 Fundort:N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 4w
- Ienotrachea leucopera* (HAMPSON,1908)
 Cat.Lep.Phal.B.M.7:138,Taf.111:4,(Trachea)
 (Holot.:Borneo,Sarawak, BMNH,Lond.)
 Verbr.:Malaysia,Borneo,
 Fundort:N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w
- Ienotrachea albidisca* (MOORE,1867)
 Proc.zool.Soc.Lond.1867:59,Taf.6:17,(Hadena)
 (Lectot.:Indien,oder Bangladesch,Bengalen,
 Syn.:*nivescens* (BUTLER,1889)
 Ill.typ.Spec.lep.Het.B.M.7:58,Taf.128:2,
 (Dianthaecia,-sic)
 (Lectot.:Indien,Himachal-Prad.,Dharmasala,
 BMNH,Lond.)
 Verbr.:China,Taiwan,Indien,Himalaya,Sikkim,Nepal,Assam,Madras
 Bengalen,Bangladesh,Borneo,Sarawak,Travancor,
 Fundort:N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 2m

Trachea tessellata PROUT, 1925, Taf. 1 Abb. 16
 Ann. Mag. nat. Hist. (9) 16: 396, (Trachea?)
 (Holot.: Malaysia, Gunung Anson, Negri Sembilan, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Malaysia, Sumatra.
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1w

Clethrora pilcheri (HAMPSON, 1906)
 Fauna Brit. India, (Moth) 4: 512, (Leocyma)
 (Holot.: Indien, Sikkim, BMNH, Lond.)
 Verbr.: NO-Himalaya, Sikkim, Indien, Malaysia, Sumatra, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1w

Clethrora micropuncta HOLLOWAY, 1989,
 Moths of Borneo, 12: 153, Taf. 6,
 (Holot.: Brunei, Ulu Temburong, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo, Brunei, Sumatra,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1w

Apsarasa radians (WESTWOOD, 1848) Taf. 2 Abb. 2
 Cabinet orient. Ent.: 58, Taf. 28: 4, (Noctua, Apatele)
 (T.: Indien, Assam, BMNH, Lond.)
 Syn.: *figurata* MOORE, 1877,
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1877: 604,
 (Synt.: S-Andamanen-Ins., BMNH, Lond.)
nigrotarsata GRÜNBERG, 1911: 163,
 Ent. Rundschau, 28: 163, fig. 1,
 (Holot.: Philippinen, Mindanao, MNHU, Berlin)
dajakana GRÜNBERG, 1911: 163,
 Ent. Rundschau, 28: 163,
 (Holot.: Borneo, Sabah, Kinabalu, MNHU, Berlin)
 Verbr.: Japan, China, Nepal, Himalaya, Indochina, Vietnam, Sikkim,
 Assam, Indien, Taiwan, SO-Asien, Malaysia,
 Borneo, Sumatra, Andamanen, Sulawesi, Philippinen,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w 2w
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1650m 18.4.1990 1w 1m

Dyrzela incrassata WALKER, 1858,
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 15: 1759,
 (Synt.: Borneo, Sarawak, BMNH, Lond.)
 Syn.: *parallela* WALKER, 1865,
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 33: 787,
 (Synt.: Borneo, Sarawak, UM, Oxford)
frontalis (WALKER, 1864)
 JI. Proc. linn. Soc. (Zool.) 7: 169, (Maxilua)
 (Synt.: Borneo, Sarawak, UM, Oxford)
 Verbr.: Singapore, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 1w

Dyrzela increnulata WARREN, 1913,
 in Seitz; 11: 176,
 (Holot.: Burma, Minbu, BMNH, Lond.)
 Syn.: *bosca* SWINHOE, 1890,
 Trans. ent. Soc. Lond. 1890: 266, part.
 (Synt.: Burma, Rangoon, Bassein, Bhamo, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Burma, Malaysia, Borneo, Sumatra, Philippinen,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 1w

- Dyrzela boscoidea* HOLLOWAY, 1990,
 Moths of Borneo, 12:184, Taf. 4,
 (Holotype, Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2m
- Spodoptera litura* (FABRICIUS, 1775)
 Syst. Ent.: 601, (Noctua)
 (T.: O-Indien)
 Syn.: *elata* (FABRICIUS, 1775)
 Syst. Ent.: 612, (Noctua)
 (T.: Indien, Tranquebariae)
histrionica (FABRICIUS, 1775)
 Syst. Ent.: 613, (Noctua)
 (T.: Indien)
tasmanica (GUENÉE, 1852)
 Hist. nat. Ins. (Lép. 5:163, (Prodenia)
 (Synt.: Tasmanien)
ciliqera (GUENÉE, 1852)
 Hist. nat. Ins. (Lép. 5:164, (Prodenia)
 (T.: Indonesien, Java, BMNH, Lond.)
declinata (WALKER, 1857)
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 11:723, (Prodenia)
 (Holot.: Indien, Hindustan, BMNH, Lond.)
subterminalis (WALKER, 1856)
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 9:196, (Prodenia)
 (Synt.: Indien, Punjab, BMNH, Lond.)
glaucistriga (WALKER, 1856)
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 9:197, (Prodenia)
 (Synt.: N-Indien, BMNH, Lond.)
albisparsa (WALKER, 1862)
 J. Linn. Soc. (Zool.) 6:186, (Hamestra)
 (T.: Borneo, Sarawak, UM, Oxford)
evanescens (BUTLER, 1884)
 Mem. natn. Acad. Sci. 2:94, (Prodenia)
 (T.: Caroline-Islands, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Oman, SAsien, China, Ussuri, Tonkin, Japan, Taiwan,
 Seychellen, Indien bis Australien, Tasmanien,
 Java, Borneo, Fiji-Ins., Neu Guinea, Solomon-Ins.,
 Neue Hebriden, Neu-Kaledonien, Kermadec-Ins.,
 Micronesien, Samoa, Tonga, Gilbert-Ins., Marquesas,
 Carolinen-Ins., Pakistan, Thailand, Philippinen,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 16.4.1992 2m
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 2m
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 3.1.1992 3m
- Mudaria magniplaga* (WALKER, 1858)
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 15:1643, (Thyatira)
 (Holot.: Borneo, Sarawak, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo, Sarawak, Sumatra.
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 20.4.1990 1w
- Mudaria tayi* (HOLLOWAY, 1976)
 Moths of Borneo: 13, Taf. 5:59, (Plagideicta)
 (Holot.: Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu, Kraftwerk,
 BMNH, Lond.)
 Verbr.: Borneo, Sumatra,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 2.1.1992 2w 1m

- Mudaria major* (WARREN, 1914)
in Seitz: 11:339, (Plagideicta)
(T.: Indien, Meghalaya, Khasis, BMNH, Lond.)
Syn.: *batesoni* (HOLLOWAY, 1976)
Moths of Borneo: 13, Taf. 5:58, (Plagideicta)
(Holot.: Borneo, Sabah, Mt. Kinabalu, Bundu
Tuban, BMNH, Lond.)
confluens (STRAND, 1921) form,
Arch. Nat. Gesch. 81:161, (Hypoperigea)
Verbr.: NO-Himalaya, Indien, Malaysia, Borneo, Sulawesi, Sumatra.
Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 2.1.1992 1w
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 2200m 18.4.1990 3w
Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 1w
- Mudaria luteileprosa* HOLLOWAY, 1990, Taf. 2 Abb. 4/10
Moths of Borneo, 12:191, Taf. 6,
(Holot.: Brunei, Ulu Temburong, BMNH, Lond.)
Verbr.: Borneo, Brunei,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 2200m 17.4.1993 1mlw
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 15.4.1990 1m
Die Abb. in "Moths of Borneo" J.D. Holloway Part 12 Tafel 6
Nr. 8., als *Mudaria* sp.? ist das Weibchen von *M. luteileprosa*.
Dies konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden, da die Falter
in Kopula erbeutet, getötet und auch so präpariert wurden.
- Mudaria minoroides* HOLLOWAY, 1990,
Moths of Borneo, 12:191, Taf. 6,
(Holot.: Brunei, Ulu Temburong, BMNH, Lond.)
Verbr.: Borneo, Brunei, Sarawak,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1900m 17.4.1993 1m
- Chasaina sundana* HOLLOWAY, 1990,
Moths of Borneo, 12:188, Taf. 6,
(Holot.: Brunei, Bukit Retak, BMNH, Lond.)
Verbr.: Borneo, Brunei, Sarawak, Sumatra, Malaysia,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 17.4.1993 1m
Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 4.1.1992 1m
- Platysenta dolorosa* (WALKER, 1865)
List. Spec. lep. Ins. B.M. 32:667, (Mamestra)
(Holot.: Sri Lanka, BMNH, Lond.)
Syn.: *taprobanæ* (FELDER & ROGENHOFER, 1874)
Reise öst. Freg. Novara, (Zool.) 2: Taf. 110:3, (Hadena)
(T.: Sri Lanka, BMNH, Lond.)
dolorosa; nec (WALKER, 1965)
atronitens (DRAUDT, 1950)
Mitt. Münch. ent. Ges. 40:94, Taf. 6:17, (Perigea)
(Holot.: China, Hoeng-shan, MAK, Bonn)
Verbr.: Nepal, Japan, China, NO-Himalaya, Indien, Sri Lanka, Borneo,
Indo-austral. Tropen, Christmas-Ins., New Guinea,
Solomon-Ins., Neu Kaledonien, Fiji-Ins., Australien,
Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 4.1.1992 1m

Platysenta albigutta (WILEMAN, 1912)
 Entomologist, 45:133, (Perigea)
 (Holot.: Taiwan, Kanshirei BMNH, Lond.)
 Syn.: *ochrisquamata* (WARREN, 1913)
 Novit. zool. 19:30, (Prospalta)
 Verbr.: China, Himalaya, Indien, Japan, Taiwan, Philippinen, Borneo, Sumatra,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 17.4.1993 1m

Platysenta illecta (WALKER, 1865)
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 32:667, (Hamestra)
 Syn.: *spargens* (WALKER, 1865)
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 32:739, (Hadena)
 (Holot.: Indien, Hindustan, BMNH, Lond.)
 Bemerk.: gehört eventuell in die Gattung *Condica*,
 Verbr.: China, Indien, Nepal, Sri Lanka
 Borneo, Weihnachts-Ins., SO-Asien, Neu Guinea,
 Neu Kaledonien, Solomon-Ins., Fiji-Ins., Australien,
 Lit.: Meg 21:98/L34:1866/L4:14/L5:129, fig. 328/S3:219, Taf. 18k/L6
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 17.4.1993 1w

Prometopus asahana KOBES, 1985,
 Het. Sumatr. 2:53, fig. /A, B8, (Xylomania)
 (Holot.: N-Sumatra, Asahan, Banda Pulau-Aek-Tarum, BMNH)
 Verbr.: Sumatra, Borneo.
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 17.4.1993 1w

Prometopus albistigma (SWINHOE, 1904)
 Trans. ent. Soc. Lond. 1904:139, (Caradrina)
 (Synt.: Borneo, Sandakan, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Malaysia, Sumatra, Borneo, Singapore,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 1m

Leucocosmia nonagrica (WALKER, 1864)
 Jl. Proc. linn. Soc. (Zool.) 7:166, (Curgia)
 (T.: Borneo, Sarawak, UM, Oxford)
 Syn.: *agrotoides* (SNELLEN, 1880)
 Tijdschr. Ent. 23:77, (Amphipyra)
 (Holot.: Indonesien, Celebes, Balangnipa, BMNH, Lond.)
unipunctata (BETHUNE-BAKER, 1906)
 Novit. Zool. 11:201, (Caradrina)
 (Holot.: New Guinea, Ekeikei, BMNH, Lond.)
 Verbr.: China, Japan, Indien, Sikkim, Assam, Sri Lanka, Philippinen,
 Borneo, Malaysia, Celebes, Neu Guinea,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 1m
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 17.4.1993 1m

Checupa curvivena PROUT, 1924,
 Bull. Hill. Mus. Witley, 1:414, Taf. 22:4,
 (Synt.: Indonesien, SW-Sumatra, Mt. Korintji
 BMNH, Lond.)
 Verbr.: Indien, Sikkim, Taiwan, Malaysia, Sumatra, Java, Bali,
 Philippinen, Borneo, Sulawesi, Sunda-Ins.,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993
 5w 7m
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 1.1.1992 3m

Plusiinae:

- (Ct.) *Ctenoplusia limbirena* (GUENÉE, 1852),
Hist. Nat. Ins. (Lép.) Noct. 2: 350, (Plusia),
(Lectot.: Madagascar, MNHN, Paris),
Verbr.: S-Spanien, Portugal, Madeira, Marokko, Canar. Ins., Cap-
Verd.-Ins., Saudi Arabien, Afrika weitverbreitet,
Madagascar, Réunion, Mauritius, St. Helena, Indien, Sri Lanka,
SW-Asien, Sumatra,
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w
- Thysanoplusia orichalcea* (FABRICIUS, 1775),
Syst. Ent.: 607, (Noctua),
(T.: Indien, ?)
Syn.: chryson (ESPER, 1786),
Schwett. n. d. Nat. 4: Taf. 141: 2, (Noctua),
chrystina (MARTYN, 1797),
Psyche: Taf. 21: 56, (Noctua),
(T.: Indien, Madras, ?)
orychalcea (HÜBNER, 1803), emend.,
Samml. eur. Schwett. Noct. 4: Taf. 57: 278, (Noctua),
aurifera (HÜBNER, 1809-1813),
Samml. eur. Schwett. Noct. 2: Taf. 98: 663, (Noctua),
(T.: Europa, ?)
Verbr.: S-Frankreich, Spanien, S-England, Canar. Ins.,
Cap-Verd.-Ins., Madeira, Azoren, Griechenland, Türkei,
S-Asien, Iran, Arabien, Afghanistan, Himalaya, Pakistan, Ladakh,
Nepal, China, Japan, Indien, Sumatra, Timor, Flores,
Philippinen, Borneo, Neu Guinea, New Irland bis Australien, ganz
Afrika, Madagascar, Comoren, trop. und subtrop. Teil der alten
Welt,
Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993
2w1m
Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1400m 14.4.1990
3mlw
- Scriptoplusia nigriluna* (WALKER, 1858),
List. Spec. Lep. Ins. B.M. 12: 931, (Plusia),
(Holot.: Sri Lanka, BMNH, Lond.)
Syn.: hokowensis (CHOU & LU, 1979),
Acta ent. sinica, 22(1): 61, 71, fig. 2, (Argyrogramma),
(Holot.: China, NW coll. Agric. Shensi),
Verbr.: Japan, China, Taiwan, Indien, Assam, Sikkim, Nepal, Thailand
Sri Lanka, Andamanen, Java, Borneo, Sumatra bis Australien,
New Irland,
Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 1m
Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2m
- Plusia rubriflabellata* (A.E. PROUT, 1921)
Ann. Mag. nat. Hist. (9) 8: 25, Taf. 4: 2, (Plusia)
(Gattungszugehörigkeit noch nicht eindeutig geklärt!)
(Holot. n.: Goodenough-Ins., BMNH, Lond.)
Verbr.: Neu Guinea, Goodenough-Ins., Philippinen,
Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 1m
Soweit bisher bekannt, NEU für Borneo. ERSTNACHWEIS.

- Plusiopalpa adrasta* (FELDER & ROGENHOFER, 1874),
 Reise öst. Freg. Novara, 2(2): Taf. 110: 35, (Plusia),
 (T.: Indonesien, Celebes, BMNH, Lond.)
 Syn.: *crassipalpus* (HAMPSON, 1894),
 Fauna Brit. India, (Hoth), 2: 576, (Plusia)
 (Synt.: Indien, Indonesien, Java, BMNH, Lond.)
 Verbr.: N-Indien bis Taiwan, Philippinen, Java, Borneo, Malaysia,
 Sumatra, Neu Guinea, Bismarck-Ins., New Irland,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 1m
- (Ch.) *Chrysodeixis eriosoma* (DOUBLEDAY, 1843),
 in Dieffenbachs; New Zealand Exp. 2: 285, (Plusia),
 (Holot.: NeuSeeland, BMNH, Lond.),
 Syn.: *verticillata* (GUENÉE, 1852), part.
 Hist. Nat. Ins. (Lép.). Noct. 2: 344, (Plusia), part.,
 (Syntype: Java, MNHN, Paris),
adjuncta (WALKER, 1865),
 List. Spec. Lep. Ins. B.M. 33: 270, (Plusia),
 (Holot.: Australien, BMNH, Lond.),
integra (WALKER, 1858),
 List. Spec. Lep. Ins. B.M. 11: 931, (Plusia),
 (Type: Indien, BMNH, Lond.),
cohaerens (SCHULTZ, 1907), part.
 Int. ent. Z. 1: 32, (Plusia),
 (T.: ?, ?)
 Verbr.: Trop. und subtrop. Teil der alten Welt, Ägypten, Oman,
 Syrien, Sokotra, Afrika, China, Nepal, Korea, Japan, Indien, Bengalen
 Burma, Malaysia, Vietnam, Java, Sumatra, Borneo, New Guinea,
 Bismark-Ins., New Irland, Australien, Neu Seeland,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993
 2mlw
- (Ch.) *Chrysodeixis politus* DUFAY, 1970,
 Bull. Soc. linn. Lyon, 39: 103, 1392, or.
 (Holot.: Sumatra, ZSM, München),
 Verbr.: Sumatra, Indonesien, Java, Bali, Thailand, Philippinen,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 1950m 17.4.1993 1m
- (Ch.) *Chrysodeixis acuta* (WALKER, 1858)
 List. Spec. Lep. Ins. B.M. 12: 922, (Plusia),
 (Holot.: "Congo", BMNH, Lond.),
 Syn.: *furibatai* (OKANO, 1963),
 Insecta matsum. 25: 91, (Neoplusia),
 (Holot.: Japan, EIHU, Sapporo),
 Verbr.: Japan, Cap-Verd.-Ins., ganz Afrika bis
 Indien, Vietnam, Himalaya, Pakistan, Thailand, Ladakh, Nepal,
 Madagaskar, Comoren, Sri Lanka, Indonesien, Borneo, Sumatra, Timur,
 Flores, Neu Guinea, Australien, Philippinen, Saudi Arabien,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 1m

Sarothripinae:

- Iscadia inexacta* WALKER, 1858 Taf. 2 Abb. 21/22
 List. Spec. Lep. Ins. B. M. 13: 1102,
 Syn.: *impigens* WALKER, 1858,
 List. Spec. Lep. Ins. B. M. 13: 1103, [Gen. typ. 7. Gadirtha]
bufonia (FELDER & FELDER, 1862)
 Wien. ent. Mtschr. 6: 38, (Scolopocnema)
tinctoides (SNELLEN)
 Verbr.: S-China, Nepal, Burma, Indien bis Philippinen, Neu Guinea
 bis Bismarck-Ins., Java, Queensland, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 1m
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 3m
- Iscadia exacta* (SEMPER, 1900)
 Die Schmiett. d. Philipp. Ins., 2: 527,
 Verbr.: Philippinen, Sulawesi, Sumatra, Talaut, Neu Guinea, Borneo,
 Solomon-Ins., Queensland,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 2.1.1992 2m
- Iscadia aureovitta* (HAMPSON, 1902) Taf. 2 Abb. 23
 Verbr.: N-Indien, Malaysia, Sumatra, Java, Sulawesi, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Kota Kinabalu/1600m 5.1.1992 2m
- Macrobarasa xantholopha* (HAMPSON, 1896) Taf. 2 Abb. 9
 Fauna Brit. India, (Moths) 4: 526, (Blenina)
 Verbr.: Indien, Malaysia, Philippinen, Ceram, Buru,
 Neu Guinea, Borneo
 Fundort: N-Borneo/Kota Kinabalu/1600m 5.1.1992 1m
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1mlw
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993
 2mlw
- Characoma metalophota* (HAMPSON, 1896)
 Fauna Brit. India, (Moths) 4: 526, (Blenina)
 (Holot.: Indien, Maghalaya, Khasis, BNHN, Lond)
 Verbr.: Indien, Assam, Sri Lanka, Malaysia, Sumatra, Borneo, Java
 Philippinen,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993
 1wlw
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
- Blenina quinaria* MOORE, 1882,
 Lepid. Atkinson: 158, Taf. 5: 5,
 (T.: Indien, N-Bengalen, Darjiling, MNHU, Berlin)
 Verbr.: China, Himalaya, Sikkim, Nepal, Indien bis Borneo,
 Philippinen,
 Fundort: N-Borneo/Kota Kinabalu/1600m 5.1.1992 3m 2w
- Blenina chlorophila* HAMPSON, 1905,
 Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 16: 546,
 (Synt.: Singapore, BNHN, Lond)
 Verbr.: Taiwan, Indien, Assam, Sri Lanka, Singapore, Malaysia,
 Borneo
 Fundort: N-Borneo/Kota Kinabalu/1600m 5.1.1992 1m 1w
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 9m3w
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 2.1.1992 4m

Blenina donans WALKER, 1857,
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 13:1215,
 (Holot.: Sri Lanka, BMNH, Lond)
Syn.: grisea MOORE, 1877,
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1877:607, Taf. 60:1,
 (T.: S-Andamanen, BMNH, Lond)
laportei (FELDER & ROGENHOFER, 1874)
 Reise Öst. Freg. Novara, 2(2):Taf. 111:28, (Amphipyra?)
 (Holot.: Ceran, Amboina, BMNH, Lond)
metachrysea TURNER, 1902,
 Proc. linn. Soc. N.S. Wales, 27:89,
 (Synt.: Queensland, Townsville, ANIC, Canberra)
pannosa MOORE, 1882,
 Lepid. Atkinson: 157, Taf. 5:4,
 (Synt.: Indien, WBengalen, Darjiling, BMNH, London
 MNHU, Berlin)
triphaenopsis HAMPSON, 1905,
 Ann. Mag. nat. Hist. (7) 16:545,
 (Synt.: Singapore, BMNH, Lond)
varians HAMPSON, 1912,
 Cat. Lep. Phal. B.M. 11:414, Taf. 185:10,
 (T.: Neu Guinea, Dinawa, BMNH, Lond)
varians BETHUNE-BAKER, 1906, form,
 Verbr.: Indochina, Indien, Sri Lanka, Malaysia, Singapore,
 Philippinen, Neu Guinea, Neu Kaledonien, Andamanen,
 Amboina, Ceram, Micronesien, Loyalty-Ins., Australien,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m

Chloephorinae:

Ranadasa pavo (WALKER, 1856) Taf. 2 Abb. 11
 List. Spec. lep. Ins. B.M. 9:147, (Chasmina)
 Verbr.: China, Indien, Vietnam, Sri Lanka, Bali, Andamanen, Java,
 Philippinen, Sulawesi, Malaysia, Borneo, Timur, Flores, Sumatra.
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 8m 5w

Ranadasa plumbeola (Warren 1916) Taf. 2 Abb. 15
 Verbr.: Indien, Borneo
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
 Soweit bisher bekannt, NEU für Borneo. ERSTNACHWEIS.

Westermannia elliptica ssp. *rajata* KOBES, 1988,
 Het. Sumatr. 2(6):98, fig. 16,
 (Holot.: Sumatra, Lembah Mengirai, Kenrici Nordflanke,
 BMNH, Lond.)
 Verbr.: Sumatra, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m

Westermannia cornucopia (HAMPSON, 1891) Taf. 2. Abb. 5
 Ill. typ. Spec. lep. Het. B.M. 8:8, 61, Taf. 141:12, (Ingura)
 Verbr.: Nepal, Himalaya, Indien, Borneo.
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m

Pseudelydna xanthia HAMPSON Taf. 1 Abb. 4
 Verbr.: Indien, Malaysia, Sumatra, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2m
 Fundort: N-Borneo Sabah / Keningau 15.4.1987 1w

- Pterogonia cardinalis* HOLLOWAY, 1976, Taf. 2 Abb. 19
 Moths of Borneo: 28,
 Verbr.: Indien, Singapore, Borneo, Sumatra, Java, Bali, Buru,
 Malaysia, Neu Guinea,
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 2.1.1992 1m
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 3m
- Sinna floralis* HAMPSON, 1911, Taf. 2 Abb. 7
 Verbr.: Malaysia, Sumatra, Borneo
 Fundort: N-Borneo/Sipulut 800m 2.1.1992 1m
- Sinna calospila* WALKER, 1865, Taf. 2 Abb. 6
 List. Spec. Lep. Ins. B.M. 32: 642,
 Verbr.: Java, Sumatra, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 2w6m
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993
 1w7m
- Hylophilodes dubia* PROUT, 1926,
 Sarawak Mus. J. 3: 228,
 Syn.: orientalis; HAMPSON, 1921, nec HAMPSON, 1894,
 Verbr.: Indien, Philippinen, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1w1m
- Tympanistes fusimargo* PROUT, 1925,
 Ann. Mag. nat. Hist. (9) 16: 400,
 Verbr.: Malaysia, Borneo, Java,
 Fundort: N-Borneo/Crocker-Range/Golden-Hill 1600m 14.4.1993 2w
- Didigma viridifascia* (SWINHOE, 1902) Taf. 1 Abb. 5
 Ann. Mag. nat. Hist. (7) 9: 172, (Erizada)
 (T.: Malaysia, Perak, BMNH, Lond.)
 Verbr.: Malaysia, Borneo,
 Fundort: N-Borneo/Trus-Madi/ Apin-Apin 950m 17.4.1993 1m
 Soweit bisher bekannt, NEU für Borneo. ERSTMACHEWELS.

Dank:

An dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn Prof. L. Kobes /Göttingen für seine wertvolle Hilfe bei der Determination der Falter recht herzlich bedanken. Herrn J. de Freina /München gilt unser Dank für die Beschaffung wichtiger Literatur. Herrn G. Behounek /Deisenhofen danken wir für seine Hilfe bei nomenklatorische Fragen sowie für wertvolle Hinweise auf Literaturquellen.

Die Fotoarbeiten wurden von Herrn C. Grayer/Ingolstadt hervorragend ausgeführt.

Nicht zuletzt wollen wir uns auch bei Herrn Peter Graf Henckel von Donnersmarck sowie Alexandra und Bernd Martini für manche bei Sturm und Regen verbrachte Nacht im tropischen Bergregenwald bedanken.

Literaturverzeichnis:

- BARLOW H.S., 1982
An introduction to the moths of South-East-Asia
Malay.Nat.Soc.I-IX:1-305
- HOLLOWAY J.D., 1976
Moth of Borneo with special references to Mount Kinabalu
Sun U Book,Sdn.Berhad.:1-264
- HOLLOWAY J.D., 1985
The moth of Borneo: Part.14
Noct.:Euteliinae,Stictopterinae,Plusiinae,Pantheinae
Malay.Nat.Jl.38:157-317,
- HOLLOWAY J.D., 1989
Moth of Borneo,Part.12
Noctuinae,Heliothidinae,Hadeninae,Acronictinae,Amphipyridae,
Agaristidae,
C.A.B.,Inst.Ent.London,1989:57-226
- KOBES L., 1982
Beitr.z.Kenntn.der Noctuidenfauna Sumatras, Beschreibung
zweier neuer Eutelia-Arten.
Ent.Z.Frankfurt a.M.92(14):194-199
- KOBES L. et al, 1983-1989
Heterocera Sumatrana, Bd.2
Het.Sum.Soc.,Keltern,2:1-200
- KOBES L.W.R., 1985
Heterocera Sumatrana Bd.4, Teil 1: Pantheinae und Catocalinae
von Sumatra
Het.Sum.Soc.,Keltern,4:1-92
- KOBES L.W.R., 1992
Suppl.to the volume 4 of the Heterocera Sumatrana series,
Heteroc.Sumatr.7(1):79-107, .
- HAMPSON, G., 1903,
Cat.Lep.Phal.B.M.4:1-689,Heliothidinae,Noctuinae,
Brit.Mus.nat.Hist.1903,
- HAMPSON, G., 1903,
Cat.Lep.Phal.B.M.5:1-633,Hadeninae,
Brit.Mus.nat.Hist.1905,
- HAMPSON, G., 1906,
Cat.Lep.Phal.B.M.6:1-532,Cucullinae,
Brit.Mus.nat.Hist.1906,
- HAMPSON, G., 1908,
Cat.Lep.Phal.B.M.7:1-709,Amphipyridae,Acronyctinae,(part.)
Brit.Mus.nat.Hist.1908,
- HAMPSON, G., 1909,
Cat.Lep.Phal.B.M.8:1-583,Amphipyridae,Acronyctinae,(part.)
Brit.Mus.nat.Hist.1909,
- HAMPSON, G., 1910,
Cat.Lep.Phal.B.M.9:1-552,Amphipyridae,Acronyctinae,(part.)
Brit.Mus.nat.Hist.1910,
- HAMPSON, G., 1910,
Cat.Lep.Phal.B.M.9:1-829,Acontiinae,(Erastrinae)
Brit.Mus.nat.Hist.1910,

- HAMPSON, G., 1912.
Cat. Lep. Phal. B.M. 9: 1-689,
Euteliinae, Nycteolinae, Chloephorinae, Stictopterinae,
Brit. Mus. nat. Hist. 1912,
- NYE, I.W.B., 1975
The Generic Names of Moth of the World, Vol. 1: Noctuidae
Brit. Mus. (Nat. Hist.): 1-586
- PROUT, A.E., 1924
Some new forms of indo-australian Noctuidae,
Bull. Hill. Mus. 1(3): 413-426,
- PROUT, A.E., 1924
Some apparently new Noctuidae from Sumatra, New Guinea,
Mefor and Buru,
Bull. Hill. Mus. 1(3): 414-450,
- PROUT, A.E., 1928
Descriptions of some indo-australien Noctuidae,
Bull. Hill. Mus. 2(1): 63-74,
- PROUT, A.E., 1928
Descriptions of some indo-australien Noctuidae,
Bull. Hill. Mus. 2(2): 161-176,
- PROUT, A.E., 1928
Descriptions of some indo-australien Noctuidae,
Bull. Hill. Mus. 2(3): 256-270,
- PROUT, A.E., 1932
Descriptions of some indo-australian Noctuidae in the
collection Joicey,
Bull. Hill. Mus. 4(2): 263-274,
- PROUT, A.E., 1932
Some new indo-australian Noctuidae,
Bull. Hill. Mus. 4(2): 275-287,
- PROUT, A.E. 1926
Noctuid Moths from some of the Mountains of Sarawak
Sar. Mus. Journ. Nr. 9, 1926
- JORDAN K., WARREN W., 1909-1914,
Seitz; Gross-Schmetterlinge des indo-australischen
Faunengebietes,
Band 11; Die eulenartigen Nachtfalter, :1-
Alfred Kerner. Verlag, Stuttgart,
- POOLE R.W., 1988
Lepidopterorum Catalogus (New Series), Fasc. 118, Noctuidae,
part. 1 und 2,
Brill. Flora & Fauna Publications,
Leiden, New York, Copenhagen, Köln,
- SUGI S. & M. NAKAMURA, 1986
Trichosea champa and its allied species.
Cekkan-Mushi, 189: 4-12

Anschrift der Verfasser:

Thöny Hubert
Martin-Henn-Str. 73
85053 Ingolstadt

Martini Karl
Sickingenstr. 12
85051 Ingolstadt



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [7_1993_2](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Zur Kenntnis der Noctuidae-Fauna Borneo's K. Martini / H. Thöny 1-27](#)