

34 Par. *salic.* *submont.* — Aufzählung der Vögel des Kiautschou-Gebietes.

Weibchen von 6,0 bis 6,4, beim Männchen oft bis 6,6 (einmal 6,7 Koll. von Tschusi), während bei *salicarius* 6,5 schon selten ist und *montanus* 7,1 erreicht. Die Färbung ist deutlich dunkler als bei der großen Alpenmeise, aber dieser ähnlicher als die Färbung von *salicarius*. Zwei kleine Weibchen erinnern durch starken Seitenanflug und gelbliche Halsseiten an *rhenanus*. Typen: ein Paar vom 29. III. 1913 von Gmunden, Koll. von Tschusi. Nach Beobachtungen von Herrn A. v. Jordans, die u. a. zur Klarstellung der Form anregten, ist der Vogel in der Nähe von München nicht selten. In Berajah folgt eine ausführlichere Beschreibung mit Abbildungen einer Nisthöhle aus Ober-Österreich.

Vielelleicht gelingt es inzwischen, festzustellen, welche Form der mattköpfigen Sumpfmeise an den Donauufern und auf den Donauauen vorkommt. Hellmayr beobachtete Weidenmeisen im Herbste in den Donauauen bei Wien (Orn. Jahrb. 1902, S. 29), von Tschusi in den Salzachauen. Dagegen schreibt gerade in diesem Augenblick Freiherr Geyr von Schweppenburg über Slavonien in litt.: „Weidenmeisen kommen dort (bei Yukovar) merkwürdigerweise auf den für sie doch so geeigneten Donauinseln nicht vor, wenigstens gelang es mir nicht, irgendwelche Spuren von ihnen zu finden“. Dieser Befund stammt freilich aus den Sommermonaten.

Aufzählung der Vögel des Kiautschou-Gebietes.

Von O. Kleinschmidt.

Die Aufzählung folgt derjenigen von K. Kothe im Journ. f. Orn. 1907, p. 379. Eingeklammerte Namen bezeichnen Arten, die Kothe anführt, die aber in den mir vorliegenden Sammlungen nicht vertreten sind. Die Zahlen hinter den Namen bedeuten die Anzahl der vorhandenen Exemplare. Von den Buchstaben bedeutet E = Collectio Engler, H = Museum Hildesheim, M = Museum Magdeburg. Unter Kiautschou-Gebiet ist das deutsche Pachtgebiet verstanden, also etwa das Gebiet von der Kiautschou - Bucht bis zum Lauschan. Die Vögel der Coll. Engler tragen meist keine genauen Lokalitätsangaben. Bemerkungen über einzelne Arten folgen vielleicht später. Die von Kothe nicht erwähnten Arten sind durch fetten Druck hervorgehoben. Bei Aufzählungen bevorzuge ich zweifache vor dreifachen Namen schon wegen der Raumersparnis.

Alken.

[1. *Alca antiqua* Gm.]
 [2. *Brachyramphus perdix* (Pall.)]

Taucher.

3. *Gavia stellata* (Pontopp.). 1 E.
 (= *Colymbus septentr. auct.*)
 [4. *Colymbus cristatus* L.]
 5. " *auritus* L. 1 E.
 6. " *nigricollis* Brm. 2 E.
 [7. " *poggei* Rehw.]

Möven.

[8. *Larus canus* L.? Kothe.]
 [9. " *ridibundus* L.]
 10. " *vegae* Palmen. 1 E.
 11. " *crassirostris* Vieill. 3 E.

Seeschwalben.

12. *Sterna tschegrava* Lep. 1 E.
 13. " *zimmermanni* Rchb. 3 E.
 14. " *longipennis* Nordm. 2 E.
 15. " *sinensis* Gm. 1 E.
 [16. *Hydrochelidon leucoptera* (Temm.)]

Kormorane.

17. *Phalacrocorax filamentosus* Temm. & Schl. 3 E.¹⁾
 18. *Phalacrocorax pelagicus* Pall. 5 E.

Pelikane.

[19. *Pelecanus philippensis* Gm.]

Enten.

20. *Mergus merganser* L. 1 E.
 21. " *serrator* L. 1 E.
 22. " *albellus* L. 1 E.
 [23. *Oidemia carbo* Pall.]
 [24. *Nyroca marila* (L.)]
 [25. " *fuligula* (L.)]

[26. *Nyroca ferina* (L.)]
 27. " *clangula* (L.) 1 M.
 [28. *Anas clypeata* L.]
 29. " *zonorhyncha* Swinh. 1 E.
 Nicht ganz typisch, weißes
 Band vorm Spiegel.
 30. *Anas acuta* L. 1 E.
 31. " *falcata* Georgi. 2 E.
 32. " *penelope* L. 1 E.
 33. " *boscas* L. 2 E. 1 H.
 34. " *galericulata* L. 3 E.
 35. " *querquedula* L. 2 E.
 36. " **formosa** Georgi 3 H.
 37. " *crecca* L. 1 E. 3 H. 1 M

Höhlenenten.

38. *Tadorna tadorna* (L.). 2 E.
 39. *Casarca casarca* (L.). 5 E.

Gänse.

40. *Anser serrirostris* Swinh. 3 E.
 41. " *albifrons* (Scop.) 1 E.²⁾
 [42. " *cygnoides* (L.)]
 43. **Branta nigricans** (Lawr.). 4 E.
 [Kothe gibt *Branta bernicla* (L.).
 an.]

Schwäne.

[44. *Cygnus cygnus* (L.)]
 [45. " *olor* (Gm.)]
 [46. " *jankowskii* Alphéraky.]
 Vermutlich gehören die von
 Kothe erwähnten Zwergschwäne
 u. 1 Schantung-Vogel in H. zu
 zu dieser Form.

Brachschwalben.

47. *Glareola orientalis* Leach. 2 E.

Strandvögel.

48. **Haematopus osculans** Swinh.
 1 M.

¹⁾ Kothe gibt *P. carbo* (L.) an, von dem *filamentosus* eine geographische Form ist, *carbo* könnte auf dem Zug vorkommen, da er im nördlichen Ostasien brütet.

²⁾ Die Literaturangaben über Artkennzeichen der Bläß- und Zwerggans widersprechen sich.

[49. *Arenaria interpres* (L.)]
 50. *Squatarola squatarola* (L.) 1 E. 2 H.
 51. *Charadrius fulvus* Gm. 1 E.
 52. *Aegialitis placida* (Gray). 2 H.
 53. " *dubia* (Scop.). 7 H.
 54. *Ochthodromus veredus* (Gould).
 3 E.
 55. *Vanellus vanellus* (L.). 1 E.
 [56. *Lobivanellus cinereus* Blyth.]
 57. *Himantopus himantopus* (L.).
 1 E.
 58. *Calidris leucophaea* (Pall.). 1 E.
 59. *Tringa pacifica* Coues. 9 H.
 Kothe gibt *Tringa alpina* L. an.
 [60. *Tringa ferruginea* Brünn.].
 [61. " *acuminata* (Horsf.).]
 62. " *ruficollis* Pall. 2 H.
 63. " *temmincki* Leisl. 4 H.
 64. " *brevipes* Vieill. 3 E.
 [65. " *hypoleuca* L.]
 [66. " *pugnax* L.]
 [67. " *totanus* L.]
 [68. " *erythropus* (Pall.).]
 69. " *nebularia* (Gunn.). 5 H.
 [70. " *stagnatilis* Bchst.].
 71. " *ocrophus* L. 1 H.
 72. " *glareola* L. 1 H.
 73. *Limosa melanuroides* Gould. 2 E.
 Kothe gibt *Limosa limosa* (L.)
 an.
 74. *Limosa novaezealandiae* Gr.
 4 H. 1 E.
 [75. *Numenius arquatus*?]
 76. " *variegatus* (Scop.). 3 E.
 77. " *minutus* J. Gd. 2 E.

Schnepfen.

78. *Gallinago gallinago* (L.). 1 E.
 79. " *stenura* (Kuhl). 1 H.
 80. " *japonica* Seeb. 1 H.
 81. *Scolopax rusticola* L. 1 E.

Kraniche.

82. *Grus lillfordi* Sharpe. 1 E.

Trappen.

[83. *Otis dybowskii* Tacz.]

Rallen.

84. *Rallus indicus* (Blyth.). 4 E.
 85. *Porzana auricularis* Reichenb.
 2 E. 1 H.
 Kothe gibt *pusilla* (Pall.) an.
 86. *Limnobaenus paykulli*
 (Ljungk.) 2 E.
 87. *Fulica atra* L. 1 E.

Ibisse.

[88. *Ibis melanocephala* Vieill.]
 89. *Platalea*? 2 E.

Kothe gibt *minor* T. & Schl. an. Die Stücke stehen aber vielleicht zwischen *major* und *minor*.

Reiher.

90. *Nycticorax nycticorax* (L.). 2 E.
 91. *Botaurus stellaris* (L.). 4 E.
 92. *Ardetta sinensis* (Gm.). 2 E.
 93. *Ardetta erythma* Swinh. 7 E.
 94. *Butorides amurensis* Schrenk.
 1 E.
 95. *Ardea cinerea* L.? 3 E. 2 H.
 Vorderhals z. T. sehr hell.
 96. *Ardea manillensis* Meyen. 3 E.
 97. *Herodias timorensis* Cuv.? 2 E.
 Aber ein Stück hat etwas
 dunklen Schnabel. Kothe gibt
egretta an. Cf. J. f. O. 1910
 p. 468.

Laufhühnchen.

98. *Turnix blanfordi* Blyth. 2 E.

Tauben.

99. *Columba rupestris* Bp. 1 E.
 100. *Turtur chinensis* (Scop.) 1 H.
 101. " *humilis* Temm. 2 E.
 [102. " *douraca* Hodgs.]

Hühner.

[103. *Phasianus torquatus* Gm.]
 (In Coll. Engler ein importierter Vogel *kiangsueensis*
But??)

104. *Caccabis chucar* (Gr.). 3 E.
 105. *Coturnix japonica* T. & Schl.
 3 E.

Tagraubvögel.

106. *Circus spilonotus* Kaup. 2 E.
 107. " *cyanus* (L.). 1 E. 1 M.
 108. " *melanoleucus* (Forst.).
 7 E.
 109. *Buteo plumipes* (Hodgs.). 1 E.
 110. " *hemilasius* auct. 5 E. 1 H.
 Siehe "Falco" 1909, pag. 14,
 asiaticus Blyth!.
 111. *Archibuteo pallidus* Menzb.
 1 E.
 112. *Butastur indicus* (Gm.). 6 E.
 1 H.
 113. *Accipiter nisus* subsp. 5 E. 1 M.
 Größer als nisus.

? *Accipiter nisus pallens* Stejn?.
 1 E.

Gleiche Färbungen besitze
 ich von Europa.

114. *Accipiter gularis* T. & Schl.
 3 E. 3 H.

115. *Astur eculoides* (Temm.). 1 E.
 Junger Vogel, dem vorigen
 täuschend ähnlich gefärbt.

116. *Astur gentilis* subsp. 5 E.
 Von Kothe als *palumbarius*
 bestimmt, aber kleiner und
 dunkelköpfiger.

117. *Pandion haliaëtos* (L.). 1 H.

118. *Pernis orientalis* Tacz. 1 E.

119. *Milvus melanotis* T. & Schl.
 4 E. 2 H.

120. *Falco rudolfi* K. 1 E.
 Kothe gibt *F. peregrinus*
 an, vielleicht *harterti* But.?

121. *Falco jakutensis* (But.). 2 E.

122. " *regulus* subsp. 5 E. 3 H.
 Lichter und wenig größer als
 Europäer.

123. *Falco japonicus* T. & Schl.
 9 E.

124. *Falco amurensis* Radde. 1 E.
 5 H.

Eulen.

[125. *Bubo kiautschensis* Rchw.]
 [126. " *turcomanus* Eversm.
 Erfordert nähere Mittei-
 lungen, wohl falsch von K. be-
 stimmt. Vielleicht neue Form?]
 127. *Asio flammeus* (Pontopp.). 4 E.
 2 H.
 128. *Asio otus* (L.). 2 E. 1 H.
 129. *Scops semitorques* Schl. 1 E.
 130. *Scops stictonotus* Sharpe. 4 E.
 131. *Ninox scutulata* (Raffl.). 1 E.
 132. *Athene plumipes* Swinh. 2 E.
 2 H.

Kuckucke.

133. *Cuculus telephonus* Heine.
 2 E. 3 H.

Spechte.

134. *Jynx chinensis* Hesse. 1 E. 1 H.
 Flügel 85, Kehle ockergelb, am
 Kinn weißliche (verblichene?)
 Federchen wie bei Europäern.
 Ein Vogel mehr rötlich, der
 andere wie der Sardinier.
 135. *Picus zimmermanni* Rchw.
 2 E. 12 H.
 Färbung und Unterseiten-
 fleckung schwankend. Frag-
 lich, ob teils Brut-, teils Zug-
 vögel.
 [136. *Dryobates cissa* (Pall.).]
 Genauer zu bestimmen, ob
 etwa *tscherskii*?
 137. *Dryobates cabanisi*. 1 E. 4 H.
 Z. T. mit endwärts weiß-
 gefleckten Skapularen (An-
 näherung an *tscherskii*?).

Eisvögel.

138. *Alcedo pallasi* Reichenb. 4 E.
 3 H.
 Kothe nennt allgemein *ispida*
 L. Hartert gibt *bengalensis*
 an. Maße aber nicht selten bis
 74,5, vielleicht form. nov.

139. *Halcyon pileatus* (Bodd.). 5 E.
 140. *Ceryle lugubris* (Temm.)? 1 M.
 Noch mit typ. *lugubris* und
 guttulata zu vergleichen. In
 H. 2 Vögel von Jchang.

Raken.

141. *Eurystomus calonyx* Sharpe.
 7 E. 1 M.

Wiedehopfe.

142. *Upupa saturata* Lönnb. 2 E.
 2 H. 1 M.
 Sehr wenig von *epops* ver-
 schieden, ein wenig grauer.

Ziegenmelker.

143. *Caprimulgus jotaka*. Temm. &
 Schl. 2 E. 3 H.

Raupenfresser.

144. *Pericrocotus cinereus* Lafr.
 1 H.

Seidenschwänze.

[145. *Bombycilla garrula* (L.)?]
 [*Bombycilla japonica* (Sieb.)].

Fliegenschnäpper.

146. *Muscicapa cyanomelana*
 Temm. cf. *Falco* 1907 p. 96.
 2 E.
 147. *Muscicapa latirostris* Raffl.
 1 H.
 [148. *Terpsiphone incii* (J. Gd.)].

Würger.

149. *Lanius lucionensis* L. 1 H.
 Im Mus. Hildesh. noch ein
 Vogel von Zentral-Schaltung
 mit blasser (*isabellinus*) Färbung
 und gelber (*cristatus*) Unter-
 seite.
 150. *Lanius tigrinus* Drap. 1 E.
 151. *Lanius sphenocercus* Cab. 5 E.
 1 H.
 152. *Lanius bucephalus* T. & Schl.
 1 E. 1 H.

Brillenvögel.

153. *Zosterops palpebrosa* subsp.
 1 E.
 Wohl *simplex*. Nachzuprüfen!

Meisen.

154. *Parus hellmayri* Bianchi. 5 H.
 Raben.

155. *Corvus hassi* Rchb. 1 E.
 156. " *pastinator* J. Gd. 1 E.
 3 H.
 157. " *torquatus* Less. 2 E.
 4 H.
 158. *Colaeus neglectus* (Schl.). 5 H.
 159. *Pica sericea* J. Gd. 1 E. 11
 H.

160. " *bactriana* Bp. 1 E.
 Wohl alles Zwischenform
 zwischen beiden.

161. *Cyanopica swinhoei* Hartert
 5 E. 14 H.

Pirole.

162. *Oriolus indicus* Jerd. 4 E. 10
 H. 1 M.

Stare.

163. *Sturnia sturnina* (Pall.). 1 E.
 164. *Spodiopsar cineraceus* (Temm.)
 4 E. 9 H. 1 M.

Finken.

168. *Passer jubilaeus* Rchb. Albino.
 1 E.
 [166. *Coccothraustes japonicus* T. &
 Schl.].

166. *Eophona migratoria* Hartert
 1 E.
 Eophona magnirostris Hartert
 1 E.
 [168. *Chloris sinica* L.]

169. *Carpodacus grebultzkii* Stejn.
 1 H.
 Nicht *erythrinus* (Kothe), da
 Flügel 81 mm.

170. *Fringilla subcuneolata* Kl.
 1 E. 2 H.

171. **Loxia curvirostra** subsp. 1 E.

1 H.

Die von Hartert V. p. F. p.
119 erwähnte Form (Farbe
prächtig, Flügel 9,7; 10,0) nicht
albiventris.

Ammern.

[172. **Emberiza tristami** Swinh.].173. " **castaneiceps** 1 H.
" subsp.? 1 E.

Flügel nur 7,7. Bismarck-
berg 8. Apr.

174. **Emberiza spodocephala** Pall.
2 H.[175. **Emberiza personata** Temm.].176. " **rutila** Pall. 2 H.177. " **rustica** Pall. 1 E.
1 H.

Bachstelzen.

[178. **Budytes thunbergi** Billberg].179. " **talvanus** Swinh. 1 H.[180. " **citreolus** (Pall.)].181. **Motacilla lugens** Kittl.? 1 H.[182. " **ocularis** Swinh.].
" **melanope** Pall. 1 E.

Pieper.

[183. **Anthus maculatus** Hodgs.].184. " **richardi** Vieill. 1 H.

Lerchen.

185. **Alauda intermedia** Swinh. 4 H.186. **Calandrella cheleensis**
(Swinh.). 6 H. 1 M.187. **Galerida coreensis** Tacz? 1 E.
20 H.

Noch nicht verglichen.

Sänger.

188. [Dryonastes perspicillatus
(Gm.)].189. [Acrocephalus orientalis (T. &
Schl.)].190. **Geocichla varia** (Pall.). 3 E.191. " **sibirica** (Pall.). 1 E.192. **Turdus fuscatus** (Pall.). 1 E.
1 M.193. **Turdus naumanni** (Temm.).
2 E. 4 H.194. **Turdus hortulorum** (Schl.). 1
E. 1 M.

195. [Turdus obscurus Gm.]

— [Monticola cyanus (L.)].

196. " **philippensis** (P. L.
S. Müll.). 2 E.197. **Monticola gularis** (Swinh.).
(Ein Käfigvogel.)198. **Pratincola stejnegeri** Parrot.
1 E. 1 M.199. **Erithacus calliope** (Pall.). 1 E.
6 H.cf. **Falco** 1905, S. 69.[200. **Erithacus cyane** (Pall.)].[201. " **suecicus** (L.)].

Wohl robustus (But.) oder
form. nov. Von Kreyenberg
südlicher, bei Paotou, gesam-
meltte Stücke (Mus. Magdeb.)
messen 7,3, 7,5, 7,5. Färbung
dunkel wie gaetkei, Schnabel
dünner, länger, Schwanzbinde
schmäler. Stern groß, einen
rostroten Querkragen bildend.

202. **Erithacus auroreus** (Pall.). 3 E.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Falco - unregelmässig im Anschluss an das Werk "BERAJAH, Zoographia infinita" erscheinende Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [9 1913](#)

Autor(en)/Author(s): Kleinschmidt Otto

Artikel/Article: [Aufzählung der Vögel des Kiautschou-Gebietes 34-39](#)