

Herbert KERN

Zum Auftreten des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) bei Freudenberg

Die Zunahme des Kormorans in Europa ist durch eine Fülle von Publikationen dokumentiert (z. B. BEZZEL 1989, SUTER 1989). Diese rasche Bestandszunahme einer noch vor relativ kurzer Zeit zu Recht als bedroht eingestuft Art führte vor allem zu Diskussionen um Beeinträchtigung der Fischerei und des Angelsports (z. B. HÖLZINGER 1987, KELLER 1993).

Auch im Main-Tauber-Kreis nahmen ab Mitte der 80er Jahre die Beobachtungen durchziehender, bzw. rastender Vögel zu (DORNBERGER 1992).

Am Main ist eine ähnliche Bestandsentwicklung zu beobachten wie in anderen Gebieten Süddeutschlands (RANFTL et al. 1988, STREHLOW 1992, ZACH 1987).

Das Untersuchungsgebiet liegt am Main zwischen Freudenberg und Fechenbach, Main-Tauber-Kreis, topographische Karte L 1:50.000 Blatt 6320 Miltenberg. Höhe 135 m über NN.


Kontrolliert wurde der Main und die ehemaligen Materialentnahmestellen im Gewann „Mühlgrund“.


Der Arbeit liegen 38 Kormoranbeobachtungen aus dem Zeitraum Dezember 1989 bis Dezember 1993 zu Grunde.

Im November/Dezember 1993 übernachteten die Kormorane auf drei Bäumen am Main.

Bisherige Höchstzahl 85 am 10.12.1993. Im Gegensatz zu anderen Süddeutschen Rast- und Durchzugsgebieten werden am Main die meisten Kormorane Anfang/Mitte Dezember beobachtet. Sind durch Frostperioden stehende Gewässer vereist, kommen die Vögel zum Fischen an den eisfreien Main und an die tiefen, mit Grundwasser gespeisten Aussandungen, welche extrem spät vereisen.

Abbildung (nächste Seite): Verteilungsmuster der Kormoran-Beobachtungen; Dekadensummen (38 Daten mit 642 Ind.).





Literatur:

- BEZZEL, E. (1989): Rastende Kormorane (*Phalacrocorax carbo*) in Südbayern: Entwicklung 1978/79 bis 1987/88. Garmischer vogelkdl. Ber. 18: 37-45.
- DORNBERGER, W. (1992): 10. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis. Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 10: 102-123.
- HÖLZINGER, J. (1987): Die Vögel Baden-Württembergs, Band 1, Gefährdung und Schutz. Artenhilfsprogramme. Avifauna Bad.-Württ 1.2: 725-1420.
- KELLER, T. (1993): Untersuchungen zur Nahrungsbiologie von in Bayern überwinternden Kormoranen *Phalacrocorax carbo sinensis*. Ornithol. Verh. 25: 81-128.
- RANFTL, H., F. ALKEMEIER, W. DORNBERGER & D. FRANZ (1988): Die Vogelwelt des Ausgleichbeckens Altmühltal. 3. Ergänzungsbericht 1986 und 1987. Anz. ornithol. Ges. Bayern 27: 99-114.
- STREHLOW, J. (1992): Die Vogelwelt des Ammersee-Gebietes. 4. Ergänzungsbericht 1986-1990. Ornithol. Anz. 31: 1-41.
- SUTER, W. (1989): Bestand und Verbreitung in der Schweiz überwinternder Kormorane *Phalacrocorax carbo*. Ornithol. Beob. 86: 25-52.

Anschrift des Verfassers:

Herbert Kern
Schleusenweg 8
D-97896 Freudenberg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Kern Herbert

Artikel/Article: [Zum Auftreten des Kormorans \(*Phalacrocorax carbo*\) bei Freudenberg 23-25](#)